

日本植物病名目録追録

Supplements for the common names of plant diseases in Japan

<本文は、日本植物病名目録追録(1)(日植病報 68(1)113-121, 2002)、同(2)(日植病報 70(1): 92-98, 2004)として公開したものに加え、その後新病名等の提案を受け病名委員会において審査終了した(2010/6/1)ものをまとめたものである。

なお、追録旧版の参照を希望される方は病名委員長まで直接ご連絡ください。>

日本植物病理学会病名委員会編

注) 植物名記載の後のp.00は日本植物病名目録(2000)本文の記載ページ
新規に採録された植物は頁番号の右に***をつけた。

食用作物 Food crops

1. 新病名・病原追加/学名/病名変更・文献追加等

サツマイモ p.2

斑紋モザイク病 hammon-mosaic-byo Internal cork

Sweet potato feathery mottle virus

山崎修一ら：日植病報 75(3): 156, 2009

[備考] 山崎ら(2009)はSweet potato feathery mottle virus-common系統(SPFMV-C)がsevere系統(SPFMV-S)と重複感染していることを報告したが、SPFMV-Sによる病徵への影響はなく、SPFMV-C単独感染の場合には無病徵感染であった

(注) 文献, 備考追加

帯状粗皮病 obijo-sohi-byo Russet crack

(2) *Sweet potato virus G*

山崎修一ら：日植病報 75(2):102, 2009

[備考] 単独感染では塊根表皮にわずかな退色を生ずるのみであるが、SPFMV-Sとの同時接種により、SPFMV-Sの単独感染よりも激しい帯状粗皮症状や激しい退色を誘発した。

(注) 病原, 備考追加

褐色乾腐病 kasshoku-kampu-byo Fusarium root rot

Fusarium solani (Martius) Saccardo

大城 篤ら：日植病報 66(3):258, 2000

(注) 病原追加

白腐病 shirogusare-byo Mottle necrosis

(1) *Pythium scleroteichum* Drechsler

Tojo, M. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 73(2):121, 2007

(注) 病原追加。これにより(1)*P. spinosum*は(2)に、(2)*P. ultimum* var. *ultimum*は(3)となる

シコクビエ

p.6

すす葉枯病 susu-hagare-byo

Bipolaris nodulosa (Berkeley & Curtis) Shoemaker

西原夏樹：草地試験場研究資料 2:50, 1991

[備考] 西門（農学研究 7:190, 1914）は本病をヘルミントスボリウム病としたが、国内発生未確認であった。西原（1991）は国内発生を確認して、すす葉枯病として報告した

(注) 病名変更。日本植物病名目録付録 (p.47) に記載されているヘルミントスボリウム病の項を削除する

オオムギ

p.6

灰色かび病 hairo-kabi-byo Gray mold

Botrytis cinerea Persoon: Fries

向畠博行：北陸病虫研報 46:97, 1998；向畠博行：北陸病虫研報 54:45, 2005

イネ

p.10

もみ枯細菌病 momigare-saikin-byo Bacterial grain rot

(1) *Burkholderia gladioli* (Severini 1913) Yabuuchi, Kosako, Oyaizu, Yano, Hotta, Hashimoto, Ezaki & Arakawa 1993

Ura, H. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 72(2):98, 2006

(注) 病原追加。これにより*B. glumae*は(2)となる

葉しよう腐敗病 yosho-fuhai-byo Sheath rot

Sarocladium oryzae (Sawada) Gams & Hawksworth

那須英夫：日植病報 70(1):18, 2004；那須英夫：日植病報 70(2):106, 2004

(注) 文献追加

稻こうじ病 inakoji-byo False smut

Vilosiclava virens E. Tanaka & C. Tanaka [*Claviceps virens* M. Sakurai ex Nakata, *C. oryzae-sativae* Hashioka, anamorph: *Ustilaginoidea virens* (Cooke) Takahashi]

Tanaka, E. et al.: Mycotaxon 106:491, 2008；田中栄爾ら：日植病報75(3):233, 2009

[備考] Tanaka, E. et al. (2008)は本菌に新属*Vilosiclava*をあてた

(注) 病原学名変更

褐色米 kasshoku-mai Discoloured rice grains

(3) *Sarocladium oryzae* (Sawada) Gams & Hawksworth [*S. attenuatum* Gams & Hawksworth]

那須英夫：日植病報 70(2):106, 2004

[備考] 本病原はイネ葉しょう腐敗病菌である

(注) 褐色米の病原学名 (3)*Sarocladium attenuatum*を*S. oryzae*に変更する

ヒエ

p.18

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

Colletotrichum echinochloae Moriwaki & Tsukiboshi [*C. graminicola* (Cesati) Wilson]

澤田兼吉：台灣農試報83 (台灣菌類調查報告7):158, 1942(昭17) ; Moriwaki, J. and Tsukiboshi, T.: Mycoscience 50(4):273, 2009

[備考] 病原が広義の*C. graminicola*から新種として分割された

(注) 病原学名変更。国内発生確認。これにより付録の炭疽病の項は削除

キビ

p.18

白斑葉枯病 hakuhan-hagare-byo Leaf blight

Fusarium spp.

宋 碩燦ら：日植病報 68(2):185, 2002

ライムギ

p.19

かさ枯病 kasagare-byo Bacterial halo blight

Pseudomonas syringae pv. *coronafaciens* (Elliott 1920) Young, Dye & Wilkie 1978

篠原弘亮ら：日植病報 65(6):653, 1999 ; 篠原弘亮ら：日植病報 69(2):136, 2003

黄化萎縮病 oka-ishuku-byo Downy mildew

Sclerotinia macrospora (Saccardo) Thirumalachar, G. G. Shaw & Narasimhan

大久保博人ら：日植病報 71(3):213, 2005

モロコシ（ソルガム）

p.21

えそモザイク病 eso-mosaic-byo Necrotic mosaic

Maize dwarf mosaic virus

御子柴義郎ら：日植病報 70(3):266, 2004

麦角病 bakkaku-byo Ergot

(1) *Claviceps sorghicola* Tsukiboshi, Shimanuki & Uematsu

Tsukiboshi, T. et al.: Mycological Research 103(11):1403, 1999

(注) 病原同定。これにより(1) *Claviceps* sp.は削除

(2) *Sphacelia sorghi* McRae

月星隆雄ら：日植病報 65(3):318, 1999

(注) 文献追加

コムギ

p.22

灰色かび病 hairo-kabi-byo Gray mold

Botrytis cinerea Persoon: Fries

梶谷裕二: 日植病報 75(1):39, 2009

トウモロコシ

p.26

赤かび病 akakabi-byo Gibberella ear rot, Kernel rot, Stalk rot

(1) *Fusarium verticillioides* (Saccardo) Nirenberg

岡部郁子ら: 日植病報 74(1):35, 2008

(注) これにより(1) *Gibberella zae*は(2), (2) *Gibberella fujikuroi*は(3)となる

ラッカセイ

p.28

さび斑病 sabihan-byo Alternaria leaf spot

Alternaria alternata (Fries) Keissler

古川聰子・岸 國平: 日植病報 68(1):65, 2002

ダイズ

p.30

葉腐病 hagusare-byo Rhizoctonia rot

Rhizoctonia solani Kühn

竹原利明ら: 日植病報 71(3):217, 2005; 越智 直ら: 日植病報 71(3):217, 2005

[備考]菌糸融合群 AG-1 培養型 IA.

(注) 文献追加

苗立枯病 nae-tachigare-byo Damping-off

(1) *Pythium spinosum* Sawada

(2) *Pythium ultimum* Trow var. *ultimum*

児玉不二雄ら: 日植病報 76(1):78, 2010

リゾクトニア根腐病 *Rhizoctonia-negusare-byo* Rhizoctonia root rot

Rhizoctonia solani Kühn

向畠博行ら: 日植病報 71(1):75, 2005

[備考]菌糸融合群 AG-2-2, 培養型 IIIB

(注) 病原追加

子実汚斑病 shijitsu-ohan-byo Yeast spot

(1) *Eremothecium ashbyi* (Guilliermond ex Routien) Batra

Kimura S. et al.; J. Gen. Plant Pathol. 74(4):275, 2008

(2) *Eremothecium coryli* (Peglion) Kurtzman

木村重光: 日植病報 73(4):283, 2007

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

- (1) *Erysiphe glycines* F. L. Tai
Takamatsu, S. et al.: Mycoscience 43(4):333, 2002
- (2) *Erysiphe pisi* de Candolle
澤田宏之ら : 日植病報 48(1):136, 1982
- (3) *Oidium* spp.
佐藤幸生ら : 日植病報 65(3):398, 1999 ; 挟間 渉・加藤徳弘 : 日植病報 65(3):399, 1999 ;
挟間 渉・加藤徳弘 : 九病虫研会報 46:18, 2000 ; Takamatsu, S. et al.: Mycoscience
43(4):333, 2002
- [備考] *Pseudoidium* 亜属 ; *E. polygoni*. *Oidium* sp.は北米で発生する*Erysiphe diffusa*
(Cooke & Peck) U. Braun & S. Takam.の不完全世代と考えられるが、わが国では
完全世代は未確認。接種試験なし

マダラハウチワマメ (パールルーピン、タルイ) p.33
灰色かび病 hairo-kabi-byo Gray mold
Botrytis cinerea Persoon: Fries
富岡啓介ら : 日植病報 68(1):79, 2002 ; Tomioka, K. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 74(5):
405, 2008

ベニバナインゲン p.33***
Phaseolus coccineus L.
萎凋病 icho-byo Fusarium rot
Fusarium oxysporum Schlechtendahl: Fries f. sp. *phaseoli* J. B. Kendrick & W. C. Snyder
柴田 聰 : 日植病報 65(3):398, 1999 ; 柴田 聰 : 群馬農試研報 7:21, 2002

茎根腐病 kukinegusare-byo Stem and root rot
Pythium myriotylum Drechsler
渡邊 健・東條元昭 : 日植病報 72(1):52, 2006 ; Watanabe, K. & Tojo, M.: J. Gen. Plant
Pathol. 72(2):126, 2006

リゾクトニア根腐病 *Rhizoctonia-negusare-byo* Rhizoctonia root rot
Rhizoctonia solani Kühn
渡邊 健・本橋みゆき : 関東病虫研報 52:19, 2005
[備考] 菌糸融合群 AG-1

白絹病 shirakinu-byo Southern blight
Sclerotium rolfsii Saccardo
渡邊 健・本橋みゆき : 関東病虫研報 52:19, 2005

綿腐病 watagusare-byo Cottony leak
Pythium aphanidermatum Fitzpatrick

青木一美ら：日植病報73(3):182, 2007 ; Aoki, K. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 73(6):408, 2007

インゲンマメ

p.33

葉腐病 hagusare-byo Rhizoctonia rot, Web blight

Rhizoctonia solani Kühn

岡田 貴ら：日植病報 76(1):79, 2010

[備考] 岡田ら(2010)は菌糸融合群 AG-1, 培養型 IBとした

(注) 文献・備考追加

萎凋病 icho-byo Fusarium rot

Fusarium oxysporum Schlechtendahl: Fries f. sp. *phaseoli* J. B. Kendrick & W. C. Snyder

柴田 聰：群馬農試研報 7:21, 2002

黒根病 kurone-byo Black root rot

Chalara elegans Nag Raj & Kendrick

香川晴彦ら：日植病報 68(1):65, 2002

苗立枯病 nae-tachigare-byo Damping-off

(1) *Pythium irregularare* Buisman

(2) *Pythium mamillatum* Meurs

(3) *Pythium myriotylum* Drechsler

(4) *Pythium spinosum* Sawada

(5) *Pythium ultimum* Trow var. *ultimum*

的場百合香ら：日植病報 70(3):214, 2004 ; Matoba, Y. et al.: J. Gen. Plant Pathol.

74(1):81, 2008

根腐病 negusare-byo Fusarium root-rot

Fusarium cuneirostrum O'Donnell & T. Aoki [*Fusarium solani* (Martius) Saccardo f.sp. *phaseoli* W.C. Snyder & H.N. Hansen]

青木孝之：日植病報73(3):175, 2007

(注) 病原学名*Fusarium solani* f.sp. *phaseoli*を*F. cuneirostrum*に変更する

雲紋病 ummon-byo Leaf blotch

Mycosphaerella sp.

古川聰子・岸 国平：日植病報75(3):234, 2009

エンドウ

p.35

つる枯細菌病 tsurugare-saikin-byo Bacterial blight

Pseudomonas syringae pv. *pisi* (Sackett 1916) Young, Dye & Wilkie 1978

Suzuki, A. et al.: Plant Dis. 87(12):1404, 2003

(注) 文献追加

つる腐細菌病 tsurugusare-saikin-byo Bacterial stem rot

(3) *Pseudomonas viridiflava* (Burkholder 1930) Dowson 1939

石井香奈子ら : 日植病報 72(1):46, 2006

(注) 病原追加。これにより(1) *Xanthomonas campestris* pv. *pisi*は(4), (2) *Pseudomonas marginalis* pv. *marginalis*は(2), (3) *Erwinia carotovora* subsp. *carotovora*は(1)となる

疫病 eki-byo Phytophthora rot

Phytophthora nicotianae van Breda de Haan

竹内 純・堀江博道 : 関東病虫研報 47:45, 2000

[備考] サヤエンドウに発生

萎凋病 icho-byo Fusarium wilt

Fusarium oxysporum Schlechtendahl: Fries f.sp. *pisi* (van Hall) Synder & Hansen

松崎聖史ら : 日植病報 69(3):274, 2003

シカクマメ

p.37

褐色腐敗病 kasshoku-fuhai-byo Lasiodiplodia brown rot

Lasiodiplodia theobromae (Patouillard) Griffon & Maublanc

小野 剛ら : 日植病報 70(3):224, 2004

菌核病 kinkaku-byo Sclerotinia rot

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary

小野 剛 : 日植病報 70(1):45, 2004

実腐病 migusare-byo Fruit rot

Rhizoctonia solani Kühn

栄森弘己ら : 関東病虫研報 50:55, 2003

[備考] 菌糸融合群 AG-4, 培養型 IIIA

ソラマメ

p.38

灰色かび病 hairo-kabi-byo Gray mold

Botrytis cinerea Persoon: Fries

荒井治喜ら : 日植病報 66(2):92, 2000

斑点病 hanten-byo Leaf spot

Alternaria tenuissima (Nees: Freis) Wiltshire

Rahman, M. Z. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 68(1):31, 2002

褐色雪腐病 kasshoku-yukigusare-byo Pythium snow rot
Pythium iwayamai Ito
荒井治喜ら : 日植病報 65(6):656, 1999

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew
Oidium sp.
大司さえき ら : 日植病報 66(3):255, 2000
[備考] *Erysiphe polygoni*型

雪腐菌核病 yukigusare-kinkaku-byo Sclerotinia snow blight
Sclerotinia trifoliorum Eriksson
荒井治喜ら : 日植病報 65(6):656, 1999

アズキ p.39
ピシウム苗立枯病 *Pythium-nae-tachigare-byo* Pythium damping-off
(1) *Pythium mamillatum* Meurs
岡田 貴ら : 日植病報 65(1):75, 2003
(2) *Pythium myriotylum* Drechsler
岡田 貴ら : 日植病報 65(1):75, 2003
(3) *Pythium spinosum* Sawada
岡田 貴ら : 日植病報 68(1):105, 2002 ; 岡田 貴ら : 日植病報 69(1):75, 2003
[備考] 岡田ら(2002)は腐敗病を提案したが、標記病名に変更する

子実汚斑病 shijitsu-ohan-byo Yeast spot
(1) *Eremothecium ashbyi* (Guilliermond ex Routien) Batra
(2) *Eremothecium coryli* (Peglion) Kurtzman
Kimura, S. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 75(4):322, 2009

ソバ p.43
立枯症 tachigare-sho Damping-off
Pythium sp.
景山幸二ら : 日植病報 71(3):211, 2005
[備考] 病原は未発表の新種

炭疽病 tanso-byo Anthracnose
(1) *Colletotrichum dematium* (Persoon: Fries) Grove
(2) *Glomerella cingulata* (Stoneman) Spaulding & Schrenk
森脇丈治・月星隆雄 : 日植病報 65(3):398, 1999

ジャガイモ

p.44

えそ病 eso-byo Necrosis

Tomato spotted wilt virus

松尾和敏ら：日植病報 69(3):342, 2003

半身萎凋病 hanshin-icho-byo Verticillium wilt

(4) *Verticillium tricorpus* Isaac

海老原克介ら：日植病報 65(3):399, 1999

[備考] 病原力は非常に弱い

黒斑病 kokuhan-byo Black pit

Alternaria alternata (Fries) Keissler

米村 信ら：日植病報 51(3):334, 1985；池谷美奈子・白井佳代：日植病報 75(1):85, 2009

紅色斑点病 koshoku-hanten-byo Pink spot

Pyrenopeziza sp.

山名利一・三澤知央：日植病報 75(1):85, 2009

2. 付録

シコクビエ

p.47

葉枯病 hagare-byo

Exserohilum monoceras (Drechsler) Leonard & Suggs

西原夏樹：草地試験場研究資料 2:115, 1991

褐紋病 katsumon-byo

Bipolaris sp.

西原夏樹：草地試験場研究資料 2:107, 1991

イネ

p.48

† 赤条斑病 seki-johan-byo Red stripe

Microbacterium sp.

加來久敏ら：日植病報 66(2):131, 2000 ; Kaku, H. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 66(2):149, 2000 ; Dhitikanttipong, R.・加來久敏：日植病報 70(3):283, 2004

[備考] タイ、インドネシア

モロコシ

p.49

すす穂病 susuho-byo

Bipolaris sp.

西原夏樹：草地試験場研究資料 2:108, 1991

ダイズ p.51

† 急性枯死症 kyusei-koshi-sho Sudden death syndrome

(1) *Fusarium tucumaniae* T. Aoki, O'donnell, Yos. Homma & Lattanzi

青木孝之ら : 日植病報 70(3):220, 2004

[備考] アメリカ合衆国、アルゼンチン。接種試験なし

(2) *Fusarium virguliforme* O'Donnell & T. Aoki

青木孝之ら : 日植病報 70(3):220, 2004

[備考] アメリカ合衆国、アルゼンチン。接種試験なし

† 根腐症 negusare-sho Root rot

Cylindrocladium floridanum Sober & Seymour

内藤繁男・Djaeni, M. : 日植病報 71(1):84, 2005

[備考] インドネシア

フジマメ p.52***

Lablab purpureus (L.) Sweet

ウイルス Virus

(1) *Bean common mosaic virus*

(2) *Cowpea aphid-borne mosaic virus*

(3) *Cowpea mosaic virus*

(4) *Cowpea mottle virus*

(5) *Cowpea severe mosaic virus*

(6) *Cucumber mosaic virus*

(7) *Southern bean mosaic virus*

(8) *Tobacco mosaic virus*

Odedara, O. O. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 74(4):322, 2008

[備考] ナイジェリア。ELISAによる検出

インゲンマメ p.52

† 根腐病 negusare-byō Root rot

Fusarium phaseoli (Burkholder) T. Aoki & O'Donnell

青木孝之ら : 日植病報 70(3):220, 2004

[備考] アメリカ合衆国。接種試験なし

シカクマメ p.52***

† † † 赤渋病 akashibu-byō Orange gall

Synchytrium psophocarpi (Raciborsky) Gaumann

本藏洋一ら : 日植病報 66(3):274, 2000

[備考] タイ国

ジャガイモ

p.54

Bacterial stem rot

Dickeya dianthicola Samson, Legendre, Christen, Saux, Achouak & Gardan 2005

Suharjo, R. et al. : 日植病報75(3):272, 2009

特用作物 Industrial crops

1. 新病名・病原追加/学名/病名変更・文献追加等

デイ儿

p.57

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

Oidium sp.

小板橋基夫・西村範夫 : 日植病報 69(1):21, 2003

[備考] *Pseudoidium*亜属。 *Erysiphe heraclei*に似る

トウキ

p.57

苗立枯病 nae-tachigare-byo Damping-off

Rhizoctonia solani Kühn

前川和正・相野公孝 : 日植病報 65(3):408, 1999 ; 前川和正ら : 関西病虫研報 46:43, 2004

[備考] 菌糸融合群 AG-4, 培養型 IIIA

フエンネル

p.57***

Foeniculum vulgare P. Mill. Sweet fennel

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

Oidium sp.

竹内 純ら : 日植病報 71(1):33, 2005

[備考] *Pseudoidium*亜属

オケラ類

p.59

白絹病 shirakinu-byo Southern blight

Sclerotium rolfsii Saccardo

星 秀男ら : 関東病虫研報 50:109, 2003

[備考] 宿主追加。シナオケラ(*A. lancea* DC. var. *chinensis* Kitam.)に発生

ベニバナ

p.59

萎凋病 icho-byo Fusarium wilt

Fusarium oxysporum Schlechtendahl: Fries

佐藤利美ら : 北日本病虫研報 59:90, 2008

立枯病 tachigare-byo Stem and root rot

Rhizoctonia solani Kühn

竹内 純・堀江博道：関東病虫研報 45:131, 1998

[備考] 菌糸融合群 AG-2-2. 培養型 IIIB

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

(1) *Colletotrichum acutatum* Simmonds ex Simmonds

植松清次ら：日植病報 70(1):47, 2004；植松清次ら：日植病報 70(3):219, 2004

[備考] 逸見の *C. carthami* とされる標本も *C. acutatum* と再同定された

(注) 病原追加

カミツレ

p.60***

Matricaria chamomilla L.

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

(1) *Sphaerotheca fusca* (Fries) Blumer

丹田誠之助：東農大農学集報 43(3):159, 1998

(2) *Oidium* sp.

竹内 純ら：日植病報 71(1):33, 2005

[備考] *Reticuloidium* 亜属

ナタネ (ナバナ)

p.61

花腐細菌病 hanagusare-saikin-byo Bacterial bud rot

(1) *Pseudomonas marginalis* (Brown 1918) Stevens 1925

佐藤 圭ら：日植病報 65(3):360, 1999

[備考] 本病原のpathovarは未決定

(2) *Pseudomonas viridisflava* (Burkholder 1930) Dowson 1939

佐藤 圭ら：日植病報 65(3):360, 1999

灰色かび病 haiiro-kabi-byo Gray mold

Botrytis cinerea Persoon: Fries

向畠博行：北陸病虫研報 46:97, 1998；向畠博行：北陸病虫研報 54:49, 2005

立枯病 tachigare-byo damping-off

Rhizoctonia solani Kühn

窪田昌春ら：日植病報 75(3):170, 2009；窪田昌春ら：日植病報 75(3):238, 2009

[備考] 菌糸融合群AG-2-1, 培養型 II

ホップ

p.63

矮化病 waika-byo Stunt

(1) *Apple fruit crinkle viroid*

Sano, T. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 70(3):181, 2004

(注) これにより *Hop stunt viroid* は(2)となる

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

(1) *Oidium* sp.

原田幸雄・佐野輝男：日植病報 70(1):49, 2004；勝部和則ら：日植病報 70(1):53, 2004

[備考] 病原は*Oidium*属の*Fibroidum*

(注) これにより *Sphaerotheca intermedia* は(2)となる

コロシントウリ Bitter gourd, Cucurbita, Bitter cucumber p.66***

Citrullus colocynthis (L.) Schrad.

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

Oidium citrulli Yen & Wang

丹田誠之助：東農大農学集報 43(3):159, 1998

サトウキビ p.68

斑点病 hanten-byo Leaf spot

Curvularia lunata (Wakker) Boedijn

西 菜穂子ら：日植病報 74(2):118, 2008

センブリ p.68***

Swertia japonica (Schult.) Makino

さび病 sabi-byo Rust

Uredo sp.

藤永真史ら：日植病報 65(3):411, 1999

ラベンダー p.70

疫病 eki-byo Phytophthora rot

(1) *Phytophthora nicotianae* van Breda de Haan

植松清次ら：関東病虫研報 55:191, 2008

(2) *Phytophthora* sp.

出射 立・粕山新二：日植病報 60(6):777, 1994

メハジキ p.70***

Leonurus japonicus Houttuyn

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

Oidium leonuri-sibiricae Sawada

丹田誠之助：東農大農学集報 43(3):159, 1998

レモンバーム Lemon Balm p.71***

Melissa officinalis L.

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

Oidium sp.

有賀麻貴ら：日植病報 66(3):272, 2000

[備考] *Erysiphe cichoracearum*型

ミント類

p.71

スペアミント (ミドリハッカ)

白絹病 shirakinu-byo Southern blight

Sclerotium rolfsii Saccardo

前川和正ら：日植病報 66(3):302, 2000；前川和正ら：関西病虫研報 46:45, 2004

[備考] ペペーミントに発生

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

Oidium sp.

丹田誠之助：東農大農学集報 43(3):159, 1998；有賀麻貴ら：日植病報 66(3):272, 2000；

竹内 純ら：日植病報 71(1):33, 2005

[備考] 有賀らの報告は、*Erysiphe cichoracearum*型でアップルミントに発生。竹内らの報告は、*Reticuloidium*亜属でスペアミントに発生

ハナハッカ (オレガノ)

p.71***

Origanum vulgare L.

葉腐病 hagusare-byo Leaf blight

Rhizoctonia solani Kühn

竹内 純・堀江博道：関東病虫研報 53:65, 2006；窪田昌春ら：関西病虫研報 51:123, 2009

[備考] 菌糸融合群AG-1, 培養型 IB

ローズマリー (マンネンロウ) Rosemary

p.72***

Rosmarinus officinalis L.

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

(1) *Erysiphe galeopsidis* de Candolle

Tanda, S. & Hirose, T.: Jour. Agri. Sci., Tokyo Univ. Agric. 47(4):274, 2003

(2) *Oidium* sp.

竹内 純ら：日植病報 71(1):33, 2005

[備考] *Reticuloidium*亜属

セージ (セイヨウサルビア)

p.72***

Salvia officinalis L.

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

Oidium sp.

竹内 純ら：日植病報 71(1):33, 2005

[備考] *Reticuloidium*亜属

クロタラリア p.73

萎凋病 icho-byo Wilt

Fusarium sp.

水野はるから：日植病報 74(1):82, 2008

アマ p.74

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

Colletotrichum destructivum O'Gara

森脇丈治ら：日植病報 69(3):259, 2003

(注) 病原学名変更。アマ由来の*C. linicola*は*C. destructivum*に統合される

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

(1) *Erysiphe lini* Tanda [*Erysiphe polygoni* de Candole]

Tanda, S. & Hirose, T.: Jour. Agri. Sci., Tokyo Univ. Agric. 48(2):50, 2003

(注) 病原学名の変更

トロロアオイ p.75

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

Erysiphe abelmoschicola Tanda

Tanda, S. & Hirose, T.: Jour. Agri. Sci., Tokyo Univ. Agric. 48(2):50, 2003

ボウマ (チンマ、キリアサ、イチビ) p.76

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

Colletotrichum coccodes (Wallroth) Hughes

大久保博人・島貫忠幸：日植病報 65(3):407, 1999

[備考] イチビ *A. theophrasti* Medic.に発生

(注) 病原追加

ケナフ p.77

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

Oidium sp.

Tanda, S. & Hirose, T.: Jour. Agri. Sci., Tokyo Univ. Agric. 48(2):50, 2003

クワ p.79

暗斑病 anhan-byo Myrothecium leaf spot

(2) *Myrothecium verrucaria* (Albertini & Schweinitz) Ditmar: Fries

村上理都子ら：日植病報 66(6):657, 1999 ; Murakami, R. et al.:J. Gen. Plant Pathol. 71(2): 153, 2005

(注) これにより *Myrothecium noridum* は(1)となる

株腐朽病 kabu-fukyu-byo Wood decay

(1) *Auricularia polystricha* (Montagne) Saccardo アラゲキクラゲ

高橋幸吉ら : 日蚕講要 71:74, 2001

(2) *Flammulina velutipes* (Freis) Singer エノキダケ

木村勝太郎 : 四国女子大研紀要 20:1, 1977, 高橋幸吉ら : 日蚕講要 71:74, 2001

(3) *Phellinus ferruginosus* (Schrader: Fries) Bourdot & Galzin [*Fuscoporia ferruginosa* (Schrader: Freis) Murrill] サビアナタケ

木村勝太郎 : 原色日本桑樹病害図説 118, 1979, 高橋幸吉ら : 日蚕講要 71:74, 2001

(4) *Phellinus linteus* (Berkeley & Curtis) Teng [*Pyropolyporus yucatanensis* Murrill] メシマコブ

三宅市郎 : 蚕試報 1(5):301, 1916 (大5), 高橋幸吉ら : 日蚕講要 71:74, 2001

[備考] 三宅(1916)のメシマコブ学名 *Fomes rimosus* Berkeley は誤同定

(5) *Phellinus rimosus* (Berkeley) Pilkt オオメシマコブ

Imazeki, R. : Bull. Tokyo Sci. Mus. 6:104, 1943 (昭18), 高橋幸吉ら : 日蚕講要 71:74, 2001

(6) *Pleurotus ostreatus* (Fries) Quillet ヒラタケ

木村勝太郎 : 原色日本桑樹病害図説 116, 1979, 高橋幸吉ら : 日蚕講要 71:74, 2001

(7) *Schizophyllum commune* Fries スエヒロタケ

木村勝太郎 : 四国女子大研紀要 20:1, 1977, 高橋幸吉ら : 日蚕講要 71:74, 2001

(8) *Trametes hirsuta* (Wulfen: Fries) Pilkt アカゲカワラタケ

高橋幸吉ら : 日蚕講要 71:74, 2001

(9) *Trametes viresicoler* (Linnaeus: Freis) Pilkt [*Coriolous versicolor* (Linnaeus: Fries)

Ouellet] カワラタケ

木村勝太郎 : 四国女子大研紀要 20:1, 1977, 高橋幸吉ら : 日蚕講要 71:74, 2001

[備考] クワに発生記録のある材質腐朽菌による病名は、株腐病(*Phyllotopsis nidulans*

(Persoon: Fries) Singer キヒラタケ)を除き株腐朽病と総称する (高橋幸吉ら : 日蚕講要 71:74, 2001)

苗腐敗病 nae-fuhai-byo Rhizopus rot

Rhizopus oryzae Went & Prinsen Geerligs

Yoshida, S. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 67(4):291, 2001

エジプトヘンペイン Egyptian henbane p.86***

Hyoscyamus muticus L.

斑点病 hanten-byo Leaf spot

Cladosporium herbarum (Persoon:Fries) Link

Abdel-Motaal, F. F. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 75(6):437, 2009

シロガラシ	p.86
黒腐病 kurogusare-byo Black rot	
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i> (Pammel 1895) Dowson 1939	
瀧川雄一ら : 日植病報 71(1):38, 2005	
タバコ	p.86
根頭がんしゅ病 konto-ganshu-byo Crown gall	
<i>Agrobacterium tumefaciens</i> (Smith & Townsend 1907) Conn 1942	
下楠薦史華ら : 日植病報 69(3):306, 2003 ; Furuya, N. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 70(1):39, 2004	
[備考] Biovar I による	
カカオ	p.90***
果実腐敗病 kajitsu-fuhai-byo Lasiodiplodia pod rot	
<i>Lasiodiplodia theobromae</i> (Patouillard) Griffon & Maublanc	
福田有希子ら : 日植病報 73(1):40, 2007	
チャ	p.90
斑点細菌病 hanten-saikin-byo Bacterial spot	
<i>Acidovorax valerianellae</i> Garden, Stead, Dauga & Gillis 2003	
富濱 肅ら : 日植病報 72(4):185, 2006	
炭疽病 tanso-byo Anthracnose	
<i>Discula theae-sinensis</i> (I. Miyake) Moriwaki & Toy. Sato [<i>Gloeosporium theae-sinensis</i> Miyake, <i>Colletotrichum theae-sinensis</i> (Miyake) Yamamoto]	
Moriwaki, J. and Sato, T.: J. Gen. Plant Pathol. 75(5):359, 2009	
(注) 病原学名変更。文献追加	
ゲットウ	p.96***
<i>Alpinia zerumbet</i> (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Sm. (<i>A. speciosa</i> (J. C. Wendl.) K. Schum.)	
輪紋病 rimmon-byo Leaf spot	
<i>Phoma</i> sp.	
高江洲和子ら : 日植病報 67(2):168, 2001	
牧草及び芝草 Forage grasses, Legumes and Turf grasses	
1. 新病名・病原追加/学名/病名変更・文献追加等	
レッドトップ、ベントグラス	p.118
葉枯細菌病 hagare-saikin-byo Bacterial leaf blight	
<i>Xanthomonas</i> sp.	

小林真樹ら：日植病報 68(2):256, 2002

[備考] クリーピングベントグラス *A. stolonifera* var. *palustris*に発生

かさ枯病 kasagare-byo Halo blight

Pseudomonas syringae van Hall 1902

小林真樹ら：芝草研究 30(別 1):104, 2001；小林真樹ら：芝草研究 31(別 1):35, 2002

[備考] クリーピングベントグラス *A. stolonifera* var. *palustris*に発生

褐条病 katsujo-byo Brown stripe

Acidovorax avenae subsp. *avenae* (Manns 1909) Willemse, Goor, Thielemans, Gillis,

Kersters & De Ley 1992

小林真樹ら：日植病報 70(1):76, 2004；小林真樹ら：日植病報 70(3):285, 2004；小林真樹
ら：芝草研究 34(別1):42, 2005

[備考] クリーピングベントグラス *A. stolonifera* var. *palustris*に発生

バイポラリス葉枯病 *Bipolaris-hagare-byo* Bipolaris leaf blight

Bipolaris sorokiniana (Saccardo apud Sorokin) Shoemaker

早川敏広ら：日植病報 75(1):71, 2009

[備考] クリーピングベントグラスに発生

デッドスポット病 *dead spot-byo* Dead spot

Ophiosphaerella agrostis Dernoeden, C Mara, O'Neil, van Berkum & Palm

早川敏広・小林真樹：日植病報 70(3):225, 2004

[備考] クリーピングベントグラス *A. stolonifera* var. *palustris*に発生

ドレクスレラ葉枯病 *Drechslera-hagare-byo* Drechslera leaf blight

(1) *Drechslera catenaria* (Drechsler) Ito

(2) *Drechslera* sp.

早川敏広ら：日植病報 75(3):206, 2009

[備考] クリーピングベントグラスに発生。早川ら(2009)は斑点病菌(*D. erythrosipa*)も同様の症状を引き起こすとした

フェアリーリング病 *fairy ring-byo* Fairy rings

(1) *Bovista dermoxantha* (Vittadini) de Toni [*B. pusilla* (Batsch: Persoon) Persoon,

Lycoperdon pusillum Batsch ss. Hollós non Batsch] チビホコリタケ

(2) *Conocybe lactea* (J. Lange) Métrod キコガサタケ

(3) *Vascellum curtisii* (Berkeley) Kreisel [*Lycoperdon curtisii* Berkeley & Curtis,

Lycoperdon wrightii Berkeley & Curtis] ヒダホコリタケ

Terashima, Y. et al.: Mycoscience 45:251, 2004

[備考] 接種試験なし。クリーピングベントグラス

葉腐病 hagusare-byo Summer blight, Rhizoctonia rot, Brown patch

Rhizoctonia solani Kühn

早川敏広ら：日植病報 74(1):16, 2008

[備考]主として菌糸融合群AG-2-2（培養型ⅢB），ときにAG-1（IB）によっておきる。完全世代*Thanatephorus cucumeris* (Frank) Donkは未確認。ブラウンパッチと通称される

(注) 文献追加

いもち病 imochi-byo Blast

Pyricularia sp.

佐々木伸浩ら：日植病報 76(1):42, 2010

[備考] クリーピングベントグラス

褐色リング葉腐病* (白葉腐病) kasshoku-ring-hagusare-byo Brown ring patch

Waitea circinata Warcup & Talbot var. *circinata* Gunnel [*Rhizoctonia oryzae* Ryker & Gooch]

反保宏之ら：芝草研究 18(2):125, 1990; Toda, T. et al.: Plant Dis. 89:536, 2005

[備考] 初め反保ら(1990)が*R. oryzae*による白葉腐病として報告したが、Toda et al.(2005)は病原菌を*W. circinata* var. *circinata*と再同定した。クリーピングベントグラス

(注) これにより白葉腐病の項は削除

ピシウム病 *Pythium*-byo Pythium blight

(1) *Pythium arrhenomanes* Drechsler

田村季実子ら：芝草研究大会誌 別1号 32:112, 2003

[備考] クリーピングベントグラスに発生。

(注) 病原追加。日本植物病名目録p.119本病の備考欄の「既知の*Pythium* sp.との異同について記載がない」は削除する

(4) *Pythium volutum* Vanterpool & Truscott

田村季実子・米山勝美：日植病報 70(1):47, 2004

[備考] クリーピングベントグラスに発生

(注) 病原追加。これにより(1) *Pythium graminicola*は(2)に、(2) *Pythium vanterpoolii*は(3)に、(3) *Pythium* sp.は(5)となる

赤褐色葉腐病 sekikasshoku-hagusare-byo Waitea reddish-brown patch

Rhizoctonia sp.

早川敏広ら：日植病報 68(1):82, 2002 ; Toda, T. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 73(6):379, 2007

[備考] 病原は*Waitea circinata*の既報の3変種いずれとも異なる新変種と推定された

炭疽病 Tanso-byo Anthracnose

(1) *Colletotrichum graminicola* (Cesati) Wilson

Moriwaki J. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 68(4):307, 2002

[備考] 接種試験なし。Crouch et al. (Phytopathology 96:46, 2006)は本病菌を*C. cereale* Mannsとした

(注) 病原追加。これにより, *Colletotrichum* sp.は(2)となる

葉鞘腐敗病 yosho-fuhai-byo Bacterial sheath brown rot

Pseudomonas fuscovaginae Miyajima, Tanii & Akita 1983

小林真樹ら : 日植病報 68(2):256, 2002 ; 林田美由貴ら : 日植病報 68(2):256, 2002

[備考] クリーピングベントグラス *A. stolonifera* var. *palustris*に発生

パラグラス

p.121

斑点病 hanten-byo Leaf spot

Bipolaris panici-miliacei (Nishikado) Shoemaker

月星隆雄ら : 日草誌 46(別):152, 2000

ミイラ穂病 miiraho-byo Black choke

Ephelis japonica Hennings [*Ephelis* sp.]

Tsukiboshi, T. et al.: JARQ 42(3):173, 2008

[備考] 接種試験なし

(注) 病原学名変更、文献追加

ローズグラス

p.123

褐点病 katten-byo

Curvularia verruculosa Tandom & Bilgrami ex Ellis

月星隆雄ら : Grassland Science 49(別):324, 2003

(注) 病原学名変更。これにより日本植物病名目録(p.123)の *Curvularia* sp.は削除する

オキナワミチシバ

p.123

ミイラ穂病 miiraho-byo Black choke

Ephelis japonica Hennings [*Ephelis* sp.]

Tsukiboshi, T. et al.: JARQ 42(3):173, 2008

[備考] 接種試験なし

(注) 病原学名変更、文献追加

バミューダグラス (ギヨウギシバ)

p.123

斑点病 hanten-byo Leaf spot

Cochliobolus peregrianensis Alcorn [= *Bipolaris peregrianensis* Alcorn]

月星隆雄ら : 芝草研究 34(別 1):36, 2005

褐条葉枯病 katsujo-hagare-byo Brown stripe
Cochliobolus heveicola Tsukiboshi & W. H. Chung
[=*Bipolaris heveae* (Petch) Arx emend. J. J. Muchovej & R. M. C. Muchovej]
Tsukiboshi, T. et al.: Mycoscience 46(1):17, 2005

ミイラ穂病 miiraho-byo Black choke
Ephelis japonica Hennings [*Ephelis* sp.]
Tsukiboshi, T. et al.: JARQ 42(3):173, 2008
[備考] 接種試験なし
(注) 病原学名変更、文献追加

ジャイアントスターングラス p.124

ミイラ穂病 miiraho-byo Black choke
Ephelis japonica Hennings [*Ephelis* sp.]
Tsukiboshi, T. et al.: JARQ 42(3):173, 2008
[備考] 接種試験なし
(注) 病原学名変更、文献追加

オーチャードグラス p.124

黄さび病 kisabi-byo Yellow rust
Puccinia striiformoides M. Abbasi, Hedjaroude & M. Scholler
菅原幸哉ら : 日植病報 72(4):209, 2006
[備考] 本病原は *P. striiformis* var. *dactylidis* Mannersとシノニムである

夏斑点病 natsu-hanten-byo
Cochliobolus sativus (Ito & Kurabayashi) Drechsler ex Dastur
[=*Bipolaris sorokiniana* (Saccardo) Shoemaker]
月星隆雄ら : Japanese J. of Grassland Science 51(別):436, 2005

パンゴラグラス p.126

ミイラ穂病 miiraho-byo Black choke
Ephelis japonica Hennings [*Ephelis* sp.]
Tsukiboshi, T. et al.: JARQ 42(3):173, 2008
[備考] 接種試験なし
(注) 病原学名変更、文献追加

センチピードグラス Centipedegrass p.127***

Eremochloa ophiuroides (Munro) Hack.

いもち病 imochi-byo Blast

Pyricularia sp.

富家和典ら：日植病報 70(1):73, 2004 ; 富家和典ら：日植病報 70(3):194, 2004

[備考] 富家らはrDNA解析から本病原菌を栽培植物寄生菌群に属するとした

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

Colletotrichum caudatum (Saccardo) Peck

富塚和典ら：日植病報 71(1):72, 2005 ; Fuke, K. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 72(1):74, 2006

ライグラス

p.129

葉鞘腐敗病 yosho-fuhai-byo Bacterial sheath brown rot

(2) *Pseudomonas* sp.

小林真樹ら：日植病報 76(1):62, 2010

[備考] ペレニアルライグラスに発生

ピシウム病 *Pythium*-byo Pythium blight

(2) *Pythium spinosum* Sawada

(3) *Pythium sylvaticum* Campbell & Hendrix

(4) *Pythium vanterpoolii* V. & H. Kouyeas

月星隆雄ら：日植病報 74(1):35, 2008

[備考] イタリアンライグラスに発生

(注) 病原追加。これにより *P. aristosporum* は(1)となる

葉鞘腐敗病 yosho-fuhai-byo Bacterial sheath brown rot

Pseudomonas fuscovaginae Miyajima, Tanii & Akita 1983

小林真樹ら：日植病報 68(2):256, 2002 ; 林田美由貴ら：日植病報 68(2):256, 2002

[備考] ペレニアルライグラス *L. perenne* に発生

パニカム

p.132

ごま葉枯病 goma-hagare-byo

Bipolaris sp.

月星隆雄ら：Grassland Science 49(別):324, 2003

[備考] ギニアグラス *P. maximum* に発生

いもち病 imochi-byo Blast

(1) *Pyricularia* sp. (LS-group)

井上 興ら：九州病虫研会報 45:131, 1999 ; 月星隆雄ら：Grassl. Sci. 49 (別) :324, 2003 ;

Tsukiboshi, T. et al.: Plant Dis. 93(12):1350, 2009

[備考] ギニアグラス *P. maximum*。月星ら(2003)は本病菌を *P. grisea* としたが、

Pyricularia sp. (LS-group)に訂正した (Tsukiboshi et al. 2009)

(注) 病原追加。これにより *Pyricularia* sp. は(2)となる

パスパルム p.132

ミイラ穂病 miiraho-byo Black choke

Ephelis japonica Hennings [*Ephelis* sp.]

Tsukiboshi, T. et al.: JARQ 42(3):173, 2008

[備考] ベージーグラス。接種試験なし

(注) 病原学名変更、文献追加

ブルーグラス p.136

フェアリーリング病 fairy ring-byo Fairy rings

(1) *Bovista dermoxantha* (Vittadini) de Toni [*B. pusilla* (Batsch: Persoon) Persoon, *Lycoperdon pusillum* Batsch ss. Hollós non Batsch] チビホコリタケ

(2) *Conocybe lactea* (J. Lange) Métrod キコガサタケ

(3) *Vascellum curtisii* (Berkeley) Kreisel [*Lycoperdon curtisii* Berkeley & Curtis, *Lycoperdon wrightii* Berkeley & Curtis] ヒダホコリタケ

Terashima, Y. et al.: Mycoscience 45:251, 2004

[備考] 接種試験なし。ケンタッキーブルーグラスブルーグラス

葉腐病 hagusare-byo Summer blight, Rhizoctonia rot, Brown patch

Rhizoctonia solani Kühn

早川敏広ら : 日植病報 74(1):16, 2008

[備考] 菌糸融合群AG-2-2 (培養型ⅢB) およびAG-1 (IB) によっておきる。完全世代

Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk は未確認。ケンタッキーブルーグラスに発生

(注) 文献追加

褐色雪腐病 kasshoku-yukigusare-byo Pythium snow blight

(2) *Pythium iwayamai* S. Ito

Masumoto, S. et al.: J. Jpn. Soc. Turfgrass Sci. 38(1):33, 2009

[備考] ケンタッキーブルーグラス (Masumoto et al., 2009)

(注) 文献追加

ネクロティックリングスポット病 necrotic ring spot-byo Necrotic ring spot

Ophiophaerella korrae J. Walker & A. Smith [= *Leptosphaeria korrae* J. Walker & A. Smith]

早川敏広ら : 芝草研究 33(別 1):24, 2004

[備考] ケンタッキーブルーグラス *P. pratensis* に発生

赤褐色葉腐病* sekikasshoku-hagusare-byo Waitea reddish-brown patch

Rhizoctonia sp.

Toda, T. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 73(6):379, 2007

[備考] 病原は *Waitea circinata* の既報の3変種いずれとも異なる新変種と推定された。接種試験なし

セントオーガスチングラス

p.137

黒穂病 kuroho-byo Smut

Ustilago affinis Ellis & Everheart

月星隆雄ら : 日草誌 46(別):152, 2000

[備考] 接種試験なし

シバ

p.137

フェアリーリング病 fairy ring-byo Fairy rings

(1) *Bovista dermoxantha* (Vittadini) de Toni [*B. pusilla* (Batsch: Persoon) Persoon, *Lycoperdon pusillum* Batsch ss. Hollós non Batsch] チビホコリタケ

Terashima, Y. et al.: Mycoscience 45:251, 2004; Terashima, Y. and Fujiie, A.; J. Jpn. Soc. Turfgrass Sci. 35:19, 2006

(2) *Conocybe lactea* (J. Lange) Métrod キコガサタケ

Terashima, Y. et al.: Mycoscience 45:251, 2004; Terashima, Y. and Fujiie, A.; J. Jpn. Soc. Turfgrass Sci. 35:19, 2006

(6) *Vascellum curtisii* (Berkeley) Kreisel [*Lycoperdon curtisii* Berkeley & Curtis, *Lycoperdon wrightii* Berkeley & Curtis] ヒダホコリタケ

Terashima, Y. et al.: Mycoscience 45:251, 2004

[備考] 病原(1),(2),(6)は接種試験なし。ハリシバ

(注) これにより(3)*Lycoperdon perlatum*, (4)*Lepista subnuda*, (5)*Marasmius oreades*となる

褐条葉枯病 katsujo-hagare-byo Brown stripe

Cochliobolus heveicola Tsukiboshi & W. H. Chung

[=*Bipolaris heveae* (Petch) Arx emend. J. J. Muchovej & R. M. C. Muchovej]

Tsukiboshi, T. et al.: Mycoscience 46(1):17, 2005

[備考] 月星ら (芝草研究 24(別 1):49, 1995) は本病をヘルミントスボリウム葉枯病と、また月星・森脇 (日本菌学会第43回大会講演要旨集 45, 1999) は病原菌を *C. stenosporilus* としたが、病名および病原学名を訂正した。ノシバに発生

ネクロティックリングスポット病 necrotic ring spot-byo Necrotic ring spot

Ophiosphaerella korrae J. Walker & A. Smith [= *Leptosphaeria korrae* J. Walker & A. Smith]

早川敏広ら : 芝草研究 33(別 1):24, 2004

[備考] ノシバ *Z. japonica* およびハリシバ *Z. matrella* に発生

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

Colletotrichum caudatum (Peck ex Saccardo) Peck

田中明美ら : 芝草研究 28 (別1) :70, 1999 ; 大久保博人ら : 日植病報 70(3):218, 2004

[備考] ハリシバ *Z. matrella*、シバ (ノシバ) *Z. japonica*に発生

クズ

p.144

アルタナリア葉枯病 *Alternaria-hagare-byo* Alternaria leaf spot

Alternaria sp.

澤柳利実ら : 日植病報 71(3):216, 2005

疫病 eki-byo Phytophthora blight

Phytophthora sp.

向畠博行・関原順子 : 日植病報 72(1):71, 2006 ; 向畠博行ら : 日植病報 72(4):207, 2006

[備考] 病原菌の形態記載なし

アカクローバ

p.147

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

(1) *Colletotrichum destructivum* O'Gara

西田 耕 : 盛岡たばこ試報告 2:7, 1964 ; 森脇丈治ら : 日植病報 69(3):259, 2003

(注) 病原追加。これにより, *Colletotrichum trifoliil*は(2)となる。日本植物病名目録p.149の本病に関わる備考欄を削除する。

シロクローバ

p.149

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

(1) *Colletotrichum destructivum* O'Gara

西田 耕 : 盛岡たばこ試報告 2:7, 1964 ; 森脇丈治ら : 日植病報 69(3):259, 2003

(注) 病原追加。これにより *Colletotrichum trifoliil*は(2)となる。日本植物病名目録p.152の本病に関わる備考欄の「・・また、西田 耕・・とした」を削除する

2. 付録

レッドトップ・ベントグラス

p.155

退色・生育不良

Pythium volutum Vanterpool & Truscott

田村季実子・米山勝美 : 日植病報 70(1):47, 2004

[備考] クリーピング・ベントグラスに発生

野草 Wild grasses

1. 新病名・病原追加/学名/病名変更・文献追加等

オモダカ類

p.162

斑点病 hanten-byo Leaf spot

Plectosporium tabacinum (van Beyma) M. E. Palm, W. Gams & Nirenberg

[*Cylindrocarpon sagittariae* Negishi]

Negishi, H.: Ann. Phytopath. Soc. Jpn. 62:495, 1996 ; 佐藤豊三 : 植物防疫62:491, 2008

[備考] オモダカ *S. latifolia* L.に発生。*C. sagittariae*は異名。病名は佐藤(2008)が提案

黒穂病 kuroho-byo Stem smut

(2) *Doassansia horiana* P. Hennings

Tanimoto, T. & Kusakari, S.: J. Gen. Plant Pathol. 66(4):289, 2000

[備考] オモダカ *S. latifolia* L., アオクワイ *S. trifolia* var. *edulis*に発生

(注) これにより *Doassansia disticha* は(1)となる

ケイトウ類 (ノゲイトウ)

p.162

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

Erysiphe celosiae Tanda

Tanda, S.: Mycoscience 41(2):155, 2000

[備考] ノゲイトウに発生

ミズバショウ類 (ミズバショウ)

p.162

さび病 sabi-byo Rust

(2) *Puccinia sessilis* Schneider

原田幸雄ら : 日植病報 65(6):664, 1999

[備考] 病原はクサヨシ上の *P. sessilis* の銹子腔世代である

カンアオイ

p.162***

Asarum spp.

白絹病 shirakinu-byo Southern blight

Sclerotium rolfsii Saccardo

今泉英理夏ら : 日植病報 65(3):408, 1999

[備考] カンアオイ (*A. nipponicum* F. Maek.) に発生

ブタクサ類

p.163

オオブタクサ *A. trifida* L.

さび病 sabi-byo Rust

Puccinia xanthii Schweinitz

福田達男・柿鳩 眞 : 日植病報 65(3):411, 1999

[備考] ブタクサ、オオブタクサに発生

アザミ類

p.164

ミネアザミ *C. inundatum* M. var. *alpicola* (N.) O.

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

Sphaerotheca fusca (Fries: Fries) Blumer emend. Braun-proparte

丹田誠之助：東農大農学集報 45(2):122, 2000

[備考] ミネアザミに発生

ムカシヨモギ類

p.164

ヒメジオン *Erigeron annuus* L. (*E. annuus* (L.) Pers.)

ハルジオン *Erigeron annuus* L. (*E. philadelphicus* L.)

ヒメムカシヨモギ *Erigeron canadensis* L.

白粉病 hakufun-byo Frosty mildew

Cercosporaella virgaureae (Thümen) Allescher

澤田謙吉：林試研報 105:86, 1958 ; 小川久美子ら：日植病報 69(3):261, 2003

[備考] 澤田（1958）の記載したヒメムカシヨモギ円星病菌 (*Cercosporaella cana* (Saccardo) Saccardo)、ヒメジオン円白斑病菌 (*Ramularia erigerontis-annuui* Sawada) は、Braun (1995) により、本病原菌の異名とされた。先に、*Septoria erigerontis* Berkeley & Curtisによるヒメジオン円星病があるため、本病原菌による病名は白粉病と改められた。ヒメジオン、ヒメムカシヨモギに発生

円星病 maruhoshi-byo Circular leaf spot

Septoria erigerontis Berkeley & Curtis

Hirayama, T.: Mem. Fac. Agr., Kyoto Imp. Univ. 13(3):37, 1931 ; 澤田謙吉：林試研報 105:58, 1958 ; 小川久美子ら：日植病報 69(3):261, 2003

[備考] ヒメジオン、ハルジオンに発生。病原性は酒井ら(2000)により確認

ハハコグサ類

p.165

菌核病 kinkaku-byo

Sclerotinia sp.

稻田 稔ら：九病虫研会報 51:99, 2005

[備考] ハハコグサに発生

ヤブタビラコ類

p.166

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

(1) *Oidium asteris-punicei* Peck

丹田誠之助：東農大農学集報 45(2):122, 2000

[備考] ヤブタビラコ *L. humilis* (Thunb.) Makinoに発生

(2) *Oidium* sp.

稻田 稔ら：九病虫研会報 51:99, 2005

[備考] 分生子発芽管は*Fuliginea*型。コオニタビラコ (*L. apogonoides*) に発生

キオン類

p.166

エゾオグルマ *S. psuedoarnica* Less.

さび病 sabi-byo Rust

Coleosporium tussilaginis (Persoon) Léveillé

Kaneko, S.: Rept. Tottori Mycol. Inst. (Japan) 19:62, 1981 ; Harada, Y.: Mycoscience 35:295, 1994

[備考] エゾオグルマに発生

アキノキリンソウ類

p.166

セイタカアワダチソウ *Solidago altissima* L. Tall goldenrod

斑点細菌病 hanten-saikin-byo Bacterial leaf spot

Pseudomonas syringae van Hall 1902

佐藤 守ら : 日植病報 65(3):360, 1999

[備考] セイタカアワダチソウに発生

白粉病 hakufun-byo Frosty mildew

Cercospora virgaureae (Thümen) Allescher

澤田謙吉 : 林試研報 102:93, 1958 ; 澤田兼吉 : 林試研報 105:35, 1961 ; 小川久美子ら : 日植病報 69(3):261, 2003

[備考] 多角斑病を白粉病に改名する。ムカシヨモギ類白粉病の備考欄を参照。

Solidago virgaurea L. subsp. *asiatica* Kitouに発生

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

Oidium asteris-punicei Peck

丹田誠之助 : 東農大農学集報 45(2):122, 2000

[備考] ヨガネギク *S. virgaurea* L. var. *leiocarpa* (Benth.) Miq.に発生

タンポポ類

p.167

セイヨウタンポポ *T. officinale* Weber

白絹病 shirakinu-byo Southern blight

Sclerotium rolfsii Saccardo

前川和正ら : 日植病報 66(3):302, 2000 ; 前川和正ら : 関西病虫研報 46:47, 2004

[備考] セイヨウタンポポに発生

オニタビラコ類

p.167

菌核病 kinkaku-byo Sclerotinia rot

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary

菅野博英・大久保博人 : 北日本病虫研報 50:115, 1999

[備考] コオニタビラコに発生

カラハナソウ類

p.168

褐斑病 kappan-byo Brown leaf spot

Pseudocercospora humuli (Hori) Guo & Liu

今泉英理夏ら：日植病報 65(5):557, 1999

[備考] カナムグラに発生

(注) 文献追加

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

(1) *Fibrodiwm* sp.

神谷敏広ら：日植病報 70(3):213, 2004

[備考] *Fuliginea*型。カラハナソウ (*Humulus lupulus* var. *cordifolius*) に発生

(2) *Oidium* sp.

原田幸雄・佐野輝男：日植病報 70(1):49, 2004

[備考] カラハナソウに発生

ヒルガオ類

p.169

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

Erysiphe convolvuli de Candolle

丹田誠之助：東農大農学集報 45(2):122, 2000

[備考] コヒルガオ *C. hederacea* Wallich に発生

サツマイモ類 *Ipomoea* spp.

p.169

マルバアメリカアサガオ *I. hederacea* (L.) Jacq. var. *integriuscula* A. Gray

マメアサガオ *I. lacunosa* L.

ホシアサガオ *I. triloba* L.

白さび病 shirosabi-byo White rust

(1) *Albugo ipomoeae-hardwickii* Sawada

[備考] マルバアメリカアサガオに発生

(2) *Albugo ipomoeae-panduratae* (Schweinitz) Swingle f. sp. *lacunosae* Toy. Sato & Y.

Degawa

[備考] マメアサガオに発生

(3) *Albugo ipomoeae-panduratae* (Schweinitz) Swingle f. sp. *trilobae* Toy. Sato & Y.

Degawa

[備考] ホシアサガオに発生

出川洋介ら：神奈川自然誌資料 29:45, 2008；佐藤豊三ら：日植病報 75(1):46, 2009；

Sato, T. et al.; J. Gen. Plant Pathol. 75(1):46, 2009

カラスウリ

p.170***

Trichosanthes cucumeroides (Ser.) Maxim.

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

Oidium sp.

星 秀男ら：日植病報 75(3):204, 2009

[備考] *Reticuloidium* 亜属

- スゲ類** p.170
ビロードスゲ *C. fedia* Nees var. *miyabei* (Franch.) T. Koyama
さび病 sabi-byo Rust
(1) *Puccinia carieis* Rebentisch
Ito, S.: Mycological Flora of Japan 2(3):183, 1950 ; Hiratsuka, N. et al.: The Rust Flora of Japan p.619, 1992 ; Harada, Y.: Mycoscience 35:195, 1994
[備考] ビロードスゲに発生
(注) これにより *P. carieis-molliculae* H. & P. Sydow は(2)となる
- カヤツリグサ類** p.170
シロカヤツリグサ *C. alternifolius* L.
灰色葉枯病 hairo-hagare-byo Gray leaf blight
Ascochyta papynicola Tassi
Kobayashi, T. & Okamoto, T.: J. Agr. Sci., Tokyo Univ. Agr. 48(3):89, 2003
[備考] シロカヤツリグサ *C. alternifolius* L.に発生
- 褐斑病** kappan-byo Ascochyta leaf spot
Ascochyta cyperiphthora Pomella & Barreto
今関美菜子ら : 日植病報 70:226, 2004
[備考] カヤツリグサ *C. microiria* に発生
- ヤマノイモ類** p.171
本項に記載されていた葉枯線虫病*と植物寄生性線虫は野菜のヤマノイモ類 p.232に移動
- ケマンゾウ類** p.172***
キケマン *Corydalis heterocarpa* Siebold & Zucc. var. *japonica* (Franch. & Sav.) Ohwi
白絹病 shirakinu-byo Southern blight
Sclerotium rolfsii Saccardo
星 秀男ら : 関東病虫研報 50:109, 2003
- オヒゲシバ類** p.175
ミイラ穂病 miiraho-byo Black choke
Ephelis japonica Hennings [*Ephelis* sp.]
Tsukiboshi, T. et al.: JARQ 42(3):173, 2008
[備考] ムラサキシマヒゲシバ、ヒメヒゲシバ。接種試験なし
(注) 病原学名変更、文献追加
- メヒシバ類** p.175
ミイラ穂病 miiraho-byo Black choke (病原追加)

Ephelis japonica Hennings [*Ephelis* sp.]

Tsukiboshi, T. et al.: JARQ 42(3):173, 2008

[備考] アキメヒシバ。接種試験なし

(注) 病原学名変更、文献追加

アブラススキ類

p.175

さび病 sabi-byo Rust

Puccinia miyoshiana Dietel

Kobayashi, T. & Okamoto, T.: J. Agr. Sci., Tokyo Univ. Agr. 48(3):89, 2003

[備考] アブラススキ *E. citulifer*に発生

(注) 文献追加

ヒエ類

p.175

ミイラ穂病 miiraho-byo Black choke

Ephelis japonica Hennings [*Ephelis* sp.]

Tsukiboshi, T. et al.: JARQ 42(3):173, 2008

[備考] イヌヒエ。接種試験なし

(注) 病原学名変更、文献追加

カゼクサ類

p.176

ミイラ穂病 miiraho-byo Black choke

Ephelis japonica Hennings [*Ephelis* sp.]

Tsukiboshi, T. et al.: JARQ 42(3):173, 2008

[備考] カゼクサ。接種試験なし

(注) 病原学名変更、文献追加

ナルコビエ類

p.176

ムラサキノキビ *Eriochloa procera* (Retz.) C. E. Hubb.

ミイラ穂病 miiraho-byo Black choke

Ephelis japonica Hennings

Tsukiboshi, T. et al.: JARQ 42(3):173, 2008

[備考] ムラサキノキビ。接種試験なし

チガヤ類

p.177

ミイラ穂病 miiraho-byo Black choke (病原追加)

Ephelis japonica Hennings [*Ephelis* sp.]

Tsukiboshi, T. et al.: JARQ 42(3):173, 2008

[備考] チガヤ。接種試験なし

(注) 病原学名変更、文献追加

アゼガヤ類 p.178

ミイラ穂病 miiraho-byo Black choke

Ephelis japonica Hennings [*Ephelis* sp.]

Tsukiboshi, T. et al.: JARQ 42(3):173, 2008

[備考] イトアゼガヤ。接種試験なし

(注) 病原学名変更、文献追加

ススキ類 p.178

ミイラ穂病 miiraho-byo Black choke

Ephelis japonica Hennings [*Ephelis* sp.]

Tsukiboshi, T. et al.: JARQ 42(3):173, 2008

[備考] ススキ。接種試験なし

(注) 病原学名変更、文献追加

紫眼斑病 murasaki-ganhan-byo Violet eye spot

Ascochyta miscanthi Tak. Kobayashi & T. Okamoto

Kobayashi, T. & Okamoto, T.: J. Agr. Sci., Tokyo Univ. Agr. 48(3):89, 2003

[備考] ハチジョウススキ *M. sinensis* var. *condensatus* に発生

ヌマガヤ類 *Molinopsis* spp. p.178***

ヌマガヤ *Molinopsis japonica* (Hack.) Hayata

さび病 sabi-byo Rust

Puccinia moliniae Tulasne

仲谷房治：北日本病虫研報 56:55, 2005 ; 仲谷房治・原田幸雄：北日本病虫研報 59:77, 2008

キビ類 p.179

ミイラ穂病 miiraho-byo Black choke

Ephelis japonica Hennings

Tsukiboshi, T. et al.: JARQ 42(3):173, 2008

[備考] ハイキビ。接種試験なし

スズメノヒエ類 p.179

ミイラ穂病 miiraho-byo Black choke

Ephelis japonica Hennings [*Ephelis* sp.]

Tsukiboshi, T. et al.: JARQ 42(3):173, 2008

[備考] スズメノヒエ、スズメノコヒエ。接種試験なし

(注) 病原学名変更、文献追加

チカラシバ類 p.179

ミイラ穂病 miiraho-byo Black choke (病原追加)

Ephelis japonica Hennings [*Ephelis* sp.]

Tsukiboshi, T. et al.: JARQ 42(3):173, 2008

[備考] チカラシバ。接種試験なし

(注) 病原学名変更、文献追加

イチゴツナギ類

p.180

炭疽病* tanso-byo Anthracnose

Colletotrichum graminicola (Cesati) Wilson

宮部克宏ら : 日植病報 65(3):398, 1999

[備考] スズメノカタビラに発生

イグサ類

p.182

クサイ *J. tenuis* Willd.

さび病 sabi-byo Rust

Uromyces junci (Desmazières) Tuasne

Harada, Y.: Mycoscience 35:295, 1994

[備考] クサイに発生

オドリコソウ類

p.182

Lamium spp.

ホトケノザ *Lamium amplexicaule* L.

こぶ病 kobu-byo Bacterial gall

Rhizobacter dauci Goto & Kuwata 1988

Kawarazaki, H. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 75(3):235, 2009

[備考] ホトケノザに発生

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

Oidium sp.

内田景子ら : 日植病報 68(2):189, 2002

[備考] *Sphaerotheca fuliginea*型で、*S. fusca*の不完全世代と思われ、キュウリなどのウリ科植物に感染できる。ホトケノザ *L. amplexicaule* L.に発生。接種試験なし

シロネ類

p.182***

Lycopus spp.

白絹病 shirakinu-byo Southern blight

Sclerotium rolfsii Saccardo

星 秀男ら : 関東病虫研報 50:109, 2003

[備考] ヒメシロネ(*L. maackianus* (Maxim.) Makino)に発生

オオバタンキリマメ（トキリマメ） p.184***

***Rhynchosia acuminatifolia* Makino**

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

Colletotrichum gloeosporioides (Penzig) Penzig & Saccardo

原田美貴子ら：日植病報 71(3):221, 2005

[備考] サラサドウダンへの病原性確認

ハマアズキ（ハマササゲ） p.184***

***Vigna marina* (Burm.) Merr.**

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

Sphaerotheca phaseoli (Zhao) Braun

丹田誠之助・中島千晴：東農大農学集報 47(1):54, 2002

エンレイソウ類 p.184

シロバナエンレイソウ *T. tschonoskii* Maximowicz

菌核病 kinkaku-byo Sclerotinia rot

Scletotinia trillii Y. Harada & Narumi

Narumi, T. et al.: Mycoscience 42:181, 2001

[備考] エンレイソウ、ミヤマエンレイソウ、シロバナエンレイソウに発生

(注) 新病原名。これにより日本植物病名目録p.184の病原*Scletotinia* sp.は削除する

タケニグサ類 p.185***

タケニグサ *Macleya cordata* R. Br.

斑点細菌病 hanten-saikin-byo Bacterial leaf spot

Acidovorax valerianellae Gardan, Stead, Dauga & Gillis 2003

瀧川雄一ら：日植病報74(3):255, 2008

エノキアオイ p.185***

***Malvastrum coromandelianum* (L.) Garcke**

エネーション病 *enation*-byo Enation

Malvastrum enation virus

大貫正俊ら：日植病報 68(2):238, 2002

ミズタマソウ p.185***

***Circaeа mollis* Siebold & Zuccarini**

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

Erysiphe circaeae Junell

丹田誠之助：東農大農学集報 45(2):122, 2000

カタバミ類 p.185

褐斑病 kappan-byo Brown spot

Pseudocercospora oxalidis (Goh & S. Y. Hsieh) U. Braun

今泉英理夏ら : 43回日菌講 44, 1999 ; Kobayashi, T. & Okamoto, T.: J. Agr. Sci., Tokyo

Univ. Agr. 48(3):89, 2003

[備考] ムラサキカタバミ *O. corymbosa* DCに発生

キケマン

p.185***

***Corydalis heterocarpa* Shieb. & Zucc. var. *japonica* Ohwi**

白絹病 shirakinu-byo Southern blight

Sclerotium rolfsii Saccardo

星 秀男ら : 関東病虫研報 50:109, 2003

オオバコ類

p.186

モザイク病 mosaic-byo Mosaic

Plantago asiatica mosaic viurs (PIAMV)

高橋修一郎ら : 日植病報 69(3):330, 2003

[備考] オオバコに発生

白絹病 shirakinu-byo Southern blight

Sclerotium rolfsii Saccardo

星 秀男ら : 関東病虫研報 50:109, 2003

[備考] ヘラオオバコに発生

タデ類

p.186

斑点病 hanten-byo Mycosphaerella leaf spot

Mycosphaerella polygoni-cuspidati Hara

黒瀬大介ら : 日植病報 74(3):279, 2008

[備考] イタドリに発生

スペリヒュ

p.187

菌核病 kinkaku-byo Sclerotinia rot

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary

菅野博英・大久保博人 : 日植病報 64(6): 611, 1998 ; 菅野博英・大久保博人 : 北日本病

虫研報 50:115, 1999

センニンソウ類

p.188

褐斑病 kappan-byo Brown spot

Ascochyta vitaliae Briard & Hariot

Kobayashi, T. & Okamoto, T.: J. Agr. Sci., Tokyo Univ. Agr. 48(3):89, 2003

[備考] ムニンセンニンソウ *C. terniflora* var. *boninensis* (Hayata) Tamuraに発生

キジムシロ

p.188***

Potentilla fragarioides L. var. *major* Maxim.

白絹病 shirakinu-byo Southern blight

Sclerotium rolfsii Saccardo

星 秀男ら : 関東病虫研報 50:109, 2003

ヘクソカズラ類

p.189

灰褐斑病 hai-kappan-byo Grayish brown spot

Phyllosticta boninense Tak. Kobayashi & T. Okamoto

Kobayashi, T. & Okamoto, T.: J. Agr. Sci., Tokyo Univ. Agr. 48(3):89, 2003

[備考] ヘクソカズラ *P. scandens* に発生

角斑病 kakuhan-byo Angular spot

Pseudocercospora paedericola Nakashima & Tak. Kobayashi

山本和太郎・前田己之助 : 兵庫農大研報 農生編 4:67, 1960 ; Katsuki, S.: Trans. Mycol. Soc. Japan, Extra Issue 1:56, 1965 ; Kobayashi, T. & Okamoto, T.: J. Agr. Sci., Tokyo Univ. Agr. 48(3):87, 2003

[備考] ヘクソカズラ *P. scandens* に発生

ペスタロチア病 *Pestalotia*-byo Pestalotia disease

Pestalotiopsis adusta (Ellis & Everhart) Steyaert

Kobayashi, T. & Okamoto, T.: J. Agr. Sci., Tokyo Univ. Agr. 48(3):89, 2003

[備考] ヘクソカズラ *P. scandens* に発生

さび病 sabi-byo Rust

Coleosporium eupaederiae L. Guo [*Coleosporium paederiae* Dietel]

Kobayashi, T. & Okamoto, T.: J. Agr. Sci., Tokyo Univ. Agr. 48(3):89, 2003

[備考] ヘクソカズラ *P. scandens* に発生

クワガタゾウ類

p.189

オオイヌノフグリ *Veronica persica* Poir.

こぶ病 kobu-byo Bacterial gall

Rhizobacter dauci Goto & Kuwata 1988

Kawarazaki, H. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 75(3):235, 2009

[備考] オオイヌノフグリに発生

ナス類

p.189

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

Oidium sp.

丹田誠之助・須賀里絵：東農大農学集報 47(3):141, 2002

[備考] アメリカイヌホオズキ *S. americanum* Mill. に発生

(注) 文献および宿主追加

ボタンボウフウ

p.190***

Peucedanum japonicum Thunberg ex Murray

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

Erysiphe heraclei de Candolle

丹田誠之助：東農大農学集報 45(2):122, 2000

2. 付録

フシザキソウ類 *Synedrella* spp.

p.190***

Ageratum yellow vein virus

大貫正俊ら：日植病報 74(1):32, 2008

[備考] フシザキソウに発生。RT-PCRによる検出

エノキグサ類 *Acalypha* spp.

p.190***

Ageratum yellow vein virus

大貫正俊ら：日植病報 74(1):32, 2008

[備考] エノキグサに発生。RT-PCRによる検出

ザゼンソウ類 *Symplocarpus* spp.

p.190***

ヒメザゼンソウ *S. nipponicus* Makino

Pseudodidymaria symplocarpi Yas. Ono & Tak. Kobayashi

Ono, Y. and Kobayashi, T.: Mycoscience 46:352, 2005

[備考] ヒメザゼンソウ

オオバコ

p.191***

Cercospora plantaginis Saccardo [*Cercospora apii* sensu lato]

Nakashima C.: Mycoscience 45:116, 2004

[備考] 接種試験なし

リュウキュウボタンヅル

p.191***

Clematis grata Wallich var. *ryukyuensis* Tamura

Pseudocercosporella ranunculacearum Braun

Nakashima, C.: Mycoscience 45:116, 2004

[備考] 接種試験なし

野菜 Vegetables

1. 新病名・病原追加/学名/病名変更・文献追加等

メセンブリアンテマ（メセン）類 p.194***

***Mesembryanthemum* spp.**

灰色かび病 hairo-kabi-byo Gray mold

Botrytis cinerea Persoon: Fries

前田一行ら：日植病報 75(3):189, 2009

[備考] アイスプランツに発生

こうがいかび病 kogai-kabi-byo Choanephora rot

Choanephora cucurbitarum (Berkeley & Ravenel) Thaxter

萱野佑典ら：日植病報 75(1):51, 2009

[備考] アイスプランツ(*M. crystallinum* L.)に発生

ツルナ p.194

黄化えそ病 oka-eso-byo Yellow disease

Watermelon silver mottle virus

田場 聰ら：日植病報 66(2):146, 2000

灰色かび病 hairo-kabi-byo Gray mold

Botrytis cinerea Persoon: Fries

栄森弘己・竹内 純：関東病虫研報 51:59, 2004

黒枯病 kurogare-byo *Ulocladium* blight

Ulocladium sp.

竹内 純ら：日植病報 74(3):179, 2008

サトイモ p.194

立枯細菌病 tachigare-saikin-byo Bacterial corm and root rot

(1) *Erwinia carotovora* subsp. *carotovora* (Jones 1901) Bergey, Harrison, Breed, Hammer & Huntoon 1923

土屋健一ら：日植病報 72(4):306, 2006

[備考] タイモに発生。

(注) 病原追加。*E. chrysanthemi*は(2)となる

ウド p.195

萎黄病 io-byo *Fusarium* wilt

(1) *Fusarium oxysporum* Schlechtendahl: Fries

星 秀男ら：日植病報 66(3):273, 2000

[備考] 病原追加

(注) これにより *Fusarium solani*は(2)となる

黒斑病 kokuhan-byo Leaf spot

(1) *Alternaria panax* Whetzel

Zhang, M. et al.: Plant Dis. 93(11):1215, 2009

(注) これにより *Alternaria* sp. は(2)となる

ツルムラサキ

p.196

軟腐病 nampu-byo Bacterial soft rot

Erwinia chrysanthemi Burkholder, McFadden & Dimock 1953

加藤智弘ら : 北日本病虫研報 53:70, 2002

疫病 eki-byo Phytophthora rot

Phytophthora drechsleri Tucker

川村明日香ら : 日植病報 74(1):68, 2008

腐敗病 fuhai-byo Rot

Pythium aphanidermatum (Edson) Fitzpatrick

東條元昭ら : 日植病報 72(4):206, 2006

灰色かび病 haiiro-kabi-byo Gray mold

Botrytis cinerea Persoon: Fries

菅野博英・本藏良三 : 北日本病虫研報 49:91, 1998

半身萎凋病 hanshin-icho-byo Verticillium wilt

Verticillium dahliae Klebahn

菅野博英・堀内誠三 : 北日本病虫研報 50: 120, 1999

菌核病 kinkaku-byo Sclerotinia rot

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary

菅野博英・大久保博人 : 日植病報 64(6):611, 1998

紫斑病 shihan-byo Purple spot

Fusarium proliferatum (Matsushima) Nirenberg ex Gerlach & Nirenberg

菅野博英・青木孝之 : 北日本病虫研報 54:54, 2003

オニコ Ulluco

p.196***

***Ullucus tuberosus* Caldas**

腰折病 koshiore-byo Foot rot

Pythium aphanidermatum (Edson) Fitzpatrick

富岡啓介ら : 日植病報 66(3):301, 2000 ; 富岡啓介 : 近中四農研センター研報 5:91, 2005 ;

Tomioka, K. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 68(2):189, 2002

オカヒジキ

p.197

立枯病 tachigare-byo Damping-off

Rhizoctonia solani Kühn

萩原奈央子ら：日植病報 73(3):183, 2007 ; 萩原奈央子ら：日植病報 74(3):162, 2008

[備考] 菌糸融合群 AG-4, 培養型 HG-III

ホウレンソウ

p.197

白斑病 hakuhan-byo Leaf spot

Stemphylium botryosum Wallroth

酒井 宏ら：日植病報 68(1):65, 2002

黒斑病 kokuhan-byo Black spot

Alternaria alternata (Fries) Keissler

Inoue, K. & Nasu, H.: J. Gen. Plant Pathol. 66(1):18, 2000

ゴボウ

p.199

黒条病 kurosuji-byo Black streak

Itersonilia perplexans Derx

Horita, H. & Yasuda, S.: J. Gen. Plant Pathol. 68(4):277, 2002

(注) 文献追加

根黒斑病 ne-kokuhan-byo Black root rot

(1) *Phoma exigua* Desmazières var. *exigua*

伊東菜美子ら：日植病報 70(3):223, 2004 ; 粕山新二ら：日植病報 74(4):343, 2008

(2) *Phoma* sp.

伊東菜美子ら：日植病報 70(3):223, 2004

シュンギク

p.200

葉枯細菌病 hagare-saikin-byo Bacterial leaf blight

Pseudomonas syringae van Hall 1902

瀧川雄一ら：日植病報 68(2):255, 2002

[備考] 本病原のpathovarは未決定

立枯病 tachigare-byo Damping-off

(1) *Pythium myriotylum* Drechsler

瓦谷光男ら：日植病報 68(3):313, 2002

(2) *Pythium* ‘group F’

瓦谷光男ら：日植病報 68(3):313, 2002

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

(1) *Colletotrichum acutatum* Simmonds ex Simmonds

植松清次ら：日植病報 70(1):47, 2004

(注) 病原追加

エンダイブ (キクジャ) Endive

p.201***

Cichorium endivia L.

腐敗病 fuhai-byo Bacterial rot

Pseudomonas cichorii (Swingle 1925) Stapp 1928

末永寛子ら：日植病報 72(1):77, 2006；末永寛子ら：日植病報 73(3):172, 2007

菌核病 kinkaku-byo Sclerotia rot

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary

山崎裕司ら：日植病報 66(3):271, 2000；佐々木静江ら：日植病報 70(3):223, 2004；

佐々木静江ら：日植病報 72(3):150, 2006

すそ枯病 susogare-byo Bottom rot

Rhizoctonia solani Kühn

山内智史・堀内誠三：北日本病虫研報 51:77, 2000

チコリー

p.201

灰色かび病 hairokabi-byo Gray mold

Botrytis cinerea Persoon:Fries

高橋智恵子ら：北日本病虫研報 60:122, 2009

[備考] 品種プンタレッラに発生

すそ枯病 susogare-byo Bottom rot

Rhizoctonia solani Kühn

山内智史ら：北日本病虫研報 56:30, 2005

[備考] 菌糸融合群 AG-1, 培養型 IB

アーチチョーク

p.201

輪紋病 rimmon-byo Black rot

(1) *Phoma exigua* Desmazieres var. *exigua*

Kubota, M. & Abiko, K.: J. Gen. Plant Pathol. 68(3):208, 2002

(2) *Phoma macrostoma* var. *incolorata* (Horne) Boerema & Dorenbosch

Kubota, M. & Abiko, K. : J. Gen. Plant Pathol. 68(3):208, 2002

レタス

p.201

ビックベイン病 big vein-byo Big vein

Mirafiori lettuce virus

夏秋啓子ら：日植病報 68(3):309, 2002

[備考] 病原とされた*Lettuce big-vein virus*は、病徵発現との関係が否定され、*Lettuce big-vein associate virus* (LBVaV)と改名されたため、本病の病原から削除する。但し、LVBVaVはMiLVに常に付随して検出される。また、LBVaV単独保毒 *Olpidium*菌株の確立とその接種結果は未報告である

疫病 eki-byo Photophthora wilt

Phytophthora sp.

神頭武嗣ら：日植病報 71(1):74:2005

褐色輪紋病 kasshoku-rimmon-byo Corynespora target spot

Corynespora cassiicola (Berkeley & Curtis) Wei

柏山新二・井上幸次：日植病報 65(3):401, 1999

苗立枯病 nae-tachigare-byo Damping-off

Rhizoctonia solani Kühn

瓦谷光男ら：日植病報 73(1):21, 2007

[備考] 菌糸融合群 AG-1, 培養型 IC

ピシウム萎凋病 Pythium-icho-byo Pythium wilt

Pythium uncinulatum van der Plaats-Niterink & I. Blok

松浦克成ら：日植病報 74(1):67, 2008

白絹病 shirakinu-byo Southern blight

Sclerotium rolfsii Saccardo

藤崎みちる ら：日植病報 72(4):202, 2006

立枯病 tachigare-byo Damping-off

(1) *Pythium irregularare* Buisman

(2) *Pythium spinosum* Sawada

楠 幹生ら：日植病報 75(3):185, 2009

(注) これにより *Pythium* sp.は(3)となる

バーティシリウム萎凋病 Verticillium-icho-byo Verticillium wilt

(1) *Verticillium dahliae* Klebahn

(2) *Verticillium tricorpus* Isaac

神頭武嗣ら：日植病報 71(3):214, 2005

斑点病 hanten-byo Alternaria leaf spot

Alternaria petasitis M. Kubota, Kishi & Abiko
Kubota, M. et al.: Mycoscience 42(1):29, 2001

ヤーコン

p.204

灰色かび病 hairo-kabi-byo Gray mold

Botrytis cinerea Persoon: Freis

富岡啓介ら：四国植防 36:78, 2001

半身萎凋病 hanshin-ichō-byo Verticillium wilt

Verticillium dahliae Klebahn

角野晶太：北日本病虫研報 50:223, 1999

根腐病 negusare-byo Root rot

Pythium oedochilum Drechsler

大上大輔・影山幸二：日植病報 72(1):82, 2006

炭腐病 sumigusare-byo Charcoal rot

Macrophomina phaseolina (Tassi) Goidánich

富岡啓介：近中四農研センター研報 5:91, 2005

(注) 文献追加

立枯病 tachigare-byo Stem and foliage blight Rhizoctonia blight

Rhizoctonia solani Kühn

富岡啓介ら：四国植防 35:53, 2000 ; Tomioka, K. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 68(1):103, 2002 ; 富岡啓介：近中四農研センター研報 5:91, 2005

[備考] 菌糸融合群 AG-1. 培養型 IB

ヨウサイ (アサガオナ、エンサイ)

p.204

褐斑病 kappan-byo Brown leaf spot

Cercospora apii sensu lato [*Pseudocercospora* sp.]

生咲 巖ら：日植病報 73(1):60, 2007 ; 生咲 巖ら：四国植防 43:23, 2008

ワサビダイコン

p.204

白さび病 shirosabi-byo White rust

Albugo sp.

萩田孝志ら：北日本病虫研報 52:252, 2001, 萩田孝志ら：北海道立農試集報 82:83, 2002

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

Erysiphe cruciferarum Opiz ex Junell

タイサイ類（パクチョイ、シャクシナ、チンゲンサイ） p.205

Brassica rapa* subsp. *chinensis

腐敗病 fuhai-byo Bacterial rot

Pseudomonas viridiflava (Burkholder 1930) Dowson 1939

佐山 玲ら：北日本病虫研報 52:59, 2001

[備考] チンゲンサイ(*B. campestris* L., chinensis group)に発生

萎黃病 io-byo Yellows

Fusarium oxysporum Schlechtendahl f. sp. *rapae* J. Enya, M. Togawa, T. Takeuchi et T. Arie

竹内妙子・香川晴彦：日植病報 60(6):748, 1994 ; Enya, J. et al. Phytopathology 98:475, 2008

[備考] パクチョイ、チンゲンサイ(*B. rapa* susp. chinensis)に発生

黒腐病 kurogusare-byo Black rot

Xanthomonas campestris pv. *campestris* (Pammel 1895) Dowson 1939

伊藤佐弥香ら：日植病報 68(2):255, 2002 ; 伊藤佐弥香ら：日植病報 69(4):407, 2003

[備考] チンゲンサイ(*B. campestris* L., chinensis group)に発生

軟腐病 nampu-byo Soft rot

Erwinia carotovora subsp. *carotovora* (Jones 1901) Bergey, Harrison, Breed, Hammer & Huntoon 1923

Khorshed Alam, S. M. et al.: Ann. Phytopathol. Soc. Jpn. 65(1):46, 1999

[備考] パクチョイに発生

ピシウム腐敗病 *Pythium-fuhai-byo* Pythium rot

(1) *Pythium aphanidermatum* (Edson) Fitzpatrick

(2) *Pythium ultimum* Trow var. *ultimum*

谷名光治ら：日植病報 68(2):187, 2002; ; Tanina, K. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 70(3): 188, 2004

[備考] チンゲンサイに発生

尻腐病 shirigusare-byo Bottom rot

Rhizoctonia solani Kühn

前川和正ら：日植病報 65(6):680, 1999

[備考] 菌糸融合群 AG-2-1, 培養型 II。 チンゲンサイに発生

Brassica rapa* subsp. *lancinotolia

軟腐病 nampu-byo Bacterial soft rot

Erwinia carotovora subsp. *carotovora* (Jones 1901) Bergey, Harrison, Breed, Hammer & Huntoon 1923

白川 隆・山内智史：関東病虫研報 56:9, 2009

菌核病 kinkaku-byo Sclerotinia rot

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary

小野 剛・河野 章：関東病虫研報 54:35, 2007

苗立枯病 nae-tachigare-byo Damping-off

Rhizoctonia solani Kühn

瓦谷光男ら：日植病報 73(1):21, 2007

[備考] 菌糸融合群 AG-1, 培養型 IC

尻腐病 shirigusare-byo Bottom rot

Rhizoctonia solani Kühn

栄森弘己・竹内 純：関東病虫研報 51:61, 2004

[備考] 菌糸融合群 AG-2-1, 培養型 II。キヨウナ (ミズナ) (*B. campestris*, *japonica* group) に発生

ハクサイ

p.205

Brassica rapa* subsp. *glabra

黄化モザイク病 oka-mosaic-byo Yellow mosaic

Turnip yellow mosaic virus

桐野菜美子ら：日植病報 72(4):251, 2006；大木 理ら：日植病報 72(4):252, 2006；

Kirino, N. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 74(4):331, 2008

ピシウム腐敗病 *Pythium-fuhai-byo* Pythium rot

(1) *Pythium aphanidermatum* (Edson) Fitzpatrick

重松辰郎ら：日植病報 71(3):211, 2005；Tojo, M. et al. J. Gen. Plant Pathol.

71(5):384, 2005

(注) 病原追加。これにより *Pythium ultimum* は(2)となる

キサラギナ (ターサイ) Broad-beaked mustard p.205***

Brassica rapa* var. *rosularis

べと病 beto-byo Downy mildew

Peronospora parasitica (Persoon: Fries) Fries

佐藤 衛ら：北日本病虫研報 50:62, 1999

萎黄病 io-byo Yellows

Fusarium oxysporum Schlechtendahl f. sp. *rapae* J. Enya, M. Togawa, T. Takeuchi et
T. Arie

竹内妙子・香川晴彦：日植病報 60(6):748, 1994；外側正之：日植病報 72(4):205, 2006；
Enya, J. et al. Phytopathology 98:475, 2008

[備考] ターサイに発生

コマツナ・ノザワナ

p.207

Brassica rapa var. *perviridis*

斑葉病 han'yo-byo Phoma leaf spot

Phoma wasabiae Yokogi

竹内 純ら：日植病報 69(3):260, 2003

萎黄病 io-byo Yellows

Fusarium oxysporum Schlechtendahl f. sp. *rapae* J. Enya, M. Togawa, T. Takeuchi et
T. Arie

Enya, J. et al. Phytopathology 98:475, 2008

[備考] コマツナに発生

(注) 病原学名変更

菌核病 kinkaku-byo Sclerotinia rot

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary

嶋田竜太郎ら：関東病虫研報 53:69, 2006

[備考] コマツナ

リゾクトニア病* Rhizoctonia-byo Rhizoctonia blight

(旧病名：苗立枯病 Damping-off)

Rhizoctonia solani Kühn

堀江博道：植物防疫 44(9):431, 1990；栄森弘己ら：関東病虫研報52: 35-38, 2005；瓦谷光男ら：日植病報 73(1):21, 2007

[備考] 栄森ら(2005)の病原菌株は菌糸融合群AG2-1, 培養型II. 瓦谷光男ら(2007)の病原菌株は菌糸融合群AG-1, 培養型IC。コマツナに発生

(注) 病名変更。これにより日本植物病名目録 p.207の苗立枯病の項は削除

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

Colletotrichum destructivum O'Gara

森脇丈治ら：日植病報 69(3):259, 2003

[備考] コマツナ由来の*C. higginsianum*は*C. destructivum*に統合される

カブ

p.208

Brassica rapa subsp. *rapa*

べと病 beto-byo Downy mildew

Peronospora parasitica (Persoon: Fries) Fries

有本倫子ら：日植病報 72(1):73, 2006

(注) 文献追加

萎黄病 io-byo Yellows

Fusarium oxysporum Schlechtendahl f. sp. *rapae* J. Enya, M. Togawa, T. Takeuchi et T. Arie

Enya, J. et al. *Phytopathology* 98:475, 2008

(注) 病原学名の変更

カラシナ・タカナ

p.209

こぶ病 kobu-byo Bacterial gall

Rhizobacter dauci Goto & Kuwata 1988

Kawarazaki, H. et al.: *J. Gen. Plant Pathol.* 75(3):235, 2009

[備考] カラシナに発生

べと病 beto-byo Downy mildew

Peronospora parasitica (Persoon: Fries) Fries

佐藤 衛ら：北日本病虫研報 51:21, 2004 : 佐藤 衛ら：日植病報 70(3):214, 2004

[備考] レッドアジアンマスター (Brassica juncea)に発生

苗立枯病 nae-tachigare-byo Damping-off

Rhizoctonia solani Kühn

瓦谷光男ら：日植病報 73(1):21, 2007

[備考] 菌糸融合群 AG-1, 培養型 IC

カリフラワー

p.210

べと病 beto-byo Downy mildew

Peronospora parasitica (Persoon: Fries) Fries

佐藤 衛・堀内誠三：日植病報 65(6):639, 1999

キャベツ

p.211

こうがいかび病 kogai-kabi-byo Choanephora rot

Choanephora cucurbitarum (Berkeley & Ravenel) Thaxter

窪田昌春・我孫子和雄：関西病虫研報 43:9, 2001

苗立枯病 nae-tachigare-byo Damping-off

(2) *Pythium zingiberis* Takahashi

窪田昌春・我孫子和雄：関西病虫研報 42:52, 2000

(3) *Rhizoctonia solani* Kühn

佐山 玲 : 北日本病虫研報 51:54, 2000

[備考] 菌糸融合群 AG-2-2. 培養型 IIIB

(注) 病原追加

ピシウム腐敗病 *Pythium-fuhai-byo* Pythium rot

(2) *Pythium ultimum* Trow var. *ultimum*

中筋智子ら : 日植病報 71(3):210, 2005

(注) 病原追加。これにより(2) *Pythium* sp.は(3)となる

先枯病 sakigare-byo Bud blight

(1) *Fusarium avenaceum* (Corda: Fries) Saccardo

(2) *Fusarium semitectum* Berkeley & Ravenel

窪田昌春・我孫子和雄 : 関西病虫研報 41:17, 1999

バーティシリウム萎凋病 *Verticillium-icho-byo* Verticillium wilt

(1) *Verticillium dahliae* Klebahn

酒井 宏ら : 日植病報 67(2):160, 2001

[備考] 北澤・柳田(日植病報 47(1):99, 1981)が報告した*V. dahliae*は*V. longisporum*である

(注) 病原変更

(2) *Verticillium longisporum* (Stark) Karapapa, Bainbridge & Heale

酒井 宏ら : 日植病報 67(2):160, 2001

コールラビ (カブキャベツ) Kohlrabi p.212***

Brassica oleracea L. **Gongylodes Group** (= var. *gongylodes* L.)

べと病 beto-byo Downy mildew

Peronospora parasitica (Persoon: Fries) Fries

佐藤 衛ら : 北日本病虫研報 53:77, 2002

プロッコリー p.213

花蕾腐敗病 karai-fuhai-byo Head rot

(1) *Erwinia cartovora* subsp. *cartotovora* (Jones 1901) Bergey, Harrison, Breed, Hammer & Huntoon 1923

(2) *Pseudomonas fluorescens* (Trevisan 1889) Migula 1895

(3) *Pseudomonas viridisflava* (Burkholder 1930) Dowson 1939

堀田治邦ら : 日植病報 66(3):306, 2000

黒腐病 kurogusare-byo Black rot

Xanthomonas campestris pv. *campestris* (Pammel 1895) Dowson 1939

酒井 宏ら : 日植病報 72(2):116, 2006

苗立枯病 nae-tachigare-byo Damping-off

Rhizoctonia solani Kühn

窪田昌春・我孫子和雄：関西病虫研報 39:33, 1997；窪田昌春ら：関西病虫研報 51:27, 2009；窪田昌春ら：日植病報 75(3):238, 2009

[備考] 菌糸融合群 AG-2-2, 培養型III B。窪田ら(2009)の病原は菌糸融合群 AG-1, 培養型 IC

軟腐病 nampu-byo Soft rot

Erwinia cartovora subsp. *cartotovora* (Jones 1901) Bergey, Harrison, Breed, Hammer & Huntoon 1923

堀田治邦ら：日植病報 66(3):306, 2000

株腐病 kabugusare-byo Foot rot

Rhizoctonia solani Kühn

三澤知央・國永史朗：日植病報 75(1):87, 2009

[備考] 菌糸融合群 AG-2-2, 培養型 IV

菌核病 kinkaku-byo Sclerotinia rot, Sclerotinia white mold

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary

佐古 勇ら：関東病虫研報 55:45, 2008

黒すす病 kurosusu-byo Alternaria sooty spot

Alternaria brassicicola (Schweinitz) Wiltshire

漆原寿彦・酒井 宏：日植病報 72(1):52, 2006

ルッコラ

p.213***

Eruca vesicaria ssp. *sativa*

べと病 beto-byo Downy mildew

Peronospora parasitica (Persoon: Fries) Fries

佐藤 衛ら：関東病虫研報 51:21, 2004

立枯病 tachigare-byo Stem and root rot

Rhizoctonia solani Kühn

竹内 純・堀江博道：関東病虫研報 53:65, 2006

[備考] 菌糸融合群 AG-4, 培養型 III A

ワサビ

p.213

苗立枯細菌病 nae-tachigare-saikin-byo Bacterial seedling blight

Pseudomonas marginalis (Brown 1918) Stevens 1925

外側正之ら：日植病報 74(3):256, 2008

頭とび病 atamatobi-byo Crown standstill

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie (イチゴセンチュウ)

鳥居雄一郎ら：植物防疫 58(12):520, 2004

葉腐病 hagusare-byo Rhizoctonia leaf blight

Rhizoctonia solani Kühn

竹内 純ら：関東病虫研報 50:61, 2003 ; 竹内 純ら：関東病虫研報 55:39, 2008

[備考] 菌糸融合群 AG-1, 培養型 IB

灰色かび病 haiiro-kabi-byo Gray mold

Botrytis cinerea Persoon: Fries

竹内 純ら：関東病虫研報 50:61, 2003

茎腐病 kukigusare-byo Stem rot

Rhizoctonia solani Kühn

竹内 純ら：関東病虫研報 55:39, 2008

[備考] 菌糸融合群 AG-4, 培養型 IIIA

(注) 文献・備考追加

根こぶ病 nekobu-byo Clubroot

Plasmodiophora brassicae Woronin

鈴木幹彦ら：日植病報 72(4):251, 2006

(注) 文献追加

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

Colletotrichum higginsianum Saccardo

竹内 純ら：日植病報 74(1):33, 2008 ; 竹内 純ら：関東病虫研報 55:39, 2008

ダイコン

p.214

Raphanus sativus L. Daikon Group (= var. *longipinnatus* L. H. Bailey)

円形褐斑病 enkei-kappan-byo

Plectosporium tabacinum (van Beyma) M. E. Palm, W. Gams & Nirenberg

大林延夫・渡辺恒雄：日植病報54:68, 1988 ; 佐藤豊三：植物防疫62:491, 2008

[備考] 大林・渡辺(1988)は本病菌を *Acremonium* 属としたが、佐藤(2008)はこれを

P. tabacinum と再同定した

リゾクトニア病* Rhizoctonia-byo Rhizoctonia blight

(旧病名：葉腐病 Leaf rot, 根腐病 Root rot)

Rhizoctonia solani Kühn

新留伊俊・糸賀繁人：九病虫研会報 2:68, 1956；高野喜八郎・豊田久正：北陸病虫研報 33:96, 1985；栄森弘己ら：関東病虫研報52: 35-38, 2005

[備考] 栄森ら(2005)の病原菌株は菌糸融合群AG-2-1, 培養型II。なお、本病類似症状については日本植物病名目録 p.215根腐病の備考欄を参照

(注) 病名変更。これにより日本植物病名目録 p.215の葉腐病および根腐病は削除

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

(1) *Colletotrichum dematium* (Persoon: Fries) Grove

Sato, T. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 71(5):380, 2005

[備考] 佐藤らの報告（日植病報 65(3):406, 1999）は誤同定のため *C. capsici* (Sydow) E. J. Butler & Bisbyを削除し上記学名に変更する

(2) *Colletotrichum destructivum* O'Gara [*Colletotrichum higginsianum* Saccardo]

森脇丈治ら：日植病報 69(3):259, 2003

[備考] ダイコン由来の*C. higginsianum*は*C. destructivum*に統合される

トウガン

p.217

果実汚斑細菌病 kajitsu-ohan-saikin-byo Bacterial fruit blotch

Acidovorax avenae subsp. *citrulli* (Schaad, Sowell, Goth, Colwell & Webb 1978) Willems, Goor, Thielemans, Gillis, Kester & De Ley 1992

小木曾秀紀ら：日植病報 71(3):290, 2005

[備考] スイカ台用トウガンに発生

疫病 eki-byo Phytophthora rot

(1) *Phytophthora capsici* Leonian

三宅律幸ら：日植病報 74(1):68, 2008

(注) 病原追加。これにより *Phytophthora* sp.は(2)となる

褐色あざ病 kasshoku-aza-byo Brown scab

Rhizoctonia solani Khün

川口 章ら：日植病報 73(2):114, 2007

[備考] 菌糸融合群 AG-4, 培養型 HG-I。川口らは本病をトウガン実褐斑病として発表（日植病報 71(1):75, 2005）したが、病名を訂正した

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

Colletotrichum orbiculare (Berkeley & Montange) Arx

折原紀子ら：日植病報 74(3):176, 2008；折原紀子ら：関東病虫研報 55:35, 2008

スイカ

p.218

えそ斑点病 eso-hanten-byo Necrotic spot

Melon necrotic spot virus

松尾和敏ら：日植病報 73(1):29, 2007

(注) 文献追加

果実軟腐病 kajitsu-nampu-byo Bacterial soft rot

Erwinia carotovora subsp. *carotovora* (Jones 1901) Bergey, Harrison, Breed, Hammer & Huntoon 1923

清水慶明ら：日植病報 73(3):268, 2007

ホモプシス根腐病 *Phomopsis-negusare-byo* Black root rot

Phomopsis sclerotoides van Kesteren

Shishido, M. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 72(4):220, 2006

果実汚斑細菌病 kajitsu-ohan-saikin-byo Bacterial fruit blotch

Acidovorax avenae subsp. *citrulli* (Schaad, Sowell, Goth, Colwell & Webb 1978) Willems, Goor, Thielemans, Gillis, Kersters & De Ley 1992

白川 隆ら：日植病報 66(3):223, 2000

[備考] 国内発生

(注) これにより日本植物病名目録 p.266 (付録) の本病の項を削除する

炭腐病 sumigusare-byo Charcoal rot

Macrophomina phaseolina (Tassi) Goidánich

藤永真史ら：日植病報 68(2):148, 2002

綿腐病 watagusare-byo Pythium fruit rot

Pythium aphanidermatum (Edson) Fitzpatrick

窪田昌春・我孫子和雄：関西病虫研報 42:89, 2000

メロン

p.220

微斑病* bihan-byo Mild mottle

Melon mild mottle virus メロン微斑ウイルス

富高保弘ら：日植病報 75(3):221, 2009

モザイク病 mosaic-byo Mosaic

(7) *Zucchini yellow mosaic virus*

土井 誠ら：関東病虫研報 48:53, 2001

[備考] ネットメロン (*C. melo* L. *reticulatus* group) に発生

(注) 病原追加

黄化えそ病 oka-eso-byo Yellow spot

(2) *Melon yellow spot virus*

Kato, K. et al.: Ann. Phytopathol. Soc. Jpn 65(6):624, 1999

(注) これにより Melon spotted wily virus#は(1)となる

退緑黄化病 tairyoku-oka-byo Chlorotic yellows

Cucurbit chlorotic yellows virus

行徳 裕ら : 日植病報 74(3):219, 2008 ; 奥田 充ら : 九病虫研会報 54: 152, 2008 ; 奥田 充 : 日植病報 75(3):182, 2009

果実内腐敗病* kajitsu-nai-fuhai-byo Internal fruit rot

Pantoea ananatis (Serrano 1928) Mergaert, Verdonck & Kersters 1993 (=*Erwinia ananas* Serrano 1928)

厚地多恵ら : 日植病報 70(3):283, 2004 ; 木戸一孝ら : 日植病報 74(3):262, 2008 ;

Kido, K. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 74(4):302, 2008

[備考] 厚地ら(2004)および木戸ら(2008)は本病を初め果実腐敗症としたが、後に本病として病名申請した

果実汚斑細菌病 kajitsu-ohan-saikin-byo Bacterial fruit blotch

Acidovorax avenae subsp. *citrulli* (Schaad, Sowell, Goth, Colwell & Webb 1978) Willems, Goor, Thielemans, Gillis, Kersters & De Ley 1992

堀田治邦ら : 日植病報 72(1):82, 2006

灰色かび病 haiiro-kabi-byo Gray mold

Botrytis cinerea Persoon: Fries

窪田昌春ら : 日植病報 73(1):61, 2007 ; 窪田昌春ら : 関西病虫研報 50:107, 2008

黒渋腐敗病 kuroshibu-fuhai-byo *Fusicoccum* fruit rot

Fusicoccum aesculi Corda

三上哲壯・佐藤豊三 : 日植病報 66(2):95, 2000

ホモブシス根腐病 *Phomopsis-negusare-byo* Black root rot

Phomopsis sclerotoides van Kesteren

Shishido, M. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 72(4):220, 2006

炭腐病 sumigusare-byo Charcoal rot

Macrophomina phaseolina (Tasii) Goidánich

清水時哉ら : 日植病報 67(2):170, 2001

[備考] カボチャ台接木栽培で発生

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

Colletotrichum orVICulare (Berkeley & Monagne) Arx

菅野博英・森脇丈治：日植病報 66(2):85, 2000

[備考] ネットメロンに発生

(注) 文献追加

シロウリ

p.222

黒星病 kurohoshi-byo Scab

Cladosporium cucumerinum Ellis & Arthur

野津あゆみ・結城津子：日植病報 76(1):78, 2010

キュウリ

p.224

斑紋病 hammon-byo Mottle virus

Cucumber mottle virus

花田 薫ら：日植病報 66(2):148, 2000

黄化えそ病 oka-eso-byo Spotted wilt

(1) *Melon yellow spot virus*

竹内繁治ら：日植病報 67(1):46, 2001

(注) 病原追加。これにより(2)*Watermelon silver mottle virus*は(3)となる

退緑黄化病* tairyoku-oka-byo Chlorotic yellows

Cucurbit chlorotic yellows virus

久野公子ら：日植病報 74(3):218, 2008；古田明子ら：日植病報 74(3):218, 2008；岡崎真一郎ら：日植病報 74(3):218, 2008；奥田 充：日植病報 75(3):182, 2009

果実腐敗病 kajitsu-fuhai-byo Fusarium fruit rot

Fusarium pallidoroseum (Cooke) Saccardo

堀田治邦：日植病報 65(3):405, 1999

こうがいかび病 kogai-kabi-byo Choanephora rot

Choanephora cucurbitarum (Berkley & Ravenel) Thaxter

高野喜八郎ら：北陸病虫研報 46:99, 1998

黒点根腐病 kokuten-negusare-byo Monosporascus root rot

Monosporascus cannonballus Pollack & Uecker

岩館康哉・猫塚修一：日植病報 73(3):183, 2007

炭腐病 sumigusare-byo Charcoal rot

Macrophomina phaseolina (Tasii) Goidánich

清水時哉ら：日植病報 67(2):170, 2001

[備考] カボチャ台接木栽培で発生

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

(1) *Erysiphe polygoni* de Candolle

内田景子・宗 和弘：日植病報 69(1):40, 2003

[備考] *Pseudoidium*亜属。接種試験なし

(注) 文献追加。備考欄に記載のある*E. cichoracearum*の「ウリ類での寄生性は我が国では未確認」との記載を削除

(4) *Oidium* sp.

内田景子・宗 和弘：日植病報 69(1):40, 2003；星 秀男ら：日植病報 72(1):49, 2006；

Uchida, K. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 75(2):92, 2009

[備考] *Reticuloidium*亜属。分生子の発芽管は *E. cichoracearum*型

(注) これにより(4) *Sphaerotheca cucurbitae*は(5)となる

カボチャ

p.227

腐敗病 fuhai-byo Bacterial rot

(1) *Erwinia chrysanthemi* Burkholder, McFadden & Dimock 1953

野島秀伸ら：日植病報 66(2):131, 2000

[備考] pathovarは未決定

(2) *Pseudomonas aeruginosa* (Schroeter 1872) Migula 1900

陶山一雄ら：日植病報 67(2):178, 2001

[備考] キュウリ台木カボチャに発生

軟腐細菌病 nampu-saikin-byo Bacterial soft rot

Erwinia carotovora subsp. *carotovora* (Jones 1901) Bergey, Harrison, Breed, Hammer & Huntoon 1923

藤井直哉ら：北日本病虫研報 52:63, 2001

[備考] ペポカボチャ（ズッキーニ）*Cucurbita pepo* L.に発生

白斑病 hakuhan-byo Plectosporium blight

Plectosporium tabacinum (J. F. H. Beyma) M. E. Palm, W. Gams & Nirenberg

佐藤豊三ら：日植病報 66(2):91, 2000；Sato, T. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 71(2):127, 2005

[備考] 稲葉ら（日植病報 52(3):521, 1986）が報告した*Cephalosporiopsis cucurbitae*

Hamaya & Inabaの再同定。ザツシュカボチャに発生

(注) 病原学名変更、文献追加。これにより日本植物病名目録p.227の白斑病の病原名を削除する。

菌核病 kinkaku-byo Sclerotinia rot

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary

小野 剛：日植病報 70(1):45, 2004

[備考] ズッキーニ *C. pepo*に発生

苗立枯病 nae-tachigare-byo Damping-off

Rhizoctonia solani Kühn

漆原寿彦ら：日植病報 69(3):275, 2003

[備考] 菌糸融合群 AG-4。キュウリ台カボチャに発生

ホモプシス根腐病 *Phomopsis-negusare-byo* Black root rot

Phomopsis sclerotoides van Kesteren

Shishido, M. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 72(4):220, 2006

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

(1) *Oidium citrulli* Yen & Wang

丹田誠之助ら：東農大農学集報 44(3):115, 1999

[備考] 病原および宿主追加。オモチャカボチャ(*C. pepo* L. var. *ovifera* (L.) Alef.)に発生

(2) *Oidium* sp. [subgen. *Reticuloidium*]

星 秀男ら：日植病報 72(1):49, 2006

(注) 病原追加。これにより *Sphaerotheca cucurbitae* は(3)となる

ユウガオ

p.229

ホモプシス根腐病 *Phomopsis-negusare-byo* Black root rot

Phomopsis sclerotoides van Kesteren

Shishido, M. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 72(4):220, 2006

ヘチマ

p.230

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

Sphaerotheca fusca (Fries) Blumer

丹田誠之助・中島千晴：東農大農学集報 47(1):54, 2002

ニガウリ (ツルレイシ)

p.231

モザイク病 mosaic-byo Mosaic

Cucumber mosaic virus

高見圭司ら：日植病報 72(1):28, 2006 ; Takahashi, K. et al.: J. Gen. Plant Pathol.

72(6):391, 2006

黄化えぞ病* oka-eso-byo Spotted wilt

Melon yellow spot virus

Takeuchi, S. et al.; J. Gen. Plant Pathol. 75(2):154, 2009

青枯病 aogare-byo Bacterial wilt

Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi, Kosako, Yano, Hotta & Nishiuchi 1996

篠原弘亮ら：日植病報 66(2):131, 2000；篠原弘亮ら：日植病報 71(1):20, 2005

軟腐病 nampu-byo Soft rot

Erwinia carotovora subsp. *carotovora* (Jones 1901) Bergey, Harrison, Breed, Hammer & Huntoon 1923

久保 花ら：日植病報 75(3):173, 2009

褐斑病 kappan-byo Leaf spot

Corynespora cassiicola (Berkeley & Curtis) Wei

黒木 尚ら：日植病報 74(3):176, 2008

黒かび病 kurokabi-byo Rhizopus rot

Rhizopus stolonifer (Ehrenberg: Fries) Vuillemin var. *stolonifer*

田場 聰ら：日植病報 72(1):22, 2006

実腐病 migusare-byo Fruit rot

Phoma sp.

大城 篤ら：日植病報 72(1):34, 2006

白絹病 shirakinu-byo Southern blight

Sclerotium rolfsii Saccardo

秋和さやから：日植病報 67(2):167, 2001

つる枯病 tsurugare-byo Gummy stem blight

Didymella bryoniae (Auerswald) Rehm

古川聰子・岸 國平：日植病報 71(3):216, 2005；Furukawa, T. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 73(2):125, 2007

つる割病 tsuruware-byo Fusarium wilt

Fusarium oxysporum Schlechtendahl: Fries

今村幸久ら：日植病報 68(2):185, 2002；今村幸久ら：九病虫研会報 53:1, 2007

ヤマノイモ

p.232

カシュウイモ（ニガカシュウ）*D. bulbifera* L.

モザイク病 mosaic-byo Mosaic

(1) *Broad bean wilt virus 2*

Kondo, T. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 71(6):441, 2005

[備考] ヤマノイモに発生

(3) Yam mild mosaic virus

藤 晋一ら : 日植病報 67(3):261, 2001

[備考] モザイク病徵は再現されなかった。ダイショ、ヤマノイモ、ジネンジョに発生

(注) 病原追加。これにより Japanese yam mosaic virus# は(2)となる

褐斑根腐病 kappan-negusare-byo Brown spot

Cylindrocarpon destructans (Zinssmeister) Scholten

田中文夫ら : 北日本病虫研報 44:28, 1993

[備考] ナガイモに発生

白絹病 shirakinu-byo Southern blight

Sclerotium rolfsii Saccardo

草場基章ら : 佐賀大農彙報 86:57, 2001

[備考] *D. japonica* に発生

葉枯線虫病 hagare-senchu-byo

Aphelenchoides sp. ハガレセンチュウの1種

河村貞之助 : 園芸新知識 12(11):4, 1957

[備考] ヤマノイモ

(注) 日本植物病名目録 p.171 (野草) から移動する

植物寄生性線虫 shokubutu-kiseisei-senchu Plant parasitic nematode

(1) *Xiphinema americanum* Cobb アメリカオオハリセンチュウ

三枝敏郎・山本洋祐 : 植防研報 9:27, 1971

[備考] 種名は検討を要す。カシュウイモに発生

(2) *Xiphinema insigne* Loos ヤマユリオオハリセンチュウ

三枝敏郎・山本洋祐 : 植防研報 9:27, 1971

[備考] カシュウイモに発生

(注) 日本植物病名目録 p.171 (野草) から移動する

メボウキ (バジル)

p.233

黒斑細菌病 kokuhan-saikin-byo Bacterial black spot

Pseudomonas cichorii (Swingle 1925) Stapp 1928

兼橋和央ら : 日植病報 70(3):283, 2004

萎凋病 icho-byo Fusarium wilt

Fusarium oxysporum Schlechtendahl: Fries f. sp. *basilici* (Dzidzariya) Armst. & Armst.

漆原寿彦ら : 日植病報 66(2):95, 2000 ; 漆原寿彦ら : 群馬園試研報 6:65, 2001 ; 田場 聰
ら : 土と微生物 56:31, 2002

[備考] 田場 聰ら(2002)は病原の分化型 f. sp. *basilicum*を提案しているが、標記の分化型

名を採用

菌核病 kinkaku-byo Sclerotinia rot

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary

吉田桂子・伊藤千絵：日植病報 76(1):65, 2010

黒斑病 kokuhan-byo Alternaria leaf spot

Alternaria alternata (Fries) Keissler

高良綾乃ら：日植病報 72(4):208, 2006 ; Taba, S. et al.; J. Gen. Plant Pathol. 75(2):160, 2009

黒あし病 kuroashi-byo Black stem and root rot

Corynespora citricola M. B. Ellis

田場 聰ら：日植病報 68(1):43, 2002

円斑病 maruhan-byo Circular leaf spot

Cercospora guatemalensis Mueller & Chupp

Nishikawa, J. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 68(1):46, 2002

シソ

p.233

半身萎凋病 hanshin-icho-byo Verticillium wilt

Verticillium dahliae Klebahn

菅野博英・堀内誠三：北日本病虫研報 50:120, 1999

菌核病 kinkaku-byo Sclerotinia rot

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary

外側正之：関西病虫研報 42:77, 2000

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

Colletotrichum destructivum O'Gara

瓦谷光男ら：日植病報 74(4):335, 2008

チヨロギ

p.234

モザイク病 mosaic-byo Mosaic

Chinese artichoke mosaic virus

Fuji, S. et al.: Arch. Virol. 148:2249, 2003

タマネギ

p.234

えそ条斑病 eso-johan-byo Straw bleaching

Iris yellow spot virus

善 正二郎ら : 九州農業研究 65:91, 2003

[備考] 戻し接種なし

腐敗病 fuhai-byo Bacterial rot

(1) *Burkholderia cepacia* (Palleroni & Holmes 1981) Yabuuchi, Kosako, Oyaizu, Yano,

Hotta, Hashimoto, Ezaki & Arakawa 1993 ; 瀧川雄一ら : 日植病報 68(1):64, 2002 ;

Sotokawa, N. & Takikawa, Y.: J. Gen. Plant Pathol. 70(6):348, 2004

(注) 病原追加、文献追加。これにより(1)*Erwinia rhamontici*は(2)に、(2) *Pseudomonas marginalis* pv. *marginalis*は(3)となる

苗立枯病 nae-tachigare-byo Damping-off

(1) *Pythium* sp.

相馬 潤 : 日植病報 65(6):693, 1999

(注) 病原追加。これにより本病の病原 *Rhizoctonia solani*は(2)となる

立枯病 tachigare-byo

Fusarium avenaceum (Fries) Saccardo

池谷美奈子・児玉不二雄 : 北日本病虫研報 58:188, 2007

[備考] 定植2-3週間後の苗で発生

ラッキョウ

p.237

赤枯病 akagare-byo Leaf sheath rot

Fusarium avenaceum (Fries) Saccardo

竹内妙子ら : 日植病報 70(4):323, 2004

さび病 sabi-byo Rust

Puccinia allii (de Candolle) Rudolphi

岩間俊太ら : 日植病報 68(2):184, 2002

[備考] 病原変種 var. *rakkyo*の提案

ワケギ

p.238

ウイルス病 virus-byo Virus

(2) *Shallot virus X*

山下一夫ら : 日植病報 66(2):147, 2000

(注) 病原追加。これによりGarlic latent virus#は(1)となる

ネギ

p.238

えそ条斑病 eso-johan-byo Necrotic streaks

Iris yellow spot virus

植草秀敏ら : 関東病虫研報 52:31, 2005 ; 福田 充・中山喜一 : 関東病虫研報 54:39,

2007

葉枯細菌病 hagare-saikin-byo Bacterial blight

Xanthomonas campestris pv. *allii* Kadota, Uehara, Shinohara & Nishiyama 2000

Kadota, I. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 66(4):310, 2000

[備考] 新pathovar。本病原については*Xanthomonas axonopodis* pv. *allii* Roumagnac, Gagnevin, Gardan, Sutra, Manceau, Dickstein, Jones, Rott & Pruvost 2003 も提案されている

菌糸腐敗病 kinshi-fuhai-byo Mycelial rot

Botrytis byssoides Walker

阿部秀夫・新村昭憲：日植病報 65(3):401, 1999；阿部秀夫ら：北日本病虫研報 52:67, 2001

黒紋葉枯病 kokumon-hagare-byo Phyllosticta leaf blight

Guignardia alliacea Motohashi, J. Nishikawa & C. Nakashima [anamorph: *Phyllosticta alliacea* Motohashi, J. Nishikawa & C. Nakashima]

本橋慶一ら：日植病報 72(4):202, 2006 ; Motohashi, K. et al. Mycoscience 49:16, 2008

根腐萎凋病 negusare-icho-byo Root rot

Fusarium redolens Wollenweber

新村昭憲ら：日植病報 62(6):645, 1996 ; 新村昭憲：日植病報 63(3):202, 1997 ; 新村昭憲：日植病報 67(2):165, 2001

[備考] 新分化型 f. sp. *cepae* Shimamura を提案

(注) 学名変更。これにより *F. oxysporum* は削除

リゾクトニア葉鞘腐敗病 Rhizoctonia-yosho-fuhai-byo Rhizoctonia leaf sheath rot

Rhizoctonia solani Kühn

三澤知央・國永史朗：日植病報 75(1):87, 2009

[備考] 菌糸融合群 AG-4, HG-1

ニラ

p.241

えそ条斑病 eso-johan-byo Necrotic streak

Iris yellow spot virus

福田 充ら：日植病報 72(4):277, 2006 ; 福田 充ら：日植病報 73(4):311, 2007

ウイルス病 virus-byo Virus

(1) *Cherry leaf roll virus*

山下一夫ら：日植病報 66(2):145, 2000

(3) *Peanut stunt virus*

山下一夫・花田 薫：日植病報 65(6):669, 1999

(注) 病原追加。これにより(1)Garlic latent virus#, (2)*Tobacco mosaic virus*はそれぞれ(2), (4)になる

白色葉腐病 hakushoku-hagusare-byo White leaf rot

Rhizoctonia solani Kühn

三澤知央・國永史朗：日植病報 75(1):87, 2009

[備考] 菌糸融合群 AG-2-1, 培養型II

褐色葉枯病 kasshoku-hagare-byo Brown leaf blight

Stemphylium botryosum Wallroth

三澤知央：日植病報 75(1):87, 2009

紅色根腐病 koshoku-negusare-byo Pink root rot

Pyrenopeziza terrestris (Hansen) Gorenz, Walker & Larson

石川成寿ら：日植病報 61(6):604, 1995

アスパラガス

p.242

軟腐病 nampu-byo Bacterial soft rot

Erwinia carotovora subsp. *carotovora* (Jones 1901) Bergey, Harrison, Breed, Hammer & Huntoon 1923

藤井直哉ら：北日本病虫研報 53:80, 2002

青かび病 aokabi-byo Blue mold

Penicillium hirsutum Diercks

Saito, M. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 69(5):304, 2003

疫病 eki-byo Phytophthora rot

Phytophthora sp.

山崎陽子・守川俊幸：日植病報 46(6): 629, 1998

白紋羽病 shiro-mompa-byo White root rot

Rosellinia necatrix Prillieux

金谷 元：岡山農試研報 12:33, 1994

オクラ

p.243

苗立枯病 nae-tachigare-byo Damping-off

(1) *Pythium ultimum* Trow var. *ultimum*

貴田健一ら：日植病報 73(1):60, 2007

(注) 病原追加。これにより *Pythium* sp. は (2)となる

オカ

p.245

炭腐病 sumigusare-byo Charcoal rot

Macrophomina phaseolina (Tassi) Goidánich

富岡啓介：近中四農研センター研報 5:91, 2005

(注) 文献追加

イチゴ

p.245

黄化病 oka-byo Yellows

'*Candidatus Phytoplasma fragariae*'

田中 穂ら：日植病報 74(3):253, 2008

斑点細菌病 hanten-saikin-byo Bacterial leaf spot

Herbaspirillum sp. [*Pseudomonas* sp.]

木嶋ら：日植病報 52(1):151, 1986、楠元智子ら：日植病報 67(2):179, 2001

[備考] 褐色腐敗病の病名を斑点細菌病に改名する。楠元らは木嶋らの分離株を含めて同定した

褐斑細菌病 kappan-saikin-byo Bacterial brown spot

Pseudomonas cichorii (Swingle 1925) Stapp 1928

楠元智子ら：日植病報 68(2):255, 2002

葉縁退緑病 yo-en-tairyoku-byo Marginal chlorosis

'*Candidatus Phlomobacter fragariae*'

Tanaka, M. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 72(6):374, 2006

[備考] 接種試験なし

疫病 eki-byo Phytophthora rot

(4) *Phytophthora* sp.

白井佳代ら：日植病報 72(4):207, 2006

(注) 病原追加

ジクホコリカビ病 jiku-hokorikabi-byo Slime mold

Diachea leucopododia (Bulliard) Rostafinski

石川成寿・郷間秀夫：日植病報 66(2):95, 2000

乾腐病 kampu-byo Crown and root rot

Fusarium solani (Martius) Saccardo

舟久保太一ら：日植病報 74(3):180, 2008

苗立枯病 nae-tachigare-byo Cylindrocladium damping-off, Damping-off
Cylindrocladium canadense J. C. Kang, Crous & C. L. Schoch
石川成寿ら：日植病報 72(4):209, 2006 ; Hirooka, Y. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 75(1):83, 2009

根腐萎凋病 negusare-ichū-byo Root rot
Cylindrocarpon destructans (Zinssmeister) Scholten
重松嘉昭ら：日植病報 43(3):341, 1977 ; 菅野博英ら：日植病報 66(2):94, 2000

ピシウム根腐病 Pythium-negusare-byo Pythium root rot
(1) *Pythium helicoides* Drechsler
鈴木幹彦ら：日植病報 71(3):209, 2005 ; 渡辺秀樹ら：日植病報 71(3):209, 2005
(2) *Pythium spinosum* Sawada
中山喜一ら：日植病報 74(3):177, 2008
(3) *Pythium sylvaticum* Campbell & Hendrix
中山喜一ら：日植病報 74(3):177, 2008

先枯病 sakigare-byo Runner-tip blight
Fusarium moniliforme Sheldon
石川成寿ら：日植病報 59(3):286, 1993

白絹病 shirakinu-byo Southern blight
Sclerotium rolfsii Saccardo
石川成寿ら：関東病虫研報 39:125, 1992

トウガラシ / ピーマン p.248
えそ斑紋病* eso-hammon-byo Necrotic spot
Impatiens necrotic spot virus
若林秀忠ら：関東病虫研報 55:185, 2008
[備考] パプリカに発生

モザイク病 mosaic-byo Mosaic
(4) *Paprika mild mottle virus*
Hamada, H. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 69(3):199, 2003
[備考] 病原はJapanese strainである。ピーマンに発生
(6) *Pepper mottle virus*
Ogawa, Y. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 69(5):348, 2003
[備考] グリーンペッパー(*C. annuum* L. var. *angulosum* Mill.)に発生
(注) 病原追加。これにより(4)*Pepper mild mottle virus*は(5)、(5)*Potato virus Y*は(7)に、
以降順に番号が変わる

(8) *Tobacco mild green mosaic virus*

宮崎暁喜ら : 日植病報 76(1):64, 2010

[備考] 宮崎ら(2010)は本ウイルスがピーマンにかすり状えそ斑を形成するとした

退緑えそ病 tairyoku-eso-byo Chlorotic necrosis

Tobacco rattle virus

富高保弘ら : 日植病報 76(1):36, 2010

退緑斑紋病 tairyoku-hammon-byo Chlorosis

Capsicum chlorosis virus

奥田 充ら : 日植病報 71(3):235, 2005

葉枯細菌病 hagare-saikin-byo Bacterial leaf blight

Pseudomonas cichorii (Swingle 1925) Stapp 1928

森田泰彰ら : 日植病報 70(1):76, 2004

[備考] シシトウガラシ(*C. annuum* L.)に発生

果実腐敗病 kajitsu-fuhai-byo Fruit rot

(1) *Fusicoccum aesculi* Corda

(2) *Phomopsis phomoides* (Saccardo) Arx

富岡啓介・佐藤豊三 : 日菌学会46大会講要 p.68, 2002 ; 富岡啓介 : 近中四農研センター研報 5:91, 2005

[備考] ピーマン *C. annuum* L. var. *grossum* Sendtnerに発生

褐紋病 katsumon-byo Phomopsis blight

Phomopsis capsici (Magnaghi) Saccardo

高野喜八郎 : 北陸病虫研報 44:92, 1996

黒枯病 kurogare-byo Corynespora blight

Corynespora cassiicola (Berkeley & Curtis) Wei

安達理恵ら : 日植病報 71(1):72, 2005 ; Shimomoto, Y. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 74(4): 335, 2008

[備考] ピーマン、シシトウガラシに発生

黒かび病 kurokabi-byo Fruit rot

(2) *Stemphylium lycopersici* (Enjyoji) Yamamoto

富岡啓介ら : 四国植防 37:71, 2002

[備考] ピーマンに発生

(注) 病原追加。これにより *Stemphylium botryosum* は(1)となる

実腐病 migusare-byo Fruit rot

(1) *Fusarium lateritium* Nees: Fries emend. Snyder & Hansen

富岡啓介ら：四国植防 37:71, 2002 ; 富岡啓介：近中四農研センター研報 5:91, 2005

[備考] ピーマンに発生

(注) 病原追加。これにより *Fusarium* sp.は(2)となる

白絹病 shirakinu-byo Southern blight

Sclerotium rolfsii Saccardo

植松清次ら：関東病虫研報 56:137, 2009

[備考] 植松ら(2009)はハナトウガラシで発生を認めた

(注) 文献追加

立枯病 tachigare-byo Haematonectria blight

Haematonectria ipomoeae (Halsted) Samuels & Nirenberg [*Fusarium striatum* Sherbakoff]

多賀正節ら：日植病報 72(4):206, 2006

[備考] A.Y. Rossman et al. (Studies in Mycology 42:134, 1999)は、*Nectria heamatococca* complexを*Haematonectria*属に帰属させるとともに、ホモタリックな菌群を狭義の*H. heamatococca*とは別種の*H. ipomoeae*とした

(注) 文献追加。病原の学名変更

トマト

p.250

巻葉病 makiha-byo Leaf curl

Ageratum yellow vein virus

安藤緑樹ら：日植病報 74(1):32, 2008

モザイク病 mosaic-byo Mosaic

(1) *Colombian datura virus*

山下一夫・福井要子：日植病報 70(3):263, 2004

(注) 病原追加。これにより *Cucumber mosaic virus*は(2)となり、以下順に一つずつ番号は変わる

黄化病 oka-byo Yellowing

Tomato infectious chlorosis virus

Hartono, S. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 69(1):61, 2003

黄化葉巻病 oka-hamaki-byo Yellow leaf curl

Tomato yellow leaf curl virus

大貫正俊ら：日植病報 63(6):482, 1997 ; Kato, K. et al.: Ann. Phytopath. Soc. Jpn. 64(6): 552, 1998 : Ueda, S. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 71(4):319, 2005

(注) 文献追加。これにより日本植物病名目録p.250の黄化萎縮病の(2)は削除

黄化萎縮病 oka-ishuku-byo Tomato yellow dwarf

(1) *Eupatorium yellow vein virus*

大貫正俊・上田重文：日植病報 75(1):42, 2009

(2) *Honeysuckle yellow vein mosaic virus*

(3) *Tobacco leaf curl Japan virus*

Shimizu, S. and Ikegami, M.: Microbiol. Immunol. 43:989, 1999 ; Fanquet, C. M. et al.: Arch. Virolo. 148:405, 2003 ; Ogawa, T. et al.: Virus Res. 137:235, 2008 ; Kitamura, K. et al.: Plant Pathol. 57:391, 2008

(注) これにより *Tobacco leaf curl virus* は(4)となる

退緑萎縮病 tairyoku-ishuku-byo Chlorotic dwarf

(1) *Potato spindle tuber viroid*

松下陽介ら：日植病報 76(1):37, 2010

(2) *Tomato chlorotic dwarf viroid*

津田新哉ら：日植病報 73(3):220, 2007 ; Matsushita, Y. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 74(2): 182, 2008

青かび病 aokabi-byo Blue mold

Penicillium oxalicum Currie & Thom

梅本清作ら：日植病報 73(3):219, 2007 ; 梅本清作ら：日植病報 74(1):34, 2008 ;

Umemoto, S. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 75(5):399, 2009

[備考] 梅本ら(2007)は緑かび病としたが、後に青かび病に訂正した

円紋病 emmon-byo Phoma leaf spot, Stem and fruit rot

(1) *Phoma destructiva* Plowright [*Phyllosticta lycopersici* Peck]

(2) *Phoma exigua* Desmazieres [*Ascochyta phaseolorum* Saccardo]

(3) *Phoma lycopersici* Cooke

窪田昌春ら：日植病報 66(1):12, 2000

[備考] トマトの*Phoma*菌による病害を統一し、円紋病とする。これにより茎腐病 (*Didymella lycopersici*)、実腐病 (*Phoma destructiva*)、輪状斑点病 (*Phoma exigua*, *Ascochyta phaseolorum*) は削除。なお、*Phoma lycopersici*の有性世代 *Didymella lycopersici* Klebahn は国内未確認。

フザリウム株腐病 *Fusarium-kabugusare-byo* Foot rot

Fusarium solani f. sp. *eumartii* (Carpenter) Snyder & Hansen

中山喜一・青木孝之：日植病報 76(1):7, 2010

葉かび病 hakabi-byo Leaf mold

Passalora fulva Cooke U. Braun & Crous [*Fulvia fulva* (Cooke) Ciferri]

Satou, M. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 71(6):436, 2005

株腐病 kabugusare-byo Foot rot

Rhizoctonia solani Kühn

三澤知央 : 日植病報 73(1):76, 2007

黒すじ実腐病 kurosuji-migusare-byo Black vascular fruit rot

Fusarium oxysporum Schlechtendahl: Fries

今村幸久ら : 日植病報 66(2):94, 2000

さび斑病 sabihan-byo Plectosporium leaf spot

Plectosporium tabacinum (van Beyma) M. E. Palm, W. Gams & Nirenberg

竹内 純ら : 日植病報 74(3):179, 2008

立枯病 tachigare-byo Nectria blight

Haematonectria ipomoeae (*Fusarium striatum*)

今村幸久ら : 日植病報 66(3):255, 2000 ; 多賀正節ら : 日植病報 72(4):206, 2006

[備考] *N. haematococca* Berkeley & Broome は*H. ipomoeae*となる

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

(1) *Colletotrichum acutatum* Simmonds ex Simmonds

末永寛子ら : 日植病報 74(1):68, 2008

(注) 病原追加。これにより *C. gloeosporioides* は(2)となる

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

(2) *Oidium neolyopersici* Levente Kiss

Kashimoto, K. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 69(3):176, 2003

(3) *Oidium* sp.

和田久美子・平田幸治 : 新潟大農研報 29:77, 1977 ; Matsuda, Y. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 67(4):294, 2001

[備考] *Erysiphe polygoni* 型

(注) 病原追加・文献追加。*Oidiopsis sicula* は(1)、*Oidium* sp. は(3)となる

ナス (茄、茄子)

p.254

黄化えそ病 □ka-eso-byo Spotted wilt

Tomato spotted wilt virus

河野敏郎ら : 日植病報 64(6): 597, 1998

褐色輪紋病 kasshoku-rimmon-byo Leaf spot

Phoma lycopersici Cooke

古川聰子・岸 國平：日植病報 70(3):223, 2004

茎枯病 kukigare-byo Stem blight

Fusicoccum aesculi Corda

矢野和孝ら：日植病報 69(2):132, 2003

(注) 病原学名変更。日本植物病名目録p.255の本病病原の*Dothiorella* sp.を削除する

黒かび病 kurokabi-byo Rhizopus fruit rot

Rhizopus stolonifer (Ehrenberg: Fries) Vuillemin var. *stolonifer*

岡田清嗣・大植大輔：関西病虫研報 49:55, 2007

根腐病 negusare-byo Pythium root rot

Pythium myriotylum Drechsler

岡田清嗣ら：関西病虫研報 51:69, 2009

すす斑病 susuhan-byo Cercospora leaf spot

Pseudocercospora fuligena (Roldan) Deighton

原田 守ら：日植病報 75(3):234, 2009

(注) これにより *Cercospora* sp.は削除する

モロヘイヤ

p.257

半身萎凋病 hanshin-ichō-byo Verticillium wilt

Verticillium dahliae Klebahn

菅野博英・堀内誠三：北日本病虫研報 50:120, 1999

黒枯病 kurogare-byo Black band

Lasiodiplodia theobromae (Patouillard) Griffon & Maublanc

佐藤豊三ら：日植病報 68(2):186, 2002 ; Sato, T. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 74(1):91, 2008

黒星病 kurohoshi-byo Black spot

Cercospora sp.

三上哲壯ら：日植病報 59(3):290, 1993

苗立枯病 nae-tachigare-byo Damping-off

Rhizoctonia solani Kühn

佐藤裕子ら：日菌報 38(1):87, 1997

[備考] 新病原菌群。菌糸融合群 AG-2-1

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

- (1) *Erysiphe caucasica* Simonian var. *corchori* Tanda
 Tanada, S.: Jour. Agri. Sci., Tokyo Univ. Agric. 43(3):152, 1998
- (2) *Oidium* sp.
 我孫子和雄・萩原 廣: 日植病報 65(2):204, 1999
 [備考] *Sphaerothec fuliginea*型
- (3) *Sphaerotheca fusca* (Fries) Blumer
 Tanada, S.: Jour. Agri. Sci., Tokyo Univ. Agric. 43(3):152, 1998
 (注) 病原追加・文献追加。

アシタバ p.257
 葉腐病 hagusare-byo Leaf blight
Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk
 久保山まや ら: 関東病虫研報 41:129, 1994; 星 秀男・堀江博道: 関東病虫研報 51:25, 2004
 [備考] 菌糸融合群 AG-1, 培養型 IB、*Rhizoctonia solani* Kühnの完全世代

根腐病 negusare-byo Pythium rot
Pythium sylvaticum Campbell & Hendrix
 竹内 純ら: 日植病報 75(1):51, 2009

デイル (イノンド) p.258***
Anethum graveolens L.
 うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew
Oidium sp.
 小板橋基夫・西村範夫: 日植病報 69(1):21, 2003
 [備考] *Pseudoidium*亜属

チャービル Chervil p.258***
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
 うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew
Oidium sp.
 小板橋基夫・西村範夫: 日植病報 69(1):21, 2003
 [備考] *Pseudoidium*亜属

セルリー p.258
 苗立枯病 nae-tachigare-byo Damping-off
Rhizoctonia solani Kühn
 竹内 純・堀江博道: 関東病虫研報 47:43, 2000
 [備考] 菌糸融合群 AG-4. 培養型 IIIA

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

Colletotrichum acutatum Simmonds ex Simmonds

竹内 純ら：日植病報 66(2):92, 2000

ミツバ

p.259

モザイク病 mosaic-by \square Mosaic

(2) Japanese horewort mosaic virus (JHMV)

Okuno, K. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 69(2):138, 2003

(注) 病原追加。これにより *Cucumber mosaic virus* は(1)となる

灰色かび病 haiiro-kabi-byo Gray mold

Botrytis cinerea Persoon: Fries

岡田清嗣・草刈眞一：日植病報 66(3):242, 2000

(注) 文献追加

立枯病 tachigare-byo Damping-off

Rhizoctonia solani Kühn

藤田智美・百町満朗：日植病報 73(3):184, 2007；三澤知央・黒川太郎：日植病報 75(1):87, 2009

[備考] 菌糸融合群 AG-1 培養型 IB, AG-2-2 IIIBおよびAG-4 HG-1

(注) 文献追加

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

Colletotrichum destructivum O'Gara

下元祥史ら：日植病報 76(1):66, 2010

ニンジン

p.260

こぶ病 kobu-byo Bacterial gall

Rhizobacter daucus Goto & Kuwata 1988

Kawarazaki, H. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 75(3):235, 2009

(注) 文献追加

疫病 eki-byo Soft rot

(1) *Phytophthora nicotianae* van Breda de Haan

金城衣恵ら：日植病報 75(3):185, 2009

(2) *Phytophthora* sp.

小玉孝司・芳岡昭夫：関西病虫研報 13:60, 1971

苗立枯病 nae-tachigare-byo Seedling damping-off

Rhizoctonia solani Kühn

米本謙悟ら：日植病報 71(3):217, 2005 ; 米本謙悟ら：日植病報 74(1):20, 2008

[備考] 菌糸融合群 AG-4 HGII。米本らは初め本病害を立枯病としたが、後に苗立枯病と訂正した

白かび病 shirokabi-byo Sour rot

Geotrichum candidum Link

堀田治郎・八田 洋：日植病報 70(1):86, 2004

ハマボウフウ

p.262

白絹病 shirakinu-byo Southern blight

Sclerotium rolfsii Saccardo

永島 進ら：日植病報 73(1):61, 2007

セリ

p.262

葉腐病 hagusare-byo Pythium leaf rot

Pythium aferile Kanouse & Humphrey

本藏良三ら：宮城県農業短期大学術報 51:17, 2003

(注) 文献追加。日本植物病名目録p.262の本病英名Pythium root rotをPythium leaf rot に変更する

パセリー

p.263

灰色かび病 haiiro-kabi-byo Gray mold

Botrytis cinerea Persoon: Fries

菅野博英・本藏良三：北日本病虫研報 49: 91, 1998

半身萎凋病 hanshin-icho-byo Verticillium wilt

Verticillium dahliae Klebahn

海老原克介ら：日植病報 66(2):95, 2000

菌核病 kinkaku-byo Sclerotinia rot

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary

落合幾美ら：日植病報 74(3):176, 2008

ミョウガ

p.263

青枯病 aogare-byo Bacterial wilt

Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi, Kosaka, Yano, Hotta & Nishiuchi 1996

矢野和孝ら：日植病報 68(1):94, 2002

ショウガ

p.264

青枯病 aogare-byo Bacterial wilt

Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi, Kosako, Yano, Hotta & Nishiuchi 1996
土屋健一ら：日植病報 65(3):363, 1999 ; 矢野和孝ら：日植病報 71(3):179, 2005

疫病 eki-byo Soft rot

(1) *Phytophthora citrophthora* (R. E. & E. H. Smith) Leonian

山崎睦子ら：日植病報 75(1):72, 2009 ; 山崎睦子ら：日植病報 75(3):184, 2009

(2) *Phytophthora* sp.

小林達男・松岡弘明：日植病報 65(6):679, 1999

紅色根茎腐敗病 koshoku-konkei-fuhai-byo Pink rhizome rot

Pyrenopeziza terrestris (Hansen) Gorenz, Walker & Larson

矢野和孝・川田洋一：四国植防 39:11, 2004

2. 付録

ココヤム p.265***

Xanthosoma sagittifolium Liebm.

† 根腐病 negusare-byo Root rot

Pythium sp.

小野 浩ら：日植病報 65(6):658, 1999

[備考] スリランカ

ワサビダイコン p.265***

Cercospora armoraciae Saccardo

Nakashima, C. et al.: Mycoscience 47:48, 2006

[備考] 接種試験なし

タイサイ類 p.265***

葉腐病 hagusare-byo Foliar rot

Rhizoctonia solani Kühn

Yang, Gen-Hua et al. J. Gen. Plant Pathol. 71(5):377, 2005

[備考] 菌糸融合群 AG-1B。パクチヨイに発生。中国・雲南省

カラシナ p.265***

葉腐病 hagusare-byo Foliar rot

Rhizoctonia solani Kühn

Yang, Gen-Hua et al. J. Gen. Plant Pathol. 71(5):377, 2005

[備考] 菌糸融合群 AG-1B。Chinese mustard (*Brassica juncea* (L.) Czern. var. *rugosa*)
に発生。中国・雲南省

トウガン p.266

果実軟腐症 kajitsu-nampu-sho Soft rot

Erwinia carotovora (Jones 1901) Bergey, Harrison, Breed, Hammer & Huntoon 1923

澤嶽哲也ら：日植病報75(3):271, 2009

スイカ

p.266

果実腐敗症 kajitsu-fuhai-sho Bacterial fruit rot

(1) *Citrobacter amalonaticus* (Young et al. 1971) Brenner & Farmer 1982

伊藤実佐子ら：関東病虫研報 50:33, 2003

[備考] 病原同定不十分。16S rDNAによる推定

(2) *Enterobacter aerogenes* Hormaeche & Edwards 1960

伊藤実佐子ら：関東病虫研報 50:33, 2003

[備考] 病原同定不十分。16S rDNAによる推定

(3) *Enterobacter cloacae* (Jordan 1890) Hormaeche & Edwards 1960

井上 興ら：日植病報 74(3):262, 2008

[備考] 病原同定不十分

(4) *Leuconostoc mesenteroides* (Tsenkovskii 1878) van Tieghem 1878

井上 興ら：日植病報 75(1):80, 2009

(5) *Pantoea agglomerans* (Ewing & Fife 1972) Gavini, Mergaert, Beji, Mielcarek, Izard, Kersters & de Ley 1989

伊藤実佐子ら：関東病虫研報 50:33, 2003

[備考] 病原同定不十分。16S rDNAによる推定

メロン

p.266

† † † 黒腐病 kurogusare-byo *Alternaria* fruit rot

Alternaria alternata (Fries) Keissler

小林慶範ら：日植病報 69(1):48, 2003 ; Kobayashi, Y. et al.: Res. Bull. Pl. Prot. Japan

40:153, 2004

[備考] メキシコ。ウインターメロン *Cucumis melo* L. (inodorus group)に発生

黄化巻葉症 oka-makiha-sho Yellow leaf curl

Tomato leaf curl New Delhi virus

伊藤拓也ら：日植病報 74(1):52, 2008

[備考] タイ国

キュウリ

p.267

黄化巻葉症 oka-makiha-sho Yellow leaf curl

Tomato leaf curl New Delhi virus

伊藤拓也ら：日植病報 74(1):52, 2008

[備考] タイ国

カボチャ

p.267

黄化巻葉症 oka-makiha-sho Yellow leaf curl

Squash leaf curl China virus

伊藤拓也ら：日植病報 74(1):52, 2008

[備考] タイ国

† † † フザリウム果実腐敗病 *Fusarium-kajitsu-fuhai-byo* Fusarium fruit rot

Fusarium sp.

迫田琢也ら：日植病報 69(1):48, 2003

[備考] *F. sambucinum*に似る。輸入（ニュージーランド）検疫果実で発見

ユウガオ

p.267

黄化巻葉症 oka-makiha-sho Yellow leaf curl

Tomato leaf curl New Delhi virus

伊藤拓也ら：日植病報 74(1):52, 2008

[備考] タイ国。ヒヨウタンに発生

ラッキョウ

p.267***

潜在感染 senzai-kansen latent infection

Shallot latent virus

山下一夫ら：日植病報63(6):486, 1997 : 山下一夫ら：日植病報 70(1):50, 2004

[備考] 戻し接種なし

ワケギ

p.267

潜在感染 senzai-kansen latent infection

Shallot latent virus

山下一夫ら：日植病報63(6):486, 1997 : 山下一夫ら：日植病報66(2):147, 2000 : 山下一夫
ら：日植病報 70(1):50, 2004

[備考] 戻し接種なし

ネギ

p.267***

潜在感染 senzai-kansen latent infection

Shallot latent virus

山下一夫ら：日植病報63(6):486, 1997 : 山下一夫ら：日植病報 70(1):50, 2004

[備考] 戻し接種なし

ニンニク

p.268***

潜在感染 senzai-kansen latent infection

Shallot latent virus (SLV)

山下一夫ら：日植病報63(6):486, 1997 : 山下一夫ら：日植病報 70(1):50, 2004

[備考] 戻し接種なし

ニラ

p.268

潜在感染 senzai-kansen latent infection

Shallot latent virus (SLV)

山下一夫ら：日植病報63(6):486, 1997 : 山下一夫ら：日植病報 70(1):50, 2004

[備考] 戻し接種なし

イチゴ

p.268

† ペスタロチア病 *Pestalotia*-byo Pestalotia disease

Pestalotiopsis longisetula (Guba) X. A. Sun & Q. X. Ge

佐藤俊次ら：日植病報 66(3):257, 2000

[備考] パラグアイ

トマト

p.268

黄化えそ病 oka-eso-byo Spotted wilt

(1) *Groundnut ringspot virus*

Williams, L. V. et al.: Plant Dis. 85(12):1227, 2001

[備考] ELISAによる検出。戻し接種なし。アルゼンチン

(2) *Tomato chlorotic spot virus*

Williams, L. V. et al.: Plant Dis. 85(12):1227, 2001

[備考] ELISAによる検出。戻し接種なし。アルゼンチン

(3) *Tomato spotted wilt virus*

匠原監一郎ら：日植病報 70(3):276, 2004

[備考] パラグアイ。DAS-ELISA法とRIPA法で*Tomato chlorotic spot virus*および

Groundnut ringspot virus 抗体にも弱く陽性反応

(注) 病原追加

† ペスタロチア病 *Pestalotia*-byo Pestalotia disease

Pestalotiopsis longisetula (Guba) X. A. Sun & Q. X. Ge

佐藤俊次ら：日植病報 66(3):257, 2000

[備考] パラグアイ

ニンジン

p.269

しみ腐病 shimigusare-byo Cavity spot

Pythium violae Chesters & Hickman

Suffeert, F. and J.-M. Kycas: J. Gen. Plant Pathol. 74(4):296, 2008

[備考] フランス

きのこ Mushrooms

1. 新病名・病原追加/学名/病名変更・文献追加等

ヒラタケ p.273

軟腐病 nampu-byo Soft rot

Erwinia carotovora subsp. *carotovora* (Jones 1901) Bergey, Harrison, Breed, Hammer & Huntoon 1923

Okamoto, H. et al.: Ann. Phytopathol. Soc. Jpn 65(4):460, 1999

(注) 文献追加

白こぶ病 shirokobu-byo Gill-knot

Iotonchium unguatum Aihara (ヒラタケヒダコブセンチュウ)

Aihara, T.: Jpn. J. Nematol. 31(1/2):1, 2001 ; 田中 寛ら : 関西病虫研報 42:47, 2002

[備考] ナミトモナガキノコバエ *Allodiopsis domestica* (Meigen)が本線虫のベクター

エノキタケ p.275

ウイルス病 virus-byo Virus disease

virus like particles (ウイルス様粒子)

Magae, Y. & Hayashi, N.: FEMS Microbiology Letters 180:331, 1999

軟腐病 nampu-byo Soft rot

Erwinia carotovora subsp. *carotovora* (Jones 1901) Bergey, Harrison, Breed, Hammer & Huntoon 1923

Okamoto, H. et al.: Ann. Phytopathol. Soc. Jpn 65(4):460, 1999

(注) 文献追加

草花 Flowers and ornamental plants

1. 新病名・病原追加/学名/病名変更・文献追加等

ドラセナ p.278

赤渋病 akashibu-byo Red blight

Microsphaeropsis boninensis Tak. Kobayashi & T. Okamoto

Kobayashi, T. & Okamoto, T.: J. Agr. Sci., Tokyo Univ. Agr. 48(3):89, 2003

[備考] リュウケツシュ (ドラセナ) *D. draco* L.に発生

根腐病 negusare-byo Pythium root rot

Pythium graminicola Subramanian

鈴木幹彦・景山幸二 : 日植病報 73(1):60, 2007

[備考] ドラセナ (*Dracaena surculosa* Lindl.) に発生

マンデビラ p.278***

Mandevilla x amoena

褐斑病 kappan-byo Corynespora leaf spot
Corynespora cassiicola (Berkeley & Curtis) Wei
三宅律幸ら：日植病報 74(3):175, 2008

サンセベリア (チトセラン) p.278
腐敗病 fuhai-byo Pythium rot
Pythium spinosum Sawada
竹内 純ら：関東病虫研報 49,89, 2002
[備考] アツバチトセラン *S. trifasciata* に発生

炭疽病 tanso-byo Anthracnose
Colletotrichum sansevieriae Nakamura, Ohzono, Iwai & Arai
Nakamura, M. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 72(4):253, 2006

マツバギク p.279
ピシウム腐敗病 Pythium-fuhai-byo Pythium rot
Pythium aphanidermatum (Edson) Fitzpatrick
河原崎秀志ら：日植病報 71(3):210, 2005 ; Kawarazaki, H. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 74(1):94, 2008

アロエ p.279
株腐病 kabugusare-byo Foot rot
Fusarium dimerum Penzig var. *dimerum*
本橋慶一ら：日植病報 74(4):304, 2007
(注) 文献追加

輪紋病 rimmon-byo Ring spot
Haematonectria haematococca (Berkeley & Broome) Samuels & Nirenberg
[Anamorph: *Fusarium* sp.]
廣岡裕史ら：日植病報 72(4):203, 2006 ; Hirooka, Y. et al: J. Gen. Plant Pathol. 73(5): 330, 2007

紫斑病 shihan-byo Purple spot
(1) *Fusarium phyllophilum* Nirenberg & O'Donnell
Kishi, K. et al.: Ann. Phytopathol. Soc. Jpn. 65(6):576, 1999
[備考] アロエ *A. arborescens* Millに発生
(注) 病原追加。本病病原 *F. proliferatum* var. *minus*は(2)となる。アロエはアロエ科
Aloaceae(p.279)としてユリ科(p.328)から移行する

ベルゲランツス p.279***

Bergeranthus jamesii L. Bolus

腐敗病 fuhai-byo Stem and foliage rot

Pythium myriotylum Drechsler

富岡啓介・佐藤豊三：日植病報 67(2):162, 2001；富岡啓介：近中四農研センター研報 5:91, 2005

ケイトウ

p.279

斑点病 hanten-byo Leaf spot

(2) *Pseudocercospora celosiarum* (Kar & Mandal) Deighton

Nakashima, C. et al.: Mycoscience 43:95, 2002

[備考] Katsuki (1965)は福岡県産標本を用いて*Cercospora celosiae* Sydow と同定したが、再検討の結果、誤同定で *P. celosiarum*が正しい。日本植物病名目録p.279の瀧元 (1939)が記載した*C. celosiae*が正しいかは不明

(注) 病原追加。これにより*Cercospora celosiae*は(1)となる

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

Colletotrichum gloeosporioides (Penzig) Penzig & Saccardo

高野喜八郎：日植病報 64(6):631, 1998

ハマオモト (ハマユウ、浜木綿)

p.280

オオハマオモト *C. asiaticum* L. var. *sinicum* Backer

インドハマユウ *C. latifolium* L.

赤斑病 sekihan-byo Red leaf spot

Stagonospora curtisii (Berkeley) Saccardo

天地沙織ら：日植病報 70(1):44, 2004；佐藤豊三・富岡啓介：日植病報 70(1):45, 2004

[備考] インドハマユウ、オオハマオモトに発生

ユーチャリス (アマゾンユリ)

p.281

微斑ウイルス病 bihan-virus-byo Mild mottle

Amazon lily mild mottle virus

花田 薫・福本文良：日植病報 67(2):176, 2001

モザイク病 mosaic-byo Mosaic

(2) *Cucumber mosaic virus*

Terami, F. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 79(3):192, 2004

(注) 病原追加。これにより*Amazon lily mosaic virus* は(1)となる

ウイルス病 virus-byo

Cucumber mosaic virus

Terami, F. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 70(3):192, 2004

(注) 文献追加

リコリス p.282

灰色かび病 hairo-kabi-byo Gray mold

(1) *Botrytis cinerea* Presoon: Fries

(2) *Botrytis galanthina* (Berkeley & Broome) Saccardo

塚本俊秀・磯田 淳：日植病報 70(3):225, 2004

スイセン p.282

首腐病 kubigusare-byo Neck rot

(1) *Botrytis galanthina* (Berkeley & Broome) Saccardo

塚本俊秀ら：日植病報 71(3):215, 2005

(2) *Botrytis narcissicola* Klebahn

高野喜八郎：日植病報 69(3):266, 2003

ニチニチソウ p.283

黄化えそ病 oka-eso-byo Spotted wilt

Tomato spotted wilt virus

河野敏郎ら：日植病報 65(6):651, 1999

葉腐病 hagusare-byo Leaf and stem blight

Rhizoctonia solani Kühn

小野 剛・星 秀男：関東病虫研報 56:75, 2009

[備考] 菌糸融合群 AG-4, 培養型 IIIA

白絹病 shirakinu-byo Southern blight

Sclerotium rolfsii Saccardo

植松清次ら：関東病虫研報 56:137, 2009

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

Colletotrichum gloeosporioides (Penzig) Penzig & Saccardo

富岡啓介ら：日植病報 73(3):178, 2007

[備考] 鍵渡(1987)による記載病原の特徴は *C. gloeosporioides*と判断しがたい。当該病害の根拠（病原）を再提示する

(注) 文献追加

ヒメツルニチニチソウ p.283

白絹病 shirakinu-byo Southern blight

Sclerotium delphinii Welch

植松清次ら：関東病虫研報 56:137, 2009

[備考] 植松ら(2009)は*S. rolfssii* var. *delphinii*を提案した

モンステラ

p.284

灰色葉枯病 haiiro-hagare-byo Gray leaf blight

Fusicoccum vegans (Spegazzini) Tak. Kobayashi & T. Okamoto

Kobayashi, T. & Okamoto, T.: J. Agr. Sci., Tokyo Univ. Agr. 48(3):89, 2003

スパシフィルム

p.285

疫病 eki-byo Phytophthora rot

Phytophthora nicotianae van Breda de Haan

堀之内勇人ら : 日植病報 65(3):413, 1999

根腐葉斑病 negusare-yohan-byo Root and petiole rot

Cylindrocladium spathiphylli Schouties, El-Gholl & Alfieri

堀之内勇人ら : 関西病虫研報 42:15, 2000

(注) 日本植物病名目録p.364の本病を削除する

シンゴニウム

p.285

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

Colletotrichum gloeosporioides (Penzig) Penzig & Saccardo

高野喜八郎 : 日植病報 69(1):63, 2003

[備考] *S. podophyllum* Schottに発生

カラ一

p.285

株腐病 kabugusare-byo Foot rot

Rhizoctonia solani Kühn

多賀由美子ら : 北陸病虫研報 46:71, 1998

[備考] 菌糸融合群 AG-2-2. 培養型 IIIB. オランダカイウに発生

褐斑病 kappan-byo Brown leaf spot

Cercospora richardiicola Atkinson

Nakashima, C. et al.: Mycoscience 43:95, 2002

[備考] 現在本菌は広義の *Cercospora apii* であるとして、[*Cercospora apii* sensu lato]が種名とともに記載されている。接種試験なし

オオトウワタ

p.286

裏うどんこ病 ura-udonko-byo Powdery mildew

Phyllactinia guttata (Wallroth: Fries) Léveillé

丹田誠之助 : 東農大農学集報 41(3):109, 1996

ルリトウワタ（ブルースター、オキシペタラム） p.286***

Tweedia caerulea D. don (=*Oxypetalum caeruleum* (D. Don) Decne)

疫病 eki-byo Phytophthora blight

Phytophthora palmivora (Butler) Butler

安達理恵ら：日植病報 75(1):72, 2009

萎凋病 icho-byo

Fusarium oxysporum Scheelechtendahl: Fries

山岸菜穂ら：関東病虫研報 55:190, 2008

白絹病 shirakinu-byo Southern blight

Sclerotium rolfsii Saccardo

植松清次ら：関東病虫研報 56:137, 2009

チャセンシダ類 p.286***

Asplenium spp.

くもの巣病 kumonosu-byo Web blight

Rhizoctonia solani Kühn

吉田政博ら：九病虫研会報 50:97, 2004

[備考] シマオオタニワタリ (*A. nidus* L.) に発生。菌糸融合群 AG-1, 培養型 IB

インパチエンス (アフリカホウセンカ) p.287

ニューギニア・インパチエンス *Impatiens x hybridus* Hort.

えそ斑紋病 eso-hammon-byo Necrotic spot

Impatiens necrotic spot virus

谷名光治ら：日植病報 66(2):147, 2000 : 谷名光治ら：日植病報 67(1):42, 2001

黄化えそ病 oka-eso-byo Spotted wilt

Tomato spotted wilt virus

河野敏郎ら：日植病報 65(6):651, 1999

[備考] ニューギニア・インパチエンス (*Impatiens x hybridus*) に発生

アルタナリア斑点病 *Alternaria-hanten-byo* Alternaria leaf spot

Alternaria alternata (Fries) Keissler

久保周子ら：日植病報 69(3):261, 2003

根腐病 negusare-byo Root rot

(1) *Pythium irregularare* Buisman

草刈眞一ら：日植病報 67(2):163, 2001

(2) *Pythium spinosum* Sawada

庄司俊彦ら：日植病報 65(3):43, 1999 ; 庄司俊彦ら：関東病虫研報 46:65, 1999
[備考] ニューギニア・インパチエンス(*Impatiens x hybridus*)に発生

白紋羽病 shiro-mompa-byo White root rot
Rosellinia necatrix Prillieux
小林享夫・高橋幸吉：日植病報 66(2):91, 2000

立枯病 tachigare-byo Rhizoctonia rot
Rhizoctonia solani Kühn
佐藤 衛ら：日植病報 75(3):186, 2009 ; 佐藤 衛ら：関東病虫研報 56:65, 2009
[備考] 佐藤ら(2009)の病原は菌糸融合群 AG-2-2, 培養型ⅢB
(注) 文献・備考追加

炭疽病 tanso-byo Anthracnose
Colletotrichum acutatum Simmonds ex Simmonds
高野喜八郎：北陸病虫研報 46:98, 1998

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew
Oidium balsaminae Rajdekar
丹田誠之助：東農大農学集報 43(3):173, 1997
[備考] ニューギニア・インパチエンス(*Impatiens x hybridus*)に発生

ベゴニア p.287
シュウカイドウ *B. evansiana* Ancrews
えそ斑紋病 eso-hammon-byo Necrotic mottle
Impatiens necrotic spot virus
黒川惠美ら：日植病報 69(1):67, 2003
[備考] 戻し接種なし。ベゴニアに発生

株腐病 kabugusare-byo Fusarium wilt
Fusarium foetens Schroers, O'Donnell, Baayen & Hooftman
関根崇行ら：日植病報 74(3):164, 2008

菌核病 kinkaku-byo Sclerotinia rot
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary
菅原 敬ら：日植病報 72(1):54, 2006

根腐病 negusare-byo Pythium root rot
Pythium helicoides Drechsler
宮崎暁喜ら：関西病虫研報 51:53, 2009

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

Oidium begoniae Puttemans var. *macrosporum* de Mendonça & Sequeira

丹田誠之助：東農大農学集報 42(3):173, 1997

[備考]シユウカイドウに発生

(注) 文献および宿主追加

ウルクス (ウルクス・トウベロスス) **Ulluco** p.287***

***Ullucus tuberosus* Caldas**

腰折病 koshiore-byo Foot rot

Pythium aphanidermatum (Edson) Fitzpatrick

Tomioka, K. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 68(2):189, 2002

エキウム p.288***

***Echium wildpretii* Pearson ex Hook.**

疫病 eki-byo Phytophthora rot

Phytophthora nicotianae van Breda de Haan

田中（三輪）千華ら：日植病報 73(3):180, 2007

カンパニュラ p.289

青枯病 aogare-byo Bacterial wilt

Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi, Kosako, Yano, Hotta & Nishiuchi 1996

Kusumoto, S. & Takikawa, Y.: J. Gen. Plant Pathol. 71(2):158, 2005

[備考] *C. lactiflora* Bret.に発生

褐斑細菌病 kappan-saikin-byo Bacterial brown spot

Pseudomonas cichorii (Swingle 1925) Stapp 1928

白川 隆・萩原 廣：日植病報 66(3):239, 2000

疫病 eki-byo Phytophthora rot

Phytophthora sp.

久保田まや：関東病虫研報 47:101, 2000

根朽病 nekuchi-byo Root rot

Phoma sp.

西川盾士：日植病報 71(3):215, 2005

イソトマ p.290***

***Laurentia axillaris* (Lindley) Wimmer**

灰色かび病 hairo-kabi-byo Gray mold

Botrytis cinerea Persoon: Fries
菅原 敬ら：北日本病虫研報 53:152, 2002

炭疽病 tanso-byo Anthracnose
Colletotrichum gloeosporioides (Penzig) Penzig & Saccardo
菅原 敬・築尾嘉章：北日本病虫研報 55:78, 2004

カーネーション、ナデシコ類 p.291
疫病 eki-byo Phytophthora blight
(1) *Phytophthora cryptogea* Pethybridge & Lafferty
植松清次ら：日植病報 74(3):180, 2008
(注) 病原追加。これにより *P. nicotianae* は(2)となる

茎腐病 kukigusare-byo Stem rot, Root rot
Rhizoctonia solani Kühn
杉山 悟：日植病報 65(3):405, 1999
[備考] 菌糸融合群 AG-2-2
(注) 文献追加

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew
Oidium dianthi Jacz.
高橋尚之・高松 進：日植病報 69(1):59, 2003
[備考] *Erysiphe buhrii* U. Braun. は未確認。カーネーション *D. caryophyllus* L. に発生。
接種試験なし

根腐病 negusare-byo Root and stem rot
(4) *Pythium myriotylum* Drechsler
岡田清嗣ら：日植病報 74(3):177, 2008；植松清次ら：関東病虫研報 55:191, 2008
[備考] カーネーション、ナデシコ「テルスター」に発生

ムシトリナデシコ p.295
モザイク病 mosaic-byo Mosaic
Cucumber mosaic virus
Okuno, K. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 68(1):108, 2002
(注) 文献追加。これにより日本植物病名目録p.295モザイク病の備考欄を削除する

白絹病 shirakinu-byo Southern blight
Sclerotium rolfsii Saccardo
竹内 純ら：関東病虫研報 45:126, 1998

オトギリソウ類 p.295

ピペリカム *Hypericum androsaemum* L.

セイヨウキンバイ *H. calycinum* L

褐紋病 katsumon-byo Diploceras brown leaf spot

Diploceras hypericinum (Cesati) Diedicke

竹内 純ら：日植病報 72(4):208. 2006

[備考] コボウズオトギリ *H. androsaemum*に発生

根腐疫病 negusare-eki-byo Phytophthora root rot

Phytophthora cinnamomi Rands

小林達男・植松清次：日植病報 66(3):302, 2000

[備考] コボウズオトギリ *H. androsaemum*に発生

さび病 sabi-byo Rust

Melampsora hypericorum Winter

堀江博道ら：関東病虫研報 50:117, 2003；堀江博道ら：関東病虫研報 51:87, 2004

[備考] セイヨウキンバイ *H. calycinum*, コボウズオトギリ *H. androsaemum* に発生

ムラサキオモト p.295

株腐病 kabugusare-byo Pythium rot

Pythium myriotylum Drechsler

鈴木幹彦ら：関東病虫研報 55:85, 2008

ノコギリソウ p.295

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

(1) *Golovinomyces cichoracearum* (de Candolle) Geljuta var. *cichoracearum*

星 秀男ら：日植病報 74(3):178, 2008

[備考] オオバノコギリソウ *A. ptarmica*に発生

(2) *Oidium asteris-punicei* Peck

丹田誠之助ら：東農大農学集報 44(3):115, 1999

[備考] ノコギリソウモドキ *A. stricta* Schle & Gromliに発生

(注) 病原および宿主追加。これにより *Oidium* sp.は(3)となる

セイヨウノコギリソウ p.296

白絹病 shirakinu-byo Southern blight

Sclerotium rolfsii Saccardo

星 秀男ら：関東病虫研報 50:109, 2003

シュッコンアスター p.297

菌核病 kinkaku-byo Sclerotinia rot

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary
竹内 純・堀江博道：関東病虫研報 46:57, 1999

茎腐小粒菌核病 kukigusare-shoryu-kinkaku-byo Small sclerotial stem rot
Sclerotinia minor Jaggar
庄司俊彦ら：日植病報 67(2):166, 2001；原田幸雄ら：日植病報 74(3):176, 2008
[備考] 庄司ら(2001)は本病病原を*Stromatinia* sp.としたが、原田ら(2008)はこれを
*Sclerotinia minor*に訂正した

さび病 sabi-byo Rust p.297
Coleosporium sp.
阿部淳一ら：日植病報 69(3):261, 2003

ミヤコワスレ p.297
褐斑病 kappan-byo Leaf spot
Septoria chrysanthemella Saccardo
Furukawa, T. & Kishi, K.: J. Gen. Plant Pathol. 69(2):151, 2003

デージー (ヒナギク) p.298
灰色かび病 hairo-kabi-byo Gray mold
Botrytis cinerea Persoon: Fries
庄司俊彦ら：関西病虫研報 41:85, 1999

センダングサ類 Bur-Marigold p. 298***
Bidens spp.
(野草のセンダングサ類も参照)
白絹病 shirakinu-byo Southern blight
Sclerotium rolfsii Saccardo
竹内 純ら：関東病虫研報 45:126, 1998
[備考] ウインターコスモス (キクセンダングサ *B. leavis* (L.) B.S.P.) に発生

そつか病 soka-byo Scab
Sphaceloma bidentis Bitancourt & Jenkins
今井 彩ら：日植病報 75(3):235, 2009
[備考] ウインターコスモス (キクセンダングサ *B. leavis*) に発生

ヒメコスモス p.298***
Brachycome iberidifolia Benth.
うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew
Oidium citrulli Yeng & Wang

- キンセンカ p.298
芽枯細菌病 megare-saikin-byo Bacterial blight
Pseudomonas cichorii (Swingle 1925) Stapp 1928
鶴巻直耕ら：日植病報 71(3):289, 2005
(注) 病原同定。これにより日本植物病名目録p.299の本病名の*と病原の項「病原細菌不詳」を削除
- 炭疽病 tanso-byo Anthracnose
(1) *Colletotrichum acutatum* Simmonds ex Simmonds
植松清次ら：日植病報 70(1):47, 2004
(注) 病原追加。これにより *C. gloeosporioides* は(2)となる
- アスター (エゾギク、翠菊) p.299
萎凋細菌病 ichū-saikin-byō Bacterial wilt
Erwinia chrysanthemi Burkholder, McFadden and Dimock 1953
Komatsu, T. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 68(1):105, 2002
- リゾクトニア立枯病 *Rhizoctonia-tachigare-byo* Rhizoctonia stem and root rot
Rhizoctonia solani Kühn
伊藤陽子ら：日植病報 72(4):204, 2006
[備考] 菌糸融合群 AG-2-2, 培養型 IIIB
- ヤグルマギク (矢車草、ヤグルマソウ) Cornflower p.300
Centaurea cyanus L.
(注) 植物の見出し名変更
- ノアザミ (ドイツアザミ) p.301
白絹病 shirakinu-byo Southern blight
Sclerotium rolfsii Saccardo
井 智史ら：関西病虫研報 42:47, 2000
- ハルシャギク p.301
ハルシャギク, キンケイギク, オオキンケイギク
斑点細菌病 hanten-saikin-byo Bacterial leaf spot
Pseudomonas cichorii (Swingle 1925) Stapp 1928
久保 花ら：日植病報 75(1):53, 2009
[備考] オオキンケイギクに発生

コスモス p.302

キバナコスモス *Cosmos sulphureus* Cav.

葉枯病 hagare-byo Leaf blight

Alternaria tenuissima (Kunze: Fries) Wiltshire

高野喜八郎：日植病報 71(1):73, 2006

[備考] コスモス、キバナコスモスに発生

灰色かび病 hairo-kabi-byo Gray mold

Botrytis cinerea Persoon: Fries

菅原 敬ら：北日本病虫研報 51:119, 2000

[備考] キバナコスモスに発生

白斑病 hakuhan-byo white smut

Entyloma cosmi Vánky, Horita & Jage

堀田治邦・羽賀安春：日植病報 64(6):582, 1998 ; Vánky, K. et al.: Mycoscience 46:364, 2005

[備考] コスモスに発生

萎黄病 io-byo Yellows

Phytoplasma

澤柳利実ら：日植病報 68(2):258, 2002

[備考] キバナコスモスに発生

菌核病 kinkaku-byo Sclerotinia rot

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary

岡田清嗣・湯ノ谷彰：関西病虫研報 50:123, 2008

茎枯病 kukigare-byo Stem blight

Phomopsis arctii (Lasch) Traverso

小林享夫・高橋幸吉：日植病報 66(1):91, 2002

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

Sphaerotheca fusca Blumer emend Braun

有賀麻貴ら：日植病報 66(3):272, 2000 ; 有賀麻貴ら：日植病報 67(2):116, 2001

[備考] チヨコレートコスモス *C. atrosanguineus* に発生

(注) 文献、備考追加

ダリア p.302

わい化病 waika-byo Stunt

Chrysanthemum stunt viroid

Nakashima, A. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 73(3):225, 2007

[備考] 罹病植物には他の数種ウイルスも混在しており、わい化が本ウイロイドによってのみ生じるか否かさらなる検討を要する

半身萎凋病 hanshin-icho-byo Verticillium wilt

Verticillium dahliae Klebahn

竹内 純・堀江博道：関東病虫研報 45:123, 1998

[備考] 本病原による萎凋病（日本植物病名目録 p.303）があるが、詳細不明のため萎凋病の項は削除し、本病名を採用する

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

(1) *Colletotrichum oribiculare* (Barkeley & Montagne) Arx

菅野博英ら：日植病報 65(6):661, 1999

(注) これにより *Gloeosporium dahliae* は(2)となる

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

(1) *Oidium* sp.

神谷敏広ら：日植病報 70(3):213, 2004

[備考] *Reticuloidium* 亜属に所属する。

(注) 病原追加。これにより *Sphaerotheca fusca* は(2)となる

キク

p.304

茎えそ病 kuki-eso-byo Stem necrosis

Chrysanthemum stem necrosis virus

松浦昌平ら：日植病報 73(1):68, 2007 ; Matsuura, S. et al.: Plant Dis. 91:468, 2007

[備考] RT-PCRによる検出。接種試験なし

わい化病 waika-byo Chlorotic mottle

Chrysanthemum chlorotic mottle viroid

Yamamoto, H. & Sano, T.: J. Gen. Plant Pathol. 71(2):156, 2005

[備考] RT-PCRによる検出。接種試験なし

(注) 病原追加。これにより *Chrysanthemum stunt viroid* は(2)となる

花腐細菌病 hanagusare-saikin-byo Bacterial blossom blight

Pseudomonas viridiflava (Burkholder 1930) Dowson 1939

尾松直志・鳥越博明：九州病虫研会報 49:56, 2003

[備考] スプレーギク *D. grandiflorum* に発生

緑化病 ryokka-byo Virescence

'*Candidatus Phytoplasma aurantifolia*'

Naito, T. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 73(2):139, 2007

疫病 eki-byo Phytophthora rot, Root rot

(2) *Phytophthora* sp.

渡辺秀樹ら : 日植病報 73(1):60, 2007 ; 築尾嘉章ら : 日植病報 73(3):180, 2007 ;

Naher, M. et al.: 日植病報 74(3):182, 2008

(注) 文献追加

フザリウム立枯病 *Fusarium-tachigare-byo* Fusarium blight

Fusarium solani (Martius) Saccardo

伊藤陽子ら : 日植病報 70(3):220, 2004

首垂病 kubitare-byo Top wilt

Stagonospora sp.

古川聰子ら : 日植病報 71(1):33, 2005

ピシウム立枯病 *Pythium-tachigare-byo* Pythium blight, Pythium root and stem rot

(1) *Pythium aphanidermatum* (Edson) Fitzpatrick

築尾嘉章ら : 日植病報 74(3):177, 2008

(2) *Pythium dissotocum* Drechsler

(3) *Pythium oedochilum* Drechsler

(4) *Pythium sylvaticum* Campbell & Hendrix

(5) *Pythium ultimum* Trow var. *ultimum*

月星隆雄ら : 日植病報 71(1):32, 2004 ; Tsukiboshi et al.: J. Gen. Plant Pathol. 73(4):293, 2007

小斑点病 sho-hanten-byo Ray speck

Stemphylium lycopersici (Enjoji) Yamamoto

西 菜穂子ら : 日植病報 73(3):177, 2007 ; Nishi, N. et al.; J. Gen. Plant Pathol. 75(1):80, 2009

[備考] キク (品種Anastasia) に発生

立枯病 tachigare-byo Root and stem rot

(2) binucleate *Rhizoctonia*

築尾嘉章ら : 日植病報 70(3):219, 2004

[備考] 菌糸融合群 AG-A。*Ceratobasidium cornigerum*と考えられる

(3) binucleate *Rhizoctonia*

築尾嘉章ら : 日植病報 74(3):177, 2008

[備考] 菌糸融合群 AG-F

(注) これにより *R. solani* は(1)となる

ルリタマアザミ

p.306

葉腐病 hagusare-byo Leaf rot

Rhizoctonia solani Kühn

菅原 敬ら：北日本病虫研報60:112, 2009

[備考] 菌糸融合群 AG-1, 培養型 IB。AG2-1による立枯病との比較検討を要する

灰色かび病 haiiro-kabi-byo Gray mold

Botrytis cinerea Persoon:Fries

菅原 敬ら：北日本病虫研報60:112, 2009

半身萎凋病 hanshin-icho-byo Verticillium wilt

Verticillium dahliae Klebahn

竹内 純・堀江博道：関東病虫研報 45:123, 1998

[備考] ナス系 (A群)

菌核病 kinkaku-byo Sclerotinia rot

Sclerotinia sp.

菅原 敬ら：北日本病虫研報60:112, 2009

[備考] rDNA ITS領域による系統解析では*S. minor*とは異なるが、*S. minor*による茎腐小粒菌核病と比較検討を要する

茎腐小粒菌核病 kukigusare-shoryu-kinkaku-byo Small sclerotial stem rot

Sclerotinia minor Jagger

忠 英一ら：日植病報 73(3):219, 2007；原田幸雄ら：日植病報 74(3):176, 2008

立枯病 tachigare-byo Stem and root rot

Rhizoctonia solani Kühn

竹内 純ら：関東病虫研報 45:131, 1998

[備考] 菌糸融合群 AG-2-1. 培養型 II

ガザニア

p.307

疫病 eki-byo Phytophthora blight

(1) *Phytophthora citricola* Sawada

(2) *Phytophthora nicotianae* van Breda de Haan

植松清次ら：日植病報 73(1):41, 2007

灰色かび病 haiiro-kabi-byo Gray mold

Botrytis cinerea Persoon: Fries

佐藤 衛ら：北日本病虫研報 48:129, 1997

白絹病 shirakinu-byo Southern blight

Sclerotium rolfsii Saccardo

井 智史ら：関西病虫研報 42:47, 2000

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

Colletotrichum dematum (Persoon: Fries) Grove

本橋慶一ら：日植病報 65(3):406, 1999

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

Oidium asteris-punicei Peck

丹田誠之助ら：東農大農学集報 44(3):115, 1999

[備考] ガザニア(*G. splendens* Hort.)に発生

ガーベラ

p.307

青かび病 aokabi-byo Penicillium blight

Penicillium olsonii Bainer & Sartory

鈴木幹彦ら：関東病虫研報 56:71, 2009

花腐病 hanagusare-byo Flower blight

Alternaria tenuissima (Kunze:Fries) Wiltshire

鈴木幹彦ら：関東病虫研報 56:71, 2009

株枯病 kabugare-byo Haematonectria blight, Crown and root rot, Nectria blight

Haematonectria ipomoeae (Halsted) Samuels & Nirenberg [*Fusarium striatum* Sherbakoff]

高橋智恵子ら：北日本病虫研報 50:108, 1999；多賀正節ら：日植病報 72(4):206, 2006

[備考] A.Y. Rossman *et al.* (Studies in Mycology 42:134, 1999)は、*Nectria heamatococca* complexを*Haematonectria*属に帰属させるとともに、ホモタリックな菌群を狭義の*H. heamatococca*とは別種の*H. ipomoeae*とした

茎腐病 kukigusare-byo Stem and root rot

Rhizoctonia solani Kühn

鈴木幹彦ら：日植病報 74(1):34, 2008

ピシウム根腐病 *Pythium-negusare-byo* Pythium root rot

Pythium helicoides Drechsler

鈴木幹彦ら：日植病報 75(3):237, 2009

紫斑病 shihan-byo Cercospora leaf spot

Cercospora gerberae Chupp & Vigas

竹内 純・堀江博道：日植病報 65(3):410, 1999

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

(1) *Colletotrichum orbiculare* (Berkeley & Montagne) von Arx

菅野博英ら：日植病報 65(6):661, 1999

(注) 病原追加。これにより *Colletotrichum* sp.は(2)とする

スイゼンジナ (キンジソウ)

p.308***

Gynura bicolor de Candolle

黒斑病 kokuhan-byo Alternaria leaf spot

Alternaria sp.

森川千春：日植病報 70(3): 216, 2004

ダンゴギク

p.308

白絹病 shirakinu-byo Southern blight

Sclerotium rolfsii Saccardo

窪田昌春ら：関西病虫研報 41:83, 1999

ヒマワリ

p.308

コヒマワリ *Helianthus decapetalus* var. *multiflorus*

退緑斑病 tairyokuhan-byo

Bidens mottle virus

野田千代一・河辺邦正：日植病報 66(3):261, 2000

疫病 eki-byo Phytophthora blight

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty

植松清次ら：日植病報 74(3):180, 2008

灰色かび病 haiiro-kabi-byo Gray mold

Botrytis cinerea Presoon: Fries

富岡啓介ら：四国植防 36:78, 2001

半身萎凋病 hanshin-icho-byo Verticillium wilt

Verticillium dahliae Klebahn

角野晶大・阿部秀夫：日植病報 65(4):498, 1999

[備考]ヒマワリに発生

(注) 文献追加

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

(2) *Oidium latisporum* Braun

丹田誠之助ら：東農大農学集報 44(3):115, 1999

[備考] 病原および宿主追加。シロタエヒマワリ *H. argophyllus* Torr. & A. Grayに発生

(3) *Oidium* sp. (subsp. *Reticuloidium* sp.)

神谷敏広ら：日植病報 70(3):213, 2004

[備考] ヒマワリ、コヒマワリに発生。接種試験なし

(注) 病原追加。これにより(3) *Sphaerotheca fusca* は(4)となる

ヘリクリサム（ムギワラギク） p.309

菌核病 kinkaku-byo Sclerotinia rot

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary

竹内 純・堀江博道：関東病虫研報 46:57, 1999

ヘリオプシス（キクイモモドキ） North american ox-eye p.309

Helianthus helianthoides (L.) Sweet

白絹病 shirakinu-byo Southern blight

Sclerotium rolfsii Saccardo

竹内 純ら：関東病虫研報 45:126, 1998

ロイカンセマム・パルドサム p.310

(異名：*Chrysanthemum paludosum* Poir.)

灰色かび病 hairo-kabi-byo Gray mold

Botrytis cinerea Persoon: Fries

菅原 敬ら：北日本病虫研報 51:119, 2000

[備考] *Chrysanthemum paludosum* はロイカンセマム・パルドサムの異名

リアトリス p.310

半身萎凋病 hanshin-icho-byo Verticillium wilt

Verticillium dahliae Klebahn

竹内 純・堀江博道：関東病虫研報 45:123, 1998

メタカラコウ類・ツワブキ p.310

褐色円斑病 kasshoku-maruhan-byo Brown leaf spot

Septoria sp.

佐野真知子ら：日植病報 75(3):235, 2009

[備考] ツワブキに発生

黒斑病 kokuhan-byo Black leaf spot

Phoma sp.

Furukawa, T. & Kishi, K.: J. Gen. Plant Pathol. 70:292, 2004

[備考] ツワブキに発生

輪紋病 rimmon-byo Circular leaf spot

Phoma sp.

Furukawa, T. & Kishi, K.: J. Gen. Plant Pathol. 70:292, 2004

[備考] ツワブキに発生

白絹病 shirakinu-byo Southern blight

Sclerotium rolfsii Saccardo

森田 昭 : 九病虫研会報 52:1, 2006

[備考] ツワブキに発生

メランポジウム

p.310***

Melampodium paludosum L.

灰色かび病 haiiro-kabi-byo Gray mold

Botrytis cinerea Persoon: Fries

菅原 敬ら : 北日本病虫研報 59:82, 2008

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

Oidium asteris-punicei Peck

丹田誠之助 : 東農大農学集報 47(4):290, 2003

オステオスペルマム

p.311***

Osteospermum ecklonis (de Candolle) Norlindh

Osteospermum × hybridum

灰色かび病 haiiro-kabi-byo Gray mold

Botrytis cinerea Persoon: Fries

菅原 敬ら : 北日本病虫研報 51:119, 2000

[備考] *O. hybridum*に発生

菌核病 kinkaku-byo Sclerotinia rot

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary

菅原 敬ら : 日植病報 72(1):54, 2006

[備考] *Osteospermum × hybridum*に発生

円斑病 maruhan-byo Circular leaf spot

Cercospora apii sensu lato

西川盾士・中島千晴 : 日植病報 73(1):62, 2007

[備考] *O. ecklonis*に発生

白絹病 shirakinu-byo Southern blight

Sclerotium rolfsii Saccardo

西川盾士・中島千晴：日植病報 73(1):62, 2007

[備考] *O. ecklonis*に発生

ジャノメギク

p.311***

Sanvitalia procumbens Lam.

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

Oidium asteris-punicei Peck

丹田誠之助ら：東農大農学集報 44(3):115, 1999

シロタエギク

p.311***

Senecio cineraria de Candolle

輪斑病 rghan-byo Leaf spot

Alternaria cinerariae Hori & Enjoji

高野喜八郎：日植病報 67(2):167, 2001

ルドベキア

p.311

黒斑病 kokuhan-byo Leaf spot

Alternaria alternata (Fries) Keissler

佐藤 衛ら：日植病報 76(1):41, 2010

シネラリア (サイネリア、フウキギク)

p.311

えそ斑紋病 eso-hammon-byo Necrotic spot

Impatiens necrotic spot virus

谷名光治ら：日植病報 66(2):147, 2000；谷名光治ら：日植病報 67(1):42, 2001

黄化えそ病 oka-eso-byo Spotted wilt

Tomato spotted wilt virus

河野敏郎ら：日植病報 64(6):597, 1998

黒根病 kurone-byo Black root rot

Chalara elegans Nag Raj & Kendrick

堀田治邦ら：日植病報 68(1):105, 2002

ソリダゴ

p.311***

x *Solidago canadensis* L. 及び種間雑種

根頭がんしゅ病 konto-ganshu-byo Crown gall

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend 1907) Conn 1942

西 菜穂子ら：日植病報 74(3):253, 2008

さび病 sabi-byo

Coleosporium solidaginis Thum. ex Arth.

尾松直志・鳥越博明：九病虫研会報 48:42, 2002

[備考] 品種「タラ」に発生

(注) 本植物種は、カナダアキノキリンソウ(*Solidago canadensis* L.) とオオアワダチソウ(*Solidago serotina* Ait.) およびその改良品種の種間雑種である。

ソリダスター

p.311

さび病 sabi-byo Rust

Coleosporium solidaginis Thümen ex Arthur

Harada, Y.: Trans. Mycol. Soc. Japan 25:288, 1984 ; Harada, Y.: Mycoscience 35:295, 1994

マリーゴールド (アフリカンマリーゴールド、フレンチマリーゴールド) p.312

黄化えそ病 oka-eso-byo Spotted wilt

Tomato spotted wilt virus

河野敏郎ら：日植病報 64(6):597, 1998

斑点病 hanten-byo Leaf spot

Alternaria tagetica Shome & Mustafee

富岡啓介ら：日植病報 65(3):406, 2000 ; Tomioka, K. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 66(4):294, 2000 ; 富岡啓介：近中四農研センター研報 5:91, 2005

ナツシロギク

p.312

萎凋病 icho-byo Fusarium wilt

Fusarium oxysporum Schlechtendahl: Fries f.sp. *tanaceti* Hirooka, Matsumoto & Tak. Kobayashi

松本 譲ら：日植病報 72(1):47, 2006 ; 廣岡裕吏ら：日植病報 74(1):7, 2008

ジニア

p.312

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

(1) *Oidium* sp.

星 秀男ら：日植病報 73(3):182, 2007

[備考] *Reticuloidium* 亜属

(注) これにより *Sphaerotheca fusca* は(2)となる

アサガオ

p.314

灰色かび病 haiiro-kabi-byo Gray mold

Botrytis cinerea Persoon: Fries

高野喜八郎ら：北陸病虫研報 43:81, 1995

(注) 文献追加。日本植物病名目録p.314本病の備考欄「接種試験は未確認」は削除する

黒斑病 kokuhan-byo Leaf spot

Alternaria alternata (Fries) Keissler

佐藤 衛ら : 日植病報 76(1):41, 2010

白さび病 shirosabi-byo White rust

Albugo ipomoeae-panduratae (Schweinitz) Swingle f. sp. *nile* Toy. Sato & J. Okamoto

[*Albugo ipomoeae-panduratae* (Schweinitz) Swingle]

佐藤豊三ら : 日植病報 66(3):271, 2000 ; 佐藤豊三ら : 日植病報 75(1):46, 2009 ; Sato, T. et al.; J. Gen. Plant Pathol. 75(1):46, 2009

グラフトペタラム

p.314***

***Graptotetalum* spp.**

軟腐病 nampu-byo Bacterial soft rot

Erwinia carotovora subsp. *carotovora* (Jones 1901) Bergey, Harrison, Breed, Hammer & Huntoon 1923

富樺二郎・生井恒雄 : 日植病報 66(3):266, 2000

[備考] *G. paragayayense* (N. E. Br.) E. Walth. (園芸名・おぼろつき)に発生

カラシコエ

p.314

疫病 eki-byo Phytophthora rot, Root and stem rot

(1) *Phytophthora nicotianae* van Breda de Haan

Watanabe, H. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 73(2):81, 2007

(注) 病原追加。病名の英名を追加。*Phytophthora* sp. は(2)となる

斑点病 hanten-byo Leaf spot

Stemphylium lycopersici (Enjoji) Yamamoto

富岡啓介 : 近中四農研センター研報 5:91, 2005

(注) 文献追加

褐斑病 kappan-byo Myrothecium rot and leaf spot

Myrothecium roridum Tode: Fries

堀之内勇人ら : 関西病虫研報 41:33, 1999

根腐病 negusare-byo Pythium rot, Root and stem rot

(1) *Pythium helicoides* Drechsler

(2) *Pythium myriotylum* Drechsler

渡辺秀樹ら : 日植病報 68(1):77, 2002 ; Watanabe, H. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 73(2):81, 2007

ハボタン

p.315

疫病 eki-byo Phytophthora rot

Phytophthora cryptogea Pethbridge & Lafferty

月星隆雄ら：日植病報 72(4):207, 2006

葉腐病 hagusare-byo Rhizoctonia rot

Rhizoctonia solani Kühn

庄司俊彦ら：日植病報 68(1):66, 2002

[備考] 菌糸融合群 AG-1. 培養型 IA

黒斑病 kokuhan-byo Black spot

Alternaria brassicicola (Schweinitz) Wiltshire

西川盾士：日植病報 72(4):200, 2006

黒腐病 kurogusare-byo Black rot

Xanthomonas campestris pv. *campesteris* (Pammel 1895) Dowson 1939

神頭武嗣ら：日植病報 69(4):422, 2003

苗立枯病 nae-tachigare-byo Damping-off

Rhizoctonia solani Kühn

杉山 悟ら：北日本病虫研報 58:193, 2007

[備考] 菌糸融合群 AG-4

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

Erysiphe cruciferarum Opiz ex Junell

丹田誠之助ら：東農大農学集報 44(3):115, 1999

[備考] マルバハボタン *B. oleracea* L. var. *acephala* A. P. de Candolleに発生

バーティシリウム萎凋病 *Verticillium-icho-byo* Verticillium wilt

Verticillium nigrescens Pethbridge

神頭武嗣ら：日植病報 73(1):62, 2007

ストック

p.316

花枯炭疽病 hanagare-tanso-byo Anthracnose

Colletotrichum acutatum Simmonds ex Simmonds

菅原 敬ら：日植病報 75(1):57, 2009 ; 菅原 敬ら：日植病報 75(2):119, 2009

苗腐病 naegusare-byo Daming-off

(1) *Pythium irregularare* Buisman

(2) *Pythium ultimum* Trow var. *ultimum*

(3) *Pythium* sp. (group F)

(4) *Pythium* sp.

田中千華ら：日植病報 74(1):34, 2008

(注) 病原追加, 文献追加

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

(1) *Colletotrichum destructivum* O'Gara

森脇丈治ら：日植病報 69(3):259, 2003

(注) *Colletotrichum* sp. は(2)となる

オオアラセイトウ (ショカツサイ) p.316***

Orychophragmus violaceus O. E. Schulz

黒斑病 kokuhan-byo Alternaria leaf spot

Alternaria japonica Yoshii

高野喜八郎：日植病報 68(1):79, 2002

スカビオサ (セイヨウマツムシソウ) p.316

べと病 beto-byo Downy mildew

Peronospora knautiae Fuckel

佐藤 衛ら：日植病報 75(1):52, 2009；佐藤 衛ら：関東病虫研報 56:63, 2009

ポインセチア p.316

疫病 eki-byo Phytophthora blight

Phytophthora nicotianae van Breda de Haan

神頭武嗣ら：日植病報 70(3):214, 2004

[備考] ポインセチア *E. puicherrima* Wild.に発生

斑点病 hanten-byo Bract spot

Corynespora cassiicola (Barkeley & M. A. Curtis) C. T. Wei

神頭武嗣ら：関西病虫研報 51:123, 2009

[備考] 神頭ら(2009)は *Glomerella* sp.を本病の1病原としたが、英名の Anthracnose に基づき炭疽病の病原に移した

褐斑病 kappan-byo Leaf spot

Alternaria sp.

井上幸次ら：日植病報 70(3):216, 2004

根腐病 negusare-byo Pythium root rot

(1) *Pythium aphanidermatum* (Edson) Fitzpatrick

渡辺秀樹ら：日植病報 74(3):178, 2008

(注) 病原追加。これにより *Pythium* sp. は(2)となる。付録の本病名は削除

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

(1) *Colletotrichum capsici* (Sydow) E. J. Butler & Bisby

佐藤豊三ら：日植病報 74(3):175, 2008；佐藤豊三ら：四国植防 43:1, 2008

(2) *Glomerella* sp.

神頭武嗣ら：関西病虫研報 51:123, 2009

[備考] 神頭ら(2009)は *Glomerella* sp. を斑点病の 1 病原としたが、英名の Anthracnose に基づき本病の病原に移した

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

病原未確定

堀江博道ら：日植病報 72(4):208, 2006；星 秀男ら：関東病虫研報 53:164, 2006

[備考] 接種試験なし

トルコギキョウ

p.317

えそ斑紋病 eso-hammon-byo Necrotic spot

Impatiens necrotic spot virus

土井 誠・加藤公彦：日植病報 68(2):231, 2002；土井 誠・加藤公彦：関東病虫研報 50: 83, 2003

えそ萎縮病 eso-ishuku-byo Necrotic stunt

Tomato bushy stunt virus

藤永真史ら：日植病報 71(3):233, 2005；日植病報 72(2):109, 2006，善正二郎・藤 晋一：日植病報 72(1):28, 2006

[備考] 未同定 *Tombusvirus* が見出されている

えそモザイク病 eso-mosaic-byo Clover yellow vein virus

(1) *Clover yellow vein virus*

山下一夫・福井要子：日植病報 66(3):263, 2000

(注) 病原追加。これにより *Cucumber mosaic virus* は(2)となる

えそ輪紋病 eso-rimmon-byo Necrotic ringspot

Iris yellow spot virus

土井 誠・加藤公彦：日植病報 68(2):231, 2002；花田 薫ら：日植病報 68(2):234, 2002；岡本 潤ら：日植病報 69(1):22, 2003；岡本 潤ら：九州農業研究 65:92, 2003；土井 誠ら：日植病報 69(3):181, 2003

葉巻病 hamaki-byo Leaf curl

Tomato yellow leaf curl virus

内川敬介ら：日植病報 68(1):50, 2002

モザイク病 *mosaic-byo* Mosaic

Youcail mosaic virus

山下一夫・杉山 悟：日植病報 64(6):605, 1998；山下一夫・福井要子：日植病報 68(2):23
5, 2002

(注) 病原追加（再同定）

黄化えそ病 *oka-eso-byo* Spotted wilt

Tomato spotted wilt virus

黒田智久ら：日植病報 65(4):490, 1999

(注) 文献追加

萎凋細菌病 *icho-saikin-byo* Bacterial wilt

Burkholderia caryophylli (Burkholder 1942) Yabuuchi, Kosako, Oyaizu, Yano, Hotta,
Hashimoto, Ezaki & Arakawa 1993

Furuya, N. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 66(4):316, 2000

(注) 文献追加

青かび根腐病 *aokabi-negusare-byo* Penicillium rot, Blue mold root rot

Penicillium sp.

小野光代・平子喜一：日植病報 64(6):611, 1998；長浜 恵ら：日植病報 65(6):693, 1999

白絹病 *shirakinu-byo* Southern blight

Sclerotium rolfsii Saccardo

富田恭範・小木曾秀紀：関東病虫研報 46:49, 1999

立枯病 *tachigare-byo* Root rot

(1) *Fusarium oxysporum* Schlechtendahl: Fries

外側正之ら：日植病報 74(1):35, 2008

[備考] 病原性確認

(注) 文献追加。これにより備考欄を削除

(2) *Fusarium solani* (Martius) Saccardo

富岡啓介ら：日植病報 68(2):185, 2002

(注) 文献追加。これにより備考欄を削除

炭疽病 *tanso-byo* Anthracnose

(2) *Glomerella cingulata* (Stonemam) Spaulding & Schrenk

菅原 敬ら：日植病報 75(1):57, 2009

(注) これにより *C. acutatum* は(1)となる

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

Oidium subgenus *Pseudoidium*

岡本 潤：日植病報 65(6):643, 1999；岡本 潤：九農研 62:69, 2000；岡本 潤・高松

進：植物防疫 56(6):242, 2002；Okamoto, J. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 68(3):200, 2002

[備考] *Erysiphe polygoni*型

エキザカム

p.318

えそ斑紋病 eso-hammon-byo Necrotic spot

Impatiens necrotic spot virus

後藤知昭ら：日植病報 67(2):173, 2001；後藤知昭ら：関東病虫研報 48:97, 2001

[備考] 戻し接種なし

リンドウ

p.318

えそ斑紋病 eso-hammon-byo Necrotic mottle

Impatiens necrotic spot virus

猫塚修一ら：日植病報 71(3):183, 2005

モザイク病 mosaic-byo Mosaic

(1) *Cucumber mosaic virus*

長尾記明ら：九州病虫研会報 24:180, 1978；小湊正幸ら：日植病報 65(3):391, 1999

(注) これにより日本植物病名目録p.318ウイルス病の病原の(2)項(病原、文献、備考)を削除

(2) Gentian mosaic virus

Kobayashi, Y. O. et al.: Phytopathology 95(2): 192, 2005

てんぐ巣病 tengusu-byo Witches' broom

(1) 'Candidatus Phytoplasma asteris'

田中 穂ら：日植病報 72(4):191, 2006

(注) 病原追加。これにより *Phytoplasma* は(2)となる

花腐菌核病 hanagusare-kinkaku-byo Sclerotial flower blight

Ciborinia gentianae I. Saito & Kaji

Saito, I. and Kaji, K. Mycoscience 47:41, 2006

灰色かび病 haiiro-kabi-byo Gray mold

Botrytis cinerea Persoon: Fries

庄司俊彦：関東病虫研報 46:73, 1999

[備考] 文献追加

褐斑病 kappan-byo Brown leaf spot

Mycochaetophora gentianae Tak. Kobayashi, Kasuyama & Nasu

小林享夫ら：日植病報 70(3):225, 2004；小林享夫ら：日植病報 75(1):1, 2009

[備考] 粕山ら(1988)は本病原をもって *Thallosporiella gentianae* Yokoyama & Kasuyama を提案していたが、小林らは *M. gentianae* と同定

黒斑病 kokuhan-byo Black rot

Alternaria alternata (Fries) Keissler

猫塚修一ら：日植病報 69(1):27, 2003

根腐病 negusare-byo Root rot

Pythium irregularare Buisman

庄司俊彦ら：関東病虫研報 46:69, 1999

さび病 sabi-byo Rust

(1) *Puccinia moliniae* Tulasne

仲谷房治：北日本病虫研報 56:55, 2005；仲谷房治・原田幸雄：北日本病虫研報 59:77, 2008

[備考] エゾオヤマリンドウ (*Gentiana triflora* Pall. var. *japonica* f. *montana* (Hara) Toyokuni) に発生

(注) これにより *Puccinia* sp. は(2)となる

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

(1) *Colletotrichum acutatum* Simmonds ex Simmonds

(2) *Colletotrichum gloeosporioides* (Penzig) Penzig & Saccardo

中山喜一ら：関東病虫研報 51:101, 2004

[備考] リンドウ *G. scabra* var. *buergeri* に発生

さび病 sabi-byo Rust

Puccinia sp.

仲谷房治・原田幸雄：日植病報 71(1):50, 2005

ゼラニウム

p.319

ペラルゴニアム *Pelargonium domesticum* Bailey

ゼラニウム *Pelargonium x hortorum*

アイビーゼラニウム *Pelargonium peltatum* (L.) L'Hér. ex Ait

ニオイゼラニウム *Pelargonium graveolens* L'Hér.

青枯病 aogare-byo Bacterial wilt

Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuchi, Kosako, Yano, Hotta & Nishiuchi 1996

尾崎克巳・渡部 洋：九病虫研会報 50:98, 2004

褐斑病 kappan-byo Alternaria leaf spot

Alternaria alternata (Fries) Keissler

Furukawa, T. & Kishi, K.: Ann. Phytopathol. 47(4):268, 2001

[備考] 文献追加。高野(1993)はゼラニウムに、Furukawa & Kishi(2001)はペラルゴニウム、
アイビーゼラニウム、ニオイゼラニウムに発生確認

(注) 日本植物病名目録p.319のゼラニウムの学名改訂

茎腐病 kukigusare-byo Pythium blackleg

(2) *Pythium irregularare* Buisman

渡辺秀樹ら：日植病報 72(1):72, 2006

(注) これにより(2) *P. splendens*は(3)に、(3) *Pythium* sp.は(4)となる

黒根病 kurone-byo Black root rot

Thielaviopsis basicola (Berkeley & Broome) Ferraris

西川盾士：日植病報 71(3):215, 2005；西川盾士：日植病報 73(4):309, 2007

[備考] ペラルゴニウムに発生

根朽病 nekuchi-byo Root rot

Phoma sp.

西川盾士：日植病報 71(3):215, 2005

円星病 maruhoshi-byo Circular leaf spot

Cercospora brunkii Ellis & Galloway

Nakashima, C. et al.: Mycoscience 43:95, 2002

[備考] 現在本菌は広義の*Cercospora apii*であるとして、[*Cercospora apii* sensu lato]が
種名とともに記載されている。接種試験なし

さび病 sabi-byo Rust

Uredo sp.

堀越紀夫ら：日植病報 70(3):224, 2004

[備考] ゼラニウム*Pelargonium x hortorum*に発生

セントポーリア p.319

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

Oidium sp.

佐藤 衛ら：北日本病虫研報 53:149, 2002

[備考] 接種試験なし

クロッカス p.321

葉枯病 hagare-byo Gray mold

Botrytis tulipae (Libert) Hopkins

高野喜八郎：日植病報 65(3):409, 1999

[備考] クロッカスに発生

灰色かび病 haiiro-kabi-byo Gray mold

Botrytis cinerea Persoon: Fries

高野喜八郎：日植病報 65(3):409, 1999

[備考] クロッカスに発生

フリージア p.321

首腐病 kubigusare-byo Bacterial scab, Neck rot

(2) *Erwinia ananas* Serrano 1928

阿部雄幸ら：北日本病虫研報 51:115, 2000

(注) 病原追加。これにより *Burkholderia gladioli* pv. *gladioli* は(1)となる

ボトリチス病 *Botrytis*-byo Botrytis blight

Botrytis gladiolorum Timmermans

塚本俊秀：島根病害虫研報 28:16, 2003

グラジオラス p.322

ウイルス病 virus-byo Virus

(2) *Cycas necrotic stunt virus*

Hanada, K. et al.: J. Gen. Plan Pathol. 72(6):383, 2006

イリス類 (ハナショウブ) p.323

疫病 eki-byo Phytophthora basal rot

Phytophthora sp.

雨宮良幹ら：日植病報 75(3):184, 2009

[備考] ハナショウブに発生。ITS配列から *Phytophthora europaea* と近縁とした

灰色かび病 haiiro-kabi-byo Gray mold

Botrytis cinerea Persoon: Fries

高野喜八郎・谷口操枝：北陸病虫研報 43:81, 1995

[備考] ジャーマンアイリス、ダッチアイリスに発生

アジュガ p.325

株枯病 kabugare-byo Phoma rot

Phoma eupyrena Saccardo

竹内 純ら：関東病虫研報 45:135, 1998

サルビア

p.325

灰色かび病 haiiro-kabi-byo Gray mold

Botrytis cinerea Persoon: Fries

山本智史ら：北日本病虫研報 50:112, 1999

(注) 文献追加

斑点病 hanten-byo *Corynespora* leaf spot

Corynespora cassiicola (Berkeley & Curtis) Wei

古川聰子ら：日植病報 73(3):179, 2007 ; Furukawa, T. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 74(2):117, 2008

褐斑病 kappan-byo *Alternaria* leaf spot

Alternaria alternata (Fries) Keissler

Negishi, H. & Suyama, K.: J. Gen. Plant Pathol. 68(4):321, 2002

(注) 文献追加

菌核病 kinkaku-byo *Sclerotinia* rot

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary

岡田清嗣ら：日植病報 73(3):179, 2007

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

Oidium hormini Farnetti

丹田誠之助ら：東農大農学集報 44(3):115, 1999

[備考] ブルーサルビア *S. farinacea* Benth.に発生

マウンテンミント Mountain mint

p.325***

Pycnanthemum pilosum Nutt.

灰色かび病 haiiro-kabi-byo Gray mold

Botrytis cinerea Persoon: Fries

漆原寿彦ら：関東病虫研報 48:93, 2001

コリウス

p.326

べと病 beto-byo Downy mildew

Peronospora sp.

伊藤陽子ら：日植病報 74(1):34, 2008

根腐病 negusare-byo

Pythium spinosum Sawada

スイートピー

p.326

灰色かび病 hairo-kabi-byo Gray mold

Botrytis cinerea Persoon: Fries

堀江博道・栄森弘己：関東病虫研報 48:61, 2001

株枯病 kabugare-byo Wilt

Fusarium oxysporum Schlechtendahl: Fries

今村幸久ら：日植病報 71(3):223, 2005；今村幸久ら：九病虫研会報 54:30, 2008

立枯病 tachigare-byo Damping-off

(1) *Pythium aphanidermatum* (Edson) Fitzpatrick

松浦 明ら：日植病報 67(2):162, 2001；松浦 明・築尾嘉章：九州病虫研会報 49:66, 2003

(2) *Pythium miriostylum* Drechsler

松浦 明ら：日植病報 67(2):162, 2001；松浦 明・築尾嘉章：九州病虫研会報 49:66, 2003

(3) *Pythium ultimum* Trow var. *ultimum*

鈴木幹彦ら：関西病虫研報 50:111, 2008

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

(1) *Colletotrichum acutatum* Simmonds ex Simmonds

(2) *Colletotrichum truncatum* (Schweinitz) Andrus & Moore

竹内 純・堀江博道：日植病報 68(1):66, 2002

(注) 病原追加。これにより *Glomerella cingulata* は(3)となる

デザートピー (スチュアートピー) Desert pea, Sturt's desert pea p.327***

Cianthus formosus (G. Don) Ford & Vickery

黒根病 kurone-byo Black root rot

Chalara elegans Nag Raj & Kendrick

奈尾雅浩：四国植防 36:19, 2001

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

Oidium sp.

丹田誠之助ら：東農大農学集報 44(3):115, 1999

トキリマメ

p.327***

Rhynchosia acuminatifolia Makino

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

Colletotrichum gloeosporioides (Penzig) Penzig & Saccardo
Harada, M. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 74(4):341, 2008

アルブカ p.328***

Albuca nelsonii N. E. Br.

疫病 eki-byo Phytophthora rot

Phytophthora nicotianae van Breda de Haan

竹内 純・堀江博道：関東病虫研報 47:45, 2000

アリウム類 p.328

青かび病 aokabi-byo Blue mold

Penicillium sp.

守川俊幸ら：北陸病虫研報 38:122, 1990

[備考] 本病原の形態記載なし。*A. gigantieum* Regelに発生

(注) 病名変更。これにより日本植物病名目録p.367に記載されているアリウム類鱗茎腐敗症の項を削除する

腐敗病* fuhai-byo Bacterial rot

Erwinia ananas Serrano 1928

多賀由美子ら：北陸病虫研報 47:55, 1999

[備考] *A. giganteum*に発生。本病原には*Pantoea ananatis* corring. (Serrano 1928)

Mergaert et al. 1993が提案されている

黒斑病 kokuhan-byo Purple blotch

Alternaria porri (Ellis) Ciferri

菅野博英：北日本病虫研報 54:76, 2003

[備考] アリウム・ギガンテウム *A. giganteum*に発生

アルストロメリア p.328

黄化えそ病 oka-eso-byo Spotted wilt

Tomato spotted wilt virus

高橋義行ら：関東病虫研報 45:105, 1998；高橋義行ら：関東病虫研報 46:77, 1999

条えそ病 suji-eso-byo Necrotic streaks

Iris yellow spot virus

奥田 充ら：日植病報 71(2):119, 2005

ウイルス病 virus-byo Virus

(2) *Alstroemeria virus X*

Fuji, S. et al.: Arch. Virol. 150:2377, 2005

[備考] *Alstroemeria ligtu*への戻し接種は無病徵（全身感染、RT-PCRによる確認）

(注) 病原追加。これにより(2)*Arabis mosaic virus*は(3)に、その他の番号も変更

Iris yellow spot virus

花田 薫ら：日植病報 66(3):259, 2000；奥田充ら：日植病報 71(2):119, 2005

[備考] 本病原は条えそ病の項に移行する。戻し接種は未成功

アルストロメリア

p.328

黒斑病 kokuhan-byo Black spot

Alternaria alstroemерiae E. G. Simmons & C. F. Hill

山岸菜穂ら：日植病報 75(1):71, 2009；Yamagishi, N. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 75(5): 401, 2009

根茎腐敗病 konkei-fuhai-byo Pythium rot

(1) *Pythium aphanidermatum* (Edson) Fitzpatrick

竹内 純・堀江博道：日植病報 65(3):410, 1999

(2) *Pythium helicoides* Drechsler

(3) *Pythium myriotylum* Drechsler

菅原 敬ら：日植病報 76(1):44, 2010

クサスギカズラ（アスパラガス）類

p.328***

Asparagus spp.

スマイラックス *A. asparagoides* (L.) W. F. Wight

タチテンモンドウ *A. pygmaeus* (Makino) Makino

根腐病 negusare-byo Root rot

Pythium splendens Braun

久保田まや：関東病虫研報 47:97, 2000

(注) 日本植物病名目録(2000) 野生植物クサナギカズラ（アスパラガス）類はp.184から草花p.328へ移動する

コルチカム

p.329

白絹病 shirakinu-byo Southern blight

Sclerotium rolfsii Saccardo

井 智史ら：関西病虫研報 44:71, 2002

キキヨウラン umbrella dracaena

p.329***

Dianella ensifolia (L.) DC.

紋枯病 mongare-byo Sheath blight

Rhizoctonia solani Kühn

小野 剛・星 秀男：関東病虫研報 56:75, 2009

[備考] 菌糸融合群 AG-2-2, 培養型 IIIB

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

Colletotrichum gloeosporioides (Penzig) Penzig & Saccardo

竹内 純ら：関東病虫研報 55:93, 2008

ヘメロカリス

p.330

斑点病 hanten-byo Leaf spot

(1) *Botrytis polyblastis* Dowson

塚本俊秀・磯田 淳：日植病報 68(2):183, 2002

[備考] ヤブカンゾウ(*Hemerocallis fulva* L. var. *kwanso* Regel)に発生

(2) *Botrytis* sp.

塚本俊秀・磯田 淳：日植病報 74(3):184, 2008

[備考] ヤブカンゾウ(*Hemerocallis fulva* L. var. *kwanso* Regel)に発生

ギボウシ類

p.330

褐色葉枯病 kasshoku-hagare-byo Leaf blight

Botrytis squamosa J. C. Walker

塚本俊秀：日植病報 66(2):92, 2000

さび病 sabi-byo Rust, Plantainlily rust

Puccinia funkiae Dietel

Ono, Y.: J. Gen. Plant Pathol. 71(2):99, 2005

[備考] *P. funkiae* は*P. hemerocallidis*とは別種。オオバギボウシ(*H. sieboldiana* Engl.)、コバギボウシ(*H. sieboldii*)、タチギボウシ、イワギボウシ(*H. longipes* (Fr. & Sav.) Matsumura)、スジギボウシ、トウギボウシに発生

(注) 病原学名変更。日本植物病名目録p.330の本病原学名を削除

ヒアシンス

p.331

腐敗病 fuhai-byo Fusarium rot

Gibberella zaeae (Schweinitz) Petch (anamorph: *Fusarium graminearum* Schwabe)

富岡啓介・佐藤豊三：日植病報 70(3):221, 2004 ; Tomioka, K. et al.: J. Gen. Plant Pathol.

74(3):264, 2008

緑かび病 midori-kabi-byo Green mold

(1) *Penicillium hirsutum* Dierckx

(2) *Penicillium puberulum* Bainier

佐藤豊三ら：日植病報 69(1):39, 2003

トリトマ (ツルボラン) Red-hot poker p.331***

Kniphofia x hybrida Hort.

苗立枯病 nae-tachigare-byo Seedling blight

Pythium aphanidermatum (Edson) Fitzpatrick

庄内玲子ら：関西病虫研報 41:67, 1999

白絹病 shirakinu-byo Southern blight

Sclerotium rolfsii Saccardo

窪田昌春ら：関西病虫研報 41:83, 1999

ユリ類

p.331

えそ病 eso-byo Necrosis

Plantago asiatica mosaic virus と *Lily mottle virus* の重複感染

萩田孝志・田村 修：日植病報 58(4):616, 1992；佐々木純ら：日植病報 67(2):176, 2001；

竹内 徹・佐々木純：日植病報 69(3):329, 2003

[備考] 食用ユリに発生

(注) 病原学名変更。これにより日本植物病名目録p.331の本病病原ならびに文献、備考を削除

モザイク病 mosaic-byo Mosaic

(2) *Plantago asiatica mosaic viurs*

高橋修一郎ら：日植病報 69(3):330, 2003

灰色かび病 hairo-kabi-byo Gray mold

Botrytis cinerea Persoon: Fries

塚本俊秀：日植病報 65(3):409, 1999

株腐病 kabugusare-byo Foot rot

Rhizoctonia solani Kühn

森田康彰・川田洋一：日植病報 68(1):78, 2002；森田康彰ら：四国植物防疫 38:15, 2003

[備考] 菌糸融合群 AG-4 培養型 IIIA

小菌核葉枯病 sho-kinkaku-hagare-byo Leaf blight

Botrytis tulipae Lind

塚本俊秀・守川俊幸：鳥取病虫研報 31:1, 2006

オニソガラム

p.334

条斑モザイク病 johan-mosaic-byo Ornithogalum stripe mosaic

Ornithogalum stripe mosaic virus

松本 勤ら：日植病報 69(3):320, 2003；Matsumoto, T. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 73(3): 222, 2007

[備考] オニソガラム *O. thyrsoides* に発生

モザイク病 *mosaic-byo* *Ornithogalum mosaic*

Ornithogalum mosaic virus

松本 勤ら : 日植病報 73(2):102, 2007

ナルコユリ

p.334

炭疽病 *tanso-byo* Anthracnose

Colletotrichum dematum (Persoon: Fries) Grove

佐藤豊三ら : 日植病報 70(3):217, 2004 ; Tomioka, K. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 74(5): 402, 2008

キチジョウソウ

p.334***

Reineckea carnea (Andr.) Kunth.

炭疽病 *tanso-byo* Anthracnose

Colletotrichum dematum (Persoon: Fries) Grove

竹内 純ら : 関東病虫研報 55:93, 2008

サンダーソニア

p.335

疫病 *eki-byo* Phytophthora rot

Phytophthora nicotianae van Breda de Haan

竹内 純・堀江博道 : 日植病報 67(2):166, 2001

根腐病 *negusare-byo* Pythium root rot

(1) *Pythium irregularare* Buisman

(2) *Pythium splendens* Braun

竹内 純ら : 関東病虫研報 48:65, 2001

立枯病 *tachigare-byo* Rhizoctonia rot

Rhizoctonia solani Kühn

星 秀男・堀江博道 : 関東病虫研報 51:97, 2004

[備考]菌糸融合群 AG-4, 培養型 IIIA

(注) 菌糸融合群の追加

ホトトギス類

p.335

葉枯病 *hagare-byo* Botrytis blight

Botrytis elliptica (Berkeley) Cooke

Furukawa, T. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 71:95, 2005

[備考] 葉片への接種試験。台湾ホトトギス(*T. formosana* Bak., Taiwanese toad lily)に発生

さび病 sabi-byo Tricyrtis rust

(1) *Puccinia caricis-conicae* Homma

石宮かおり・小野義隆：日植病報 65(3):411, 1999

[備考] 接種によりヤマホトトギス、ヤマジノホトトギス、キバナホトトギスに感染

(2) *Puccinia speciosa* Ono & Ishimiya

Ono, Y. & Ishimiya, K.: Mycologia 93(4):791, 2001

[備考] ホトトギス(*T. hirta* (Thunb.) Hook)、ヤマホトトギス(*T. macropoda* Miq.)、ヤマジリホトトギス(*T. affinis* Makino)、キバナホトトギス(*T. flava* Maxim.)に発生

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

Colletotrichum acutatum Simmonds ex Simmonds

高野喜八郎：北陸病虫研報 54:83, 2005

葉枯線虫病 hagare-senchu-byo Leaf nematode disease

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie

牛山欽司：関東病虫研報 46:133, 1999

チューリップ

p.335

えそ病 eso-byo Necrosis

Olive latent virus 1

Kanematsu, S. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 67(4):333, 2001

条斑病 johan-byo Streak

未定

山本孝し：日植病報 55(1):101, 1989；守川俊幸・多賀由美子：日植病報 68(2):239, 2002；

守川俊幸ら：日植病報 70(1):77, 2004

[備考] 病原として条斑ウイルス *Tulip streak virus* (TuSV)を提案。病原は*Olpidium brassicae*の非アブラナ科系によって伝搬される

皮腐病 kawa-gusare-byo Bulb-coat rot

Rhizoctonia solani Kühn

多賀由美子ら：日植病報 69(1):60, 2003

[備考] 菌糸融合群 AG-2-2, 培養型 IIIB

ハイアオイ

p.337***

Malva neglecta Wallr. (*M. rotundifolia* L.)

さび病 sabi-byo Rust

Puccinia malvacearum Montagne

Harada, Y.: Trans. Mycol. Soc. Japan 25:289, 1984 ; Hiratsuka, N. et al.: The Rust Flora of Japan p.798, 1992 ; Harada, Y.: Mycoscience 35:295, 1994

- カラテア **Calathea** p.337***
Calathea spp.
 円斑病 maruhan-byo Bipolaris leaf spot
Bipolaris sp.
 竹内 純ら：関東病虫研報 48:75, 2001
 [備考] *Calathea louise* Gabnep.および*C. zebrina* (Sims) Lindl. に発生。本植物種は野草の項(p.185)にも記載がある。
- クテナンテ **Ctenanthe** p.337***
Ctenanthe spp.
 円斑病 maruhan-byo Bipolaris leaf spot
Bipolaris sp.
 竹内 純ら：関東病虫研報 48:75, 2001
 [備考] *Ctenanthe oppenheimiana* (E. Morr.) K. Schum.に発生
- マランタ **Maranta** p.337
 円斑病 maruhan-byo Bipolaris leaf spot
Bipolaris sp.
 竹内 純ら：関東病虫研報 48:75, 2001
 [備考] *Marantha leuconeura* var. *erythroneura* Bunt., *M. leuconeura* var. *kerchoviana* E. Morr.および*M. leuconeura* var. *massangeana* E. Morr.に発生
- タチアオイ (ホリホック) p.337
斑点性の病害
Phoma sp.
 古川聰子・岸 國平：日植病報 66(3):273, 2000
 [備考] 病徵が異なるので複数の病原菌が関与している可能性がある。病名は未定
 うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew
Erysiphe orntii Castagne
 丹田誠之助・須賀里絵：東農大農学集報 47(3):141, 2002
 [備考] タチアオイ *A. rosea* L.に発生
- コウホネ p.337***
Nuphar japonicum Augustin Pyramus de Candolle Cow-Lily
 褐斑病 kappan-byo Brown spot
Pseudocercospora nymphaeacea (Cooke & Ellis) Deighton
 山本和太郎・前田己之助：兵庫農科大研報 4(2):66, 1960 ; Deighton, F. C.: Trans. Br. mycol. Soc. 88(3):365, 1987 ; 中島千晴ら：日植病報 65(3):410, 1999

[備考] 褐斑病の病名は中島ら(1999)の報告前に山本・前田(1960)が *Cercospora nymphaeacea* の日本初発生記録とともに新称として提案されている

ツキミソウ p.338

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

(2) *Oidium* sp.

丹田誠之助ら : 東農大農学集報 44(3):115, 1999

[備考] ヒルザキツキミソウ *O. speciosa* Nutt. に発生

(注) 病原および宿主追加。これにより *Erysiphe polygoni* は(1)となる

シラン p. 338

褐斑病 kappan-byo Phyllosticta leaf spot

Phyllosticta capitalensis P. Hennings

高野喜八郎 : 日植病報大会 243 2004

エビネ p.338

根黒斑病 ne-kokuhan-byo Cylindrocarpon root rot

Cylindrocarpon destructans (Zinssmeister) Scholten

竹内 純ら : 日植病報 70(1):46, 2004

[備考] ニオイエビネ *Calanthe izu-insularis* (Satomi) Ohwi & Satomi に発生

ビルステケラ p.339

黒斑細菌病 kokuhan-saikin-byo Bacterial black spot

Burkholderia andropogonis (Smith 1911) Gillis, Van Van, Bardin, Goor, Hebbal, Willems, Segers, Kersters, Heulin & Fernandez 1995

Takahashi, Y. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 70(5):284, 2004

オドンティオダ p.340

黒斑細菌病 kokuhan-saikin-byo Bacterial black spot

Burkholderia andropogonis (Smith 1911) Gillis, Van Van, Bardin, Goor, Hebbal, Willems, Segers, Kersters, Heulin & Fernandez 1995

Takahashi, Y. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 70(5):284, 2004

黒点病 kokuten-byo Black leaf spot

Fusarium guttiforme Nirenberg & O'Donnell

高橋幸吉ら : 日植病報 69(3):260, 2003 ; 青木孝之ら : 日植病報 69(3):260, 2003

カンラン、キンリョウヘン、シュンラン、シンビジウム、スルガラン p.340

疫病 eki-byo Phytophthora rot

Phytophthora multivesiculata Ilieva, Man in 't Veld, W. Veenb.-Rijks & R. Pieters

植松清治ら：日植病報 71(3):212, 2005

[備考] シンビジウムに発生

(注) これにより *Phytophthora* sp.は削除する

乾腐病 kampu-byo Dry rot

Fusarium solani (Martius) Saccardo

市川和則・齋藤英毅：関東病虫研報 45:119, 1998

芽腐病 megusare-byo Bud rot

Aplosporella sp.

佐藤豊三ら：日植病報 64(6):630, 1998

[備考] カンランに発生

裏すすかび病 ura-susukabi-byo Sooty spot

Pseudocercospora cymbidiicola Braun & Hill

中島千晴ら：日植病報 63(3):200, 1997；中島千晴ら：関西病虫研報 48:61, 2006

[備考] シンビジウムに発生

(注) 日本植物病名目録(2000)p341の裏すすかび病に係わる病原学名。文献の記載は誤記のため削除する（正誤表 4 参照）

デンドロビウム

p.341

すす葉枯病 susuhagare-byo Sooty leaf blight

Pseudocercospora sp.

佐藤豊三ら：四国植防 36:29, 2001

(注) 文献追加

ディネマ

p.341***

***Dinema* spp.**

疫病 eki-byo *Phytophthora* rot

Phytophthora palmivora (Butler) Butler

鈴木幹彦ら：関東病虫研報 55:89, 2008

[備考] *Dinema polybulbon*に発生。

オドントシジュム

p.342***

***Odontocidium* (*Odontoglossum* × *Oncidium*) spp.**

黒斑細菌病 kokuhan-saikin-byo Bacterial black spot

Burkholderia andropogonis (Smith 1911) Gillis, Van Van, Bardin, Goor, Hebbal, Willems, Segers, Kersters, Heulin & Fernandez 1995

Takahashi, Y. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 70(5):284, 2004

- オドントグロッサム p.342
黒斑細菌病 kokuhan-saikin-byo Bacterial black spot
Burkholderia andropogonis (Smith 1911) Gillis, Van Van, Bardin, Goor, Hebbar, Willems, Segers, Kersters, Heulin & Fernandez 1995
Takahashi, Y. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 70(5):284, 2004
- 黒点病** kokuten-byo Black leaf spot
Fusarium guttiforme Nirenberg & O'Donnell
高橋幸吉ら : 日植病報 69(3):260, 2003 ; 青木孝之ら : 日植病報 69(3):260, 2003
- オンシジウム p.342
白絹病 shirakinu-byo Southern blight
Sclerotium rolfsii Saccardo
富岡啓介・佐藤豊三 : 日植病報 70(1):45, 2004 ; 大高伸明ら : 四国植防 43:7, 2008
[備考] オンシジウム *O. sphacelatum* Lindleyに発生
- ファレノプシス p.343
乾腐病 kampu-byo Sheath rot
Nectria ochroleuca (Schweinitz) Berkeley
佐藤豊三ら : 日植病報 62(3):267, 1996
- ハナビシソウ p.344
葉枯病 hagare-byo Leaf mold
Acroconidiella eschscholziae (Harkness) M. B. Ellis
忠 英一ら : 日植病報 75(3):233, 2009
- アルメリア (ハマカンザシ、マツバカンザシ) p.346
炭疽病 tanso-byo Anthracnose
Colletotrichum truncatum (Schweinitz) Andrus & Moore
菅原 敬ら : 日植病報 71(1):50, 2005
- スターチス p.346
ウイルス病 virus-byo Viral disease
(4) *Grapevine Algerian latent virus*
Fujinaga, M. et al.; J. Gen. Plant Pathol. 75(2):157, 2009
[備考] *L. sinuatum*に発生
(注) これにより(4)*Turnip mosaic virus* は(5)となる
- てんぐ巣病** tengusu-byo Witches' broom
Phytoplasma ファイトプラズマ

塩見敏樹ら：日植病報 65(1):87, 1999

(注) 文献追加

フロックス、オイランソウ p.347

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

(1) *Erysiphe magnicellulata* Braun var. *magnicellulata* [*Erysiphe cichoracearum* de Candolle]

丹田誠之助：東農大農学集報 41(4):202, 1997

(注) 病原学名の変更。これにより日本植物病名目録p.347本病備考欄の「病原菌の分類学的所属については検討が必要」は削除する

セイヨウハナシノブ p.348***

Polemonium caeruleum L.

葉腐病 hagusare-byo Leaf rot

Rhizoctonia solani Kühn

漆原寿彦ら：日植病報 68(2):187, 2002

[備考] 菌糸融合群 AG-1. 培養型 IB

マツバボタン p.348

青枯病 aogare-byo Bacterial wilt

Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuchi, Kosako, Yano, Hotta & Nishiuchi 1996

尾崎克己・渡部 洋：九病虫研会報 50:98, 2004

ポーチュラカ (ハナスベリヒュ) p.348

退緑斑点病 tairyoku-hanten-byo Chlorotic spot

Broad bean wilt virus

河野敏郎ら：関東病虫研報 45:101, 1998

シクラメン p.348

えそ斑紋病 eso-hammon-byo Necrotic spot

Impatiens necrotic spot virus

後藤知昭ら：日植病報 67(2):173, 2001；後藤知昭ら：関東病虫研報 48:97, 2001

[備考] 戻し接種なし

プリムラ類 (サクラソウ) p.349

モザイク病 mosaic-byo Mosaic

(2) *Plantago asiatica* mosaic viurs

高橋修一郎ら：日植病報 69(3):330, 2003

腐敗病 fuhai-byo

(2) *Pseudomonas viridiflava* (Burkholder 1930) Dowson 1939

古谷明彦ら：日植病報 71(1):38, 2005

[備考] プリムラ(*Primula x polyantha*)に発生

(注) 病原追加。これにより *P. marginalis* pv. *marginalis* は(1)となる

葉枯病 hagare-byo Leaf blight

Pseudocercospora smithii (Petrak) U. Braun

畠山 聰・原田幸雄：日植病報 71(1):50, 2005

[備考] クリンソウ(*Primula japonica*)に発生

トリカブト p.350

Aconitum spp.

日本有用植物病名目録 p.350の植物名「ハナトリカブト（トリカブト） *Aconitum chinense* Sieb.」を「トリカブト *Aconitum* spp.に変更する」

モザイク病 mosaic-byo Mosaic

Cucumber mosaic virus

Fukumoto, F. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 74(1): 88, 2008

[備考] ハナトリカブト *A. chinense* Sieb.に発生

株枯病 kabugare-byo Seedling blight

Plectosporium tabacinum (van Beyma) Palm, Gams & Nirenberg

富岡啓介ら：日植病報 74(3):181, 2008

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

Erysiphe aquilegia DC. var. *ranunculi* (Greville) Zheng & Chen

佐藤幸生・米澤雅人：日植病報 72(4):207, 2006

[備考] ハナトリカブトの学名を *Aconitum carmichaeli* Debeaux に変更

栽培薬用植物 *A. carmichaeli* に発生

ミスマソウ類 p.351***

Hepatica spp.

根腐菌核病 negusare-kinkaku-byo Sclerotial root rot

Dumontinia tuberosa (Bulliard) L. M. Kohn

埋橋志穂美ら：日植病報 76(1):42, 2010

[備考] オオミスマソウ *H. nobilis* var. *japonica* f. *magna*に発生

シユウメイギク p.352

葉枯線虫病 hagare-sench□-byo Leaf nematode disease

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie

牛山欽司：関東病虫研報 46:133, 1999

オダマキ p.352

灰色かび病 hairokabi-byo Gray mold

Botrytis cinerea Persoon:Fries

Zhang, M. et al.: Plant Disease 93(4):425, 2009

(注) 文献追加。[備考] 接種試験は未確認、を削除

くもの巣病 kumonosu-byo Web blight

Rhizoctonia solani Kühn

今泉英理夏ら : 日植病報 65(3):408, 1999 ; Imaizumi, E. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 66(3): 210, 2000

[備考] 菌糸融合群 AG-1-1B. オダマキに発生

チドリソウ (コンソリダ) Rocket Larkspur p.353***

Consolida spp.

てんぐ巣病 tengusu-byo Witches'-broom

'*Candidatus Phytoplasma asteris*'

田中 譲ら : 日植病報 68(2):257, 2002 ; Tanaka M. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 73(4):286, 2007

[備考] ラークスパー *Consolida ambigua*に発生

べと病 beto-byo Downy mildew

Peronospora sp.

谷名光治ら : 日植病報 66(2):94, 2000

[備考] ラークスパー(*Consolida* sp.)に発生

半身萎凋病 hanshin-icho-byo Verticillium wilt (未申請)

Verticillium tricorpus Isaac

築尾嘉章ら : 日植病報 67(2):165, 2001

[備考] 築尾ら(日植病報64:630, 1998)は黄化病の病原を*V. dahliae*と報告したが、

*V. tricorpus*と再同定し、病名を変更する。ラークスパー(*Consolida* sp.)に発生

斑点病 hanten-byo Leaf spot

Phoma sp.

築尾嘉章ら : 日植病報 75(1):52, 2009

[備考] ラークスパー *C. ambigua*に発生。ITS配列から*Didymella bryoniae*と近縁とした

褐色斑点病 kasshoku-hanten-byo Leaf spot

Ascochyta aquilegiae (Rounmequre & Patouillard) Saccardo

佐藤豊三ら : 四国植防 34:63, 1999

デルフィニウム

p.353

半身萎凋病 hanshin-icho-byo Verticillium wilt

Verticillium tricorpus Isaac

築尾嘉章ら：日植病報 66(3):303, 2000

苗立枯病 nae-tachigare-byo Damping-off

Pythium aphanidermatum (Edson) Fitzpatrick

泥谷公子ら：日植病報 68(2):186, 2002

根腐萎凋病 negusare-icho-byo Myrothecium root rot

Myrothecium roridum Tode: Fries

西川盾士：日植病報 70(3):216, 2004

クリスマスローズ類

p.354***

Helleborus spp.

黒斑細菌病 kokuhan-saikin-byo Bacterial black leaf spot

Pseudomonas viridiflava (Burkholder 1930) Dowson 1939

佐山 玲ら：北日本病虫研報 53:312, 2002

[備考] クリスマスローズ (*H. orientalis* Lam.) に発生

べと病 beto-byo Downy mildew

Peronospora pulveracea Fuckel

菅原 敬ら：日植病報 74(3):181, 2008

灰色かび病 haiiro-kabi-byo Gray mold

Botrytis cinerea Persoon: Fries

菅原 敬ら：北日本病虫研報 53:152, 2002

根黒斑病 ne-kokuhan-byo Cylindrocarpon root rot

Cylindrocarpon destructans (Zinssmeister) Scholten

竹内 純ら：日植病報 70(1):46, 2004

[備考] ヘレボルス (コダチクリスマスローズ) *H. foetidus* L.に発生

白絹病 shirakinu-byo Southern blight

Sclerotium rolfsii Saccardo

栄森弘己・竹内 純：関東病虫研報 51:109, 2004

[備考] ヘレボルス・オリエンタリス(*H. orientalis* L.)に発生

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

Colletotrichum sp.

菅原 敬ら ; 日植病報 74(3):181, 2008 ; Sugawara, K. et al.; J. Gen. Plant Pathol. 75(2): 163, 2009

[備考] クリスマスローズ *H. niger*に発生。ITS配列から*C. dematum*または*C. truncatum*と近縁とした

葉枯線虫病 hagare-senchu-byo Leaf nematode disease

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie

牛山欽司 : 関東病虫研報 46:133, 1999

オキナグサ類 Pasque flower p.355***

Pulsatilla spp.

斑点病 hanten-byo Leaf spot

Phoma sp.

築尾嘉章ら : 日植病報 75(1):52, 2009

[備考] セイヨウオキナグサ *P. vulgaris*に発生。ITS配列から*Didymella applanata*と近縁とした

ラナンキュラス p.355

灰色かび病 haiiro-kabi-byo Gray mold

Botrytis cinerea Persoon: Fries

Tomioka, K. et al.: Ann. Phytopath. Soc. Jpn. 65(6):620, 1999

(注) 文献追加。これにより備考「接種試験は未確認」は削除

株枯病 kabugare-byo Plectosporium blight

Plectosporium tabacinum (J. F. H. Beyma) M. E. Palm, W. Gams & Nirenberg

佐藤豊三ら : 日植病報 68(1):64, 2002 ; Sato, T. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 71(2):2005

菌核病 kinkaku-byo Sclerotinia rot

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary

漆原寿彦ら : 日植病報 65(3):409, 1999 ; 漆原寿彦ら : 関東病虫研報 46:61, 1999

ワレモコウ p.355

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

Colletotrichum acutatum Simmonds ex Simmonds

杉山 悟ら : 北日本病虫研報 59:86, 2008

ダイコンソウ類 p.355***

Geum spp.

ダイコンソウ *G. japonicum* Thunb.

ベニバナダイコンソウ *G. coccineum* Sibth. & Sm

さび病 sabi-byo Rust

Uredo sp.

柿鳶 眞ら：日植病報 65(3):410, 1999

[備考] ベニバナダイコンソウに発生。*Pucciniastrum* sp.と推定される

プーバルジア

p.356

モザイク病 *mosaic-byo* Mosaic

Cucumber mosaic virus

栄森弘己：東京農試研報 26:51, 1995

(注) 文献追加

暗斑病 *anhant-byo* Myrothecium leaf spot

Myrothecium roridum Tode: Fries

竹内 純ら：日植病報 75(3):205, 2009；竹内 純ら：関東病虫研報 56:67, 2009

菌核病 *kinkaku-byo* Sclerotinia rot

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary

堀江博道・星 秀男：関東病虫研報 49:69, 2002

根腐病 *negusare-byo* Pythium rot

(1) *Pythium myriotylum* Drechsler

(2) *Pythium splendens* Braun

竹内 純ら：日植病報 75(1):51, 2009

葉枯線虫病 *hagare-senchu-byo* Leaf blight nematode disease

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie

竹内 純ら：関東病虫研報 46:141, 1999

ツボサンゴ

p.356***

Heuchera sanguinea Engelm. Coral bell

株枯病 *kabugare-byo* Cylindrocladium blight

Cylindrocladium canadense J. C. Kang, Crous & C. L. Shoch

竹内 純ら：日植病報 73(3):179, 2007；Hirooka, Y. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 75(1):83,

2009

サラセニア

p.356***

Sarracenia spp.

褐斑病 *kappan-byo* Cylindrocladium brown leaf spot

Cylindrocladium theae (Petch) Subramanian

竹内 純ら：日植病報 71(1):32, 2005

ペンタス

p.356

灰色かび病 hairo-kabi-byo Gray mold

Botrytis cinerea Persoon: Fries

庄司俊彦ら：関西病虫研報 41:85, 1999

アスチルベ

p.356

立枯病 tachigare-byo Stem and root rot

Rhizoctonia solani Kühn

竹内 純・堀江博道：関東病虫研報 46:57, 1999

[備考] 菌糸融合群 AG-4. 培養型 IIIA

アンゲロニア

p.356***

Angelonia spp.

白絹病 shirakinu-byo Southern blight

Sclerotium rolfsii Saccardo

植松清次ら：関東病虫研報 56:137, 2009

キンギョソウ

p.356

斑点病 hanten-byo Corynespora leaf spot

Corynespora cassiicola (Berkeley & Curtis) Wei

松崎聖史・深谷雅博：日植病報 73(3):179, 2007

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

(1) *Colletotrichum destructivum* O'Gara

富岡啓介ら：日植病報 72(1):51, 2006

(注) 病原追加。これにより *C. gloeosporioides* は(2)となる

さび病 sabi-byo Rust

Puccinia antirrhini Dietel & Holway

福田達男・柿島 眞：日植病報 65(3):411, 1999；杉山 悟・佐藤詩織：日植病報

72(1):60, 2006

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

Oidium sp. (subgenus *Reticuloidium*)

伊藤陽子ら：日植病報 72(1):50, 2006

アッサムニオイザクラ (ルクリア)

p.356***

***Luculia gratissima* Sweet**

疫病 eki-byo Phytophthora rot

Phytophthora sp.

久保田まや：関東病虫研報 47:101, 2000

根腐病 negusare-byo Root rot

Pythium sp.

市川和規ら：日植病報 65(3):413, 1999

リナリア

p.358***

***Linaria macroccana* Hook f.**

苗立枯病 nae-tachigare-byo Damping-off

Pythium irregularare Buisman

鈴木幹彦・影山幸二：関西病虫研報 51:57, 2009

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

Oidium sp.

伊藤陽子ら：日植病報 69(3):258, 2003

[備考] *Reticuloidium*亜属に属すると思われる

ネメシア（ウンランモドキ）***Nemesia***

p.358***

***Nemesia strumosa* Bentham**

立枯病 tachigare-byo Damping-off

Pythium myriotylum Drechsler

梶谷裕二・景山幸二：日植病報 74(1):27, 2008

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

Colletotrichum destructivum O'Gara

富岡啓介ら：日植病報 65(6):678, 1999 ; Tomioka, K. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 67(2): 111, 2001 ; Moriwaki, J. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 68:307, 2002 ; 富岡啓介：近中四農研センター研報 5:91, 2005

[備考] 富岡啓介ら(1999)は本病原を*C. fuscum* Laubertとしたが、Moriwaki et al.(2002)はこれを*C. destructivum*と再同定した

ペヌステモン

p.358

疫病 eki-byo Phytophthora rot

Phytophthora sp.

久保田まや：関東病虫研報 47:101, 2000

ゴシキトウガラシ **Cherry pepper**

p.358***

***Capsicum annuum* L. var. *ceraciforme* Bailey**

野菜のトウガラシ、ピーマンも参照

疫病 eki-byo Phytophthora blight

Phytophthora capsici Leonian

佐藤豊三・富岡啓介：四国植防 34:57, 1999；富岡啓介：近中四農研センター研報 5:91, 2005

[備考] チェリーペッパーに発生

チヨウセンアサガオ

p.358

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

(1) *Erysiphe orontii* Castagne

Tanda, S. & Hirose, T.: Jour. Agri. Sci., Tokyo Univ. Agric. 57(4):274, 2003

(注) これにより *Oidium* sp.は(2)となる

ペチュニア

p.358

帯化病 taika-byo Bacterial fasciation

Rhodococcus fascians (Tilford 1936) Goodfellow 1984

清水慶明ら：日植病報 74(3):252, 2008

灰色かび病 haiiro-kabi-byo Gray mold

Botrytis cinerea Persoon: Fries

菅原 敬ら：関西病虫研報 42:49, 2000

(注) 文献追加。日本植物病名目録p.359の本病備考欄は削除する

褐斑病 kappan-byo Alternaria blight

Alternaria longissima Deighton & MacGarvie

高野喜八郎：日植病報 71(1):73, 2005

こうがいかび病 kogai-kabi-byo Choanephora blight

Choanephora cucurbitarum (Berkeley & Ravenel) Thaxter

竹内 純・堀江博道：日植病報 66(2):72, 2000

(注) 文献追加

立枯病 tachigare-byo Damping-off

Pythium myriotylum Drechsler

岡田清嗣ら：日植病報 74(3):177, 2008

ベロニカ

p.358***

ベロニカ・ロンギフォリア (セイヨウトラノオ) Beech speedwell

Veronica longifolia L.

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew
Erysiphe orontii Castagne
丹田誠之助ら：東農大農学集報 44(3):115, 1999

灰色かび病 haiiro-kabi-byo Gray mold
Botrytis cinerea Persoon: Fries
漆原寿彦ら：関東病虫研報 48:93, 2001

ミムラス類（ミヅホウズキ） Monkey flower p.358***
Mimulus nepalensis Benth. var. *japonicus* Miq. ex Maxim.
灰色かび病 haiiro-kabi-byo Gray mold
Botrytis cinerea Persoon: Fries
漆原寿彦ら：関東病虫研報 46:63, 1999

オタカンサス（ブルーキャツツアイ） *Otacanthus* p.358***
Otacanthus caeruleus Lindl.
立枯病 tachigare-byo Stem and root rot
Rhizoctonia solani Kühn
竹内 純・堀江博道：関東病虫研報 46:53, 1999
[備考] 菌糸融合群 AG-4. 培養型 IIIA

ステラ（バコバ） p.358***
Sutera spp. *Sutera, Bacopa*
茎腐病 kukigusare-byo Stem and root rot
Rhizoctonia solani Kühn
鈴木幹彦ら：日植病報 74(1):34, 2008
[備考] *S. diffusus*に発生

炭疽病 tanso-byo Anthracnose
Colletotrichum destructivum O'Gara
佐藤豊三ら：日植病報 74(1):33, 2008
[備考] *S. cordata* (Thunb.) Kuntzeに発生

プロワリア p.358***
Browallia speciosa Hook. *Browallia*
灰色かび病 haiiro-kabi-byo Gray mold
Botrytis cinerea Persoon: Fries
菅原 敬ら：日植病報 73(3):177, 2007

ベンステモン p.358

葉腐病 hagusare-byo Leaf blight

Rhizoctonia solani Kühn

竹内 純ら：関東病虫研報 45:131, 1998

[備考] 菌糸融合群 AG-1. 培養型 IB

スコパリア Scoparia p.358***

***Scoparia* spp.**

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

Oidium sp.

星 秀男ら：日植病報 75(1):51, 2009

[備考] *Reticuloidium* 亜属

トレニア p.358

白絹病 shirakinu-byo Southern blight

Sclerotium rolfsii Saccardo

植松清次ら：関東病虫研報 56:137, 2009

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

(1) *Oidium* sp.

高松 進ら：日菌報 19:71, 1978；星 秀男ら：日植病報 74(1):33, 2008

[備考] 分生子の発芽管は*Erysiphe polygoni*型。星ら(2008)は*Reticuloidium*亜属とした

(注) 文献追加

ニーレンベルキア p.359***

Nierenbergia* x *hybrida

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

Oidium sp.

伊藤陽子ら：日植病報 68(1):78, 2002

[備考] 発芽管の形態は*Erysiphe polygoni*型

ホオズキ p.359

白斑病 hakuhan-byo White spot

Phoma sp.

外側正之ら：日植病報 64(6):600, 1998

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

(1) *Colletotrichum destructivum* O'Gara

森脇丈治ら：日植病報 69(3):259, 2003

[備考] これにより、ホオズキ由来の*C. coccodes*は*C. destructivum*に統合される

(2) *Glomerella cingulata* (Stonemam) Spaulding & Schrenk

外側正之ら：日植病報 64(6):600, 1998

ピンビネラ **Burnet saxifragae** p.360***

Pimpinella saxifraga L.

茎腐病 kukigusare-byo Stem rot

Rhizoctonia solani Kühn

漆原寿彦ら：日植病報 68(2):187, 2002

[備考] 菌糸融合群 Ag-2-2. 培養型 IIIB

ツノナス p.360

モザイク病 mosaic-byo Mosaic

(3) *Grapevine Algerian latent virus*

Ohki, T. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 72(2):119, 2006

(注) 文献追加

(4) *Tomato bushy stunt virus*

Ohki, T. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 71(1):74, 2005

(注) 文献追加

かいよう病 kaiyo-byo

Clavibacter michiganensis subsp. *michiganensis* (Smith 1910) Davis, Gillaspie, Vidaver & Harris 1984

山本圭祐ら：日植病報 73(1):71, 2007

半身萎凋病 hanshin-icho-byo Verticillium wilt

Verticillium dahliae Klebahn

海老原克介ら：日植病報 66(2):95, 2000

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

Oidium sp.

丹田誠之助：東農大農学集報 42(3):173, 1997

ストレリチア p.360

葉枯病 hagare-byo Leaf spot

Cylindrocladium pteridis Wolf

久保田まや：関東病虫研報 48:89, 2001

キンレンカ（ナスターイウム、ノウゼンハレン） p.360

斑点病 hanten-byo Leaf spot

Acroconidiella tropaeoli (Bond) Lindquist & Alippi

忠 英一ら：日植病報 74(3):184, 2008

ホワイトレスフラワー (ドクゼリモドキ) p.360

モザイク病 *mosaic-byo* Mosaic

Japanese honewort mosaic virus

金 沢宣ら : 日植病報 70(1):32, 2004

潜在感染 *senzai-kansen* Latent infection

Ammi majus latent virus

金 沢宣ら : 日植病報 70(3):263, 2004

[備考] 病徵は示さない

灰色かび病 *haiiro-kabi-byo* Gray mold

Botrytis cinerea Persoon: Fries

菅野博英・本藏良三 : 北日本病虫研報 49:91, 1998

萎凋病 *icho-byo* Fusarium wilt

Gibberella zaeae (Schweinitz) Petch (anamorph: *Fusarium graminearum* Schwabe)

廣岡祐吏ら : 日植病報 73(3):178, 2007

菌核病 *kinkaku-byo* Sclerotinia rot

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary

菅野博英・大久保博人 : 日植病報 64(6):611, 1998 ; 菅野博英・大久保博人 : 北日本病虫研報 50:115, 1999

ブルーレウム p.361***

Bupleurum spp.

モザイク病 *mosaic-byo* Mosaic

Clover yellow vein virus

山本英樹 : 日植病報 69(4):420, 2003

[備考] *B.griffithii* (Tourn.) L.に発生

菌核病 *kinkaku-byo* Sclerotinia rot

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary

外側正之 : 関西病虫研報 42:77, 2000

[備考] *B. rotundifolium* L.に発生

ブルーレースフラワー (ソライローレンス) **Blue lace flower** p.361***

Trachymene coerulea R. C. Grath.

灰色かび病 *haiiro-kabi-byo* Gray mold

Botrytis cinerea Persoon: Fries

菅野博英・本藏良三：北日本病虫研報 49:91, 1998

菌核病 kinkaku-byo Sclerotinia rot

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary

菅野博英・大久保博人：日植病報 64(6):611, 1998；菅野博英・大久保博人：北日本病虫研報 50:115, 1999；芹澤英恵ら：日植病報 66(2):93, 2000

(注) 文献追加

オトコエシ

p.361***

Patrinia villosa Juss.

白絹病 shirakinu-byo Southern blight

Sclerotium rolfsii Saccardo

星 秀男ら：関東病虫研報 50:109, 2003

オミナエシ

p.361

苗立枯病 nae-tachigare-byo Damping-off

Rhizoctonia solani Kühn

窪田昌春ら：日植病報 75(2):116, 2009；窪田昌春ら：関西病虫研報 51:123, 2009

[備考] 菌糸融合群 AG-1, 培養型 IB

白絹病 shirakinu-byo Southern blight

Sclerotium rolfsii Saccardo

星 秀男ら：関東病虫研報 50:109, 2003

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

Colletotrichum destructivum O'Gara

富岡啓介ら：日植病報 66(2):91, 2000；Moriwaki, J. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 68:307, 2002；富岡啓介：近中四農研センター研報 5:91, 2005

[備考] 富岡啓介ら(2000)は本病原を *C. coccodes* (Wallroth) S. Hughes としたが、Moriwaki et al.(2002)はこれを *C. destructivum* と再同定した

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

Oidium sp.

星 秀男ら：日植病報 74(1):33, 2008

[備考] *Reticuloidium* 亜属

ランタナ類

p.361

褐斑病 kappan-byo Brown leaf spot

Pseudocercospora guianensis (E. Stevens & Solheim) Deighton

Nishikawa, J. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 67(4):281, 2001

[備考] ランタナ *L. camara* L, コバノランタナ *L. montevidensis* (Spreng.) Briq.に発生
(注) 文献追加。病原学名、宿主学名（備考欄）訂正

バーベナ p.361

黄化えそ病 oka-eso-byo Spotted wilt

Tomato spotted wilt virus

河野敏郎ら：日植病報 65(6):651, 1999

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

Colletotrichum acutatum Simmonds ex Simmonds

菅原 敬・築尾嘉章：北日本病虫研報 55:78, 2004

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

(1) *Oidium* sp.

丹田誠之助ら：東農大農学集報 44(3):115, 1999

[備考] ヒメビジヨザクラ *V. tenera* K. Spreng, シュツコンバーベナ *V. rigida* K. Sprengに発生

(注) 病原および宿主追加。これにより *Sphaerotheca fusca* は(2)となる

スミレ類 p.361

葉枯病 hagare-byo Leaf spot

(1) *Stemphylium lycopersici* (Enjoji) Yamamoto

(2) *Stemphylium vesicarium* (Wallroth) E. Simmons

高野喜八郎：北陸病虫研報 47:55, 1999

[備考] パンジー、ビオラに発生

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

(1) *Oidium violae* Passerini

丹田誠之助・須賀里絵：東農大農学集報 47(3):141, 2002

[備考] パンジーに発生

(2) *Oidium* sp.

伊藤陽子ら：日植病報 69(3):258, 2003

[備考] *Fibroidium*亜属と思われる。パンジー(*Viola x wittrockiana*)に発生

クルクマ p.363

茎腐病 kukigusare-byo Stem rot

binucleate *Rhizoctonia*

鈴木幹彦ら：日植病報 75(1):72, 2009

[備考] 菌糸融合群 AG-G。この他ITS配列はAG-Fと類似する2核*Rhizoctonia*が分離されている

さび斑病 sabihan-byo Bract and leaf spot

Plectosporium tabacinum (van Beyma) M. E. Palm, W. Gams & Nirenberg

竹内 純ら : 日植病報60:747, 1994 ; 佐藤豊三 : 植物防疫62:491, 2008

[備考] 竹内ら(1994)は本病菌を*Acremonium*属としたが、佐藤(2008)はこれを*P. tabacinum*と再同定した

立枯病 tachigare-byo Root rot

Pythium myriotylum Drechsler

鈴木幹彦ら : 日植病報 74(3):178, 2008

[備考] クルクマ *C. alismatifolia* (cv. シャローム、ホワイト) に発生

2. 付録

セキドウサクラソウ

p.363***

Asystasia gengetica (L.) Anderson

Pseudocercospora asystasiae (Yen) Yen

Nakashima, C.: Mycosceince 45:116, 2004

[備考] 接種試験なし

キツネノマゴ類

p.363***

Justicia spp.

† † † さび病 sabi-byo Rust

Puccinia thwaitesii Berkekey

Motokura, Y. et al.: Res. Bull. Pl. Prot. Japan 41:59, 2005

[備考] ウオーターイロー (Water willow, *J. gendarussa* Burman)に発生

クロサンドラ

p.363***

Crossandra infundibuliformis (L.) Nees

Flower rot

Fusarium pallidoroseum (Cooke) Saccardo

Lokesh, S. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 74(4):338, 2008

[備考] インド

ネオレゲリア Neoregelia

p.364***

Neoregelia spp.

† † † 葉枯病 hagare-byo Leaf blight

Exserohilum sp.

迫田琢也ら : 日植病報 75(1):52, 2009

カッコウアザミ (アグラタム)

p.365

Ageratum yellow vein virus
大貫正俊ら : 日植病報 74(1):32, 2008

Pepper yellow leaf curl Indonesia virus
佐方淳資ら : 日植病報 73(3):222, 2007
[備考] インドネシア

キク p.365***

ウイロイド viroid Viroid

Chrysanthemum chlorotic mottle viroid
山本英樹・佐野輝男 : 日植病報 70(3),303, 2004
[備考] 戻し接種なし

Chrysanthemum stem necrosis virus
奥田 充ら : 日植病報 73(3):223, 2007
[備考] 茎と葉のえそ症状

Impatiens necrotic spot virus
近藤 亨ら : 日植病報 76(1):49, 2010
[備考] 病名未提案。接種試験なし

苗腐敗病（仮称） nae-fuhai-byo Cutting rot
Plectosporium tabacinum (van Beyma) Palm, Gams & Nirenberg
築尾嘉章ら : 日植病報75(3):206, 2009

メタカラコウ類・ツワブキ p.366
† † † 斑点病 hanten-byo Leaf spot
Alternaria cinerariae Hori & Enjoji
迫田琢也ら: 日植病報 75(1):52, 2009
[備考] 米国産ツワブキに発生

アラビス p.366
† † † 灰色かび病 hairo-kabi-byo Gray mold
Botrytis cinerea Persoon: Fries
君島悦夫ら : 植防研報 35:93, 1999
(注) 文献追加

グラジオラス p.367
† † † さび病 sabi-byo Rust
Uredo transversalis Thümen
Motokura, Y. et al.: Bull. Pl. Prot. Japan 36:47, 2000

[備考] イタリー。*Uromyces transversalis* (Thümen) Winterの夏胞子世代と考えられる

アリウム類 p.367

潜在感染 senzai-kansen latent infection

Shallot latent virus

山下一夫ら：日植病報63(6):486, 1997 : 山下一夫ら：日植病報 70(1):50, 2004

[備考] 戻し接種なし

チューリップ p.338

球根腐敗 kyukon-fuhai

Pseudomonas marginalis (Brown 1918) Stevens 1925

曾澤雅夫・水野明文：日植病報 65(3):360, 1999

[備考] 病名未提案。輸入球根に発生

ユリ類 p.368

赤すじ症 akasuji-sho Reddish-brown streak

(1) *Cucumber mosaic virus*

(2) *Lily symptomless virus*

西菜穂子ら：九病虫研会報 54:39, 2008

[備考] テッポウユリ。接種試験なし

サンダーソニア p.368

乾腐病 kampu-byo Bulb rot

Fusarium anguoides Sherbakoff

迫田琢也ら：日植病報 76(1):66, 2010

スターチス p.369

さび病 sabi-byo Rust

Uromyces savulescui Rayss

本藏洋一ら：植防研報 37:87, 2001

[備考] スペイン

果樹 Fruits trees

1. 新病名・病原追加/学名/病名変更・文献追加等

キウイフルーツ p.372

果実軟腐病 kajitsu-nampu-byo Soft rot

(1) *Botryosphaeria dothidea* (Mougeot: Fries) Cesati & de Notaris

(2) *Diaporthe* sp.

衣川 勝・佐藤豊三：日植病報 69(4):373, 2003

[備考] 文献追加。本病原により枝枯症状が引き起こされる

根腐病 negusare-byo Root rot
(1) *Pythium helicoides* Drechsler
(2) *Pythium vexans* de Bary
清水伸一ら：日植病報 71(3):210, 2005

すす斑病 susuhan-byo Sooty spot
Pseudocercospora actinidiae Deighton
菊原賢次・中島千晴：日植病報 73(3):181, 2007 ; Kikuhashi, K. and Nakashima, C.: J. Gen. Plant Pathol. 74(2):185, 2008

マンゴー p.373
枝枯細菌病 edagare-saikin-byo Bacterial shoot blight
Erwinia chrysanthemi Burkholder, McFadden & Dimock 1953
宮平奈央ら：日植病報 74(3):253, 2008

灰色葉枯病 haiiro-hagare-byo Gray leaf blight
Phomopsis mangiferae S. Ahmad
Kobayashi, T. & Okamoto, T.: J. Agr. Sci., Tokyo Univ. Agr. 43(3):89, 2003

軸腐病 jikugusare-byo Stem-end rot
Lasiodiplodia theobromae (Patouillard) Griffon & Maublanc
澤嶽哲也ら：日植病報 66(2):99, 2000

褐色葉枯病 kasshoku-hagare-byo Brown leaf blight
Phyllosticta anacardiacearum Aa
Kobayashi, T. & Okamoto, T.: J. Agr. Sci., Tokyo Univ. Agr. 48(3):89, 2003

炭疽病 tanso-byō Anthracnose
(1) *Colletotrichum acutatum* Simmonds ex Simmonds
田場 聰ら：熱帶農業 48:57, 2004
(注) 病原追加。これにより *C. gleosporioides* は(2)となる

ピタヤ p.375
乾腐病 kampu-byo Dry rot
Neoscystalidium dimidiatum (Penzig) Crous & Slippers [*Fusicoccum dimidiatum* (Penzig)
D. F. Farr]
佐藤豊三ら：日植病報 75(3):206, 2009

褐斑病 kappan-byo Brown spot

Fusarium sp.

鈴木裕子ら：日植病報 72(4):205, 2006

黒斑病 kokuhan-byo Black spot

Biporalis cactivora (Petrak) Alcorn

宮平奈央ら：日植病報 72(4):209, 2006

黒かび病 kurokabi-byo Rhizopus rot

Rhizopus stolonifer (Ehrenberg: Fries) Vuillemin var. *stolonifer*

田場 聰ら：日植病報 71(3):213, 2005

炭腐病 sumigusare-byo Charcoal rot

Macrophomina phaseolina (Tassi) Goidánich

田場 聰ら：日植病報 69(3):259, 2003

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

Colletotrichum gloeosporioides (Penzig) Penzig & Saccardo

田場 聰ら：日植病報 72(1):25, 2006

パパイヤ

p.375

斑点細菌病 hanten-saikin-byo Angular leaf spot

Pseudomonas syringae van Hall 1902

秋山雅世ら：日植病報 67(2):179, 2001

黒腐病 kurogusare-byo Black rot

Erwinia sp.

篠原弘亮ら：日植病報 70(3):282, 2004

[備考] 外国で報告のある*Erwinia papaya*によるbacterial cankerとの異同について調査を
要す

褐斑病 kappan-byo Greasy spot

Corynespora cassiicola (Berkeley & Curtis) Wei

小林憲範ら：日植病報 66(3):274, 2000 ; Kobayashi, N. et al.: Res. Bull. Pl. Prot. Japan

37:81, 2001 ; 小野 剛・中島千晴：日植病報 71(3):216, 2005

(注) 日本植物病名目録追録（付録・輸入果実）に記載されている褐斑病の項を削除する

苗立枯病 nae-tachigare-byo Damping-off

(1) *Pythophthora palmivora* (Butler) Butler

亀川 藍ら：日植病報 76(1):29, 2010

[備考] 龜川ら(2009)は本菌が軟腐病も引き起こすとした

(注) これにより *Phytophthora* sp.は(2)となる

カキ

p.376

疫病 eki-byo Phytophthora rot

(1) *Phytophthora citrophthora* (R. E. & E. H. Smith) Leonian

(2) *Phytophthora plamivora* (Butler) Butler

井伊吉博ら：四国植防39:70, 2004；三好孝典・清水伸一：日植病報 72(1):72, 2006

葉枯病 hagare-byo Leaf spot

(2) *Pestalotiopsis acaciae* (Thommen) Yokoyama & Kaneko

Yasuda, F. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 69(1):29, 2003

(注) 文献追加

(4) *Pestalotiopsis crassiuscula* Steyaert

Yasuda, F. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 69(1):29, 2003

(注) 文献追加

(5) *Pestalotiopsis glandicola* (Castagne) Steyaert

Yasuda, F. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 69(1):29, 2003；唐津達彦ら：近畿中国四国農研

2:72, 2003

[備考] *Pestalotiopsis glandicola*は果実黒すじ症(Fruit black stripe)も引き起こす (唐津ら 2003)

(注) 文献追加

褐色こうやく病 kasshoku-koyaku-byo Brown felt disease

Septobasidium tanakae (Miyake) Boedijn & Steinmann

山本和太郎・三宅 昌：植物防疫 10(3):110, 1956

[備考] 接種試験なし

果実黒すじ病 kajitsu-kurosuji-byo Fruit black stripe

Pestalotiopsis sp.

唐津達彦ら：日植病報 68(1):80, 2002

果実軟腐病 kajitsu-nampu-byo Ripe rot

(1) *Pestalotiopsis foedans* (Saccardo & Eills) Steyaert

(2) *Pestalotiopsis longiseta* (Spegazzini) Dai & Kobayashi

渡辺秀樹・田口義広：植物防疫 55(7):307, 2001

紅粒がんしゅ病 koryu-ganshu-byo Coral spot

Nectria cinnabarinna (Tode: Fries) Fries

安田文俊・伊澤宏毅：日植病報 72(4):210, 2006；Yasuda, F. and Izawa, H.: J. Gen. Plant

Pathol. 73(6):405, 2007

黒星落葉病 kurohoshi-rakuyo-byo Black leaf spot

Discostroma sp.

山本 淳ら : 日植病報 75(3):234, 2009

汚染果（黒点型）病 osenka-byo (kokutengata)

(1) *Colletotrichum acutatum* Simmonds ex Simmonds

唐津達彦ら : 日植病報 68(1):80, 2002

[備考] カキ (*D. kaki* Thunberg. var. *domestica* Makino) に発生

(3) *Glomerella cingulata* (Stonemam) Spaulding & Schrenk

唐津達彦ら : 日植病報 69(1):64, 2003

(注) 病原追加。これにより(1) *Colletotrichum* spp., (2) *Glomerella* sp.はそれぞれ(2), (4)となる

グミ

p.378

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

Colletotrichum sp.

矢口行雄ら : 日植病報 70(3):218, 2004

[備考] ナワシログミ (*E. pungens* Thunb.) に発生

ブルーベリー類

p.380

赤色輪点病 sekishoku-rinten-byo Red ringspot

Blueberry red ringspot virus

磯貝雅道ら : 日植病報 75(1):57, 2009 ; Isogai, M. et al.; J. Gen. Plant Pathol. 75(2): 140, 2009

枝枯病 edagare-byo Canker

Fusicoccum putrefaciens Shear

兼松聰子ら : 日植病報 69(1):27, 2003

[備考] ブルーベリー・ハイブッシュ系とラビットアイ系品種に発生。病原菌の所属について検討を要す

灰色かび病 haiiro-kabi-byo Gray mold

Botrytis cinerea Persoon: Fries

長尾英幸ら : 日植病報 68(1):66, 2002

[備考] ブルーベリー・ハイブッシュ系とラビットアイ系の品種に発生

環紋葉枯病 kammon-hagare-byo Zonate leaf spot

Cristulariella sp.

川口陽子ら：日植病報 71(1):49, 2005

菌核病 kinkaku-byo Sclerotinia rot

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary

Umemoto, S. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 73(4):290, 2007

[備考] Highbush blueberry (*V. corymbosum* L.), Rabbiteye blueberry (*V. ashei* Reade) に発生

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

(1) *Colletotrichum acutatum* Simmonds ex Simmonds

Yoshida, S. & Tsukiboshi, T.: J. Gen. Plant Pathol. 68(3):246, 2002

[備考] ハイブッシュブルーベリー (High bush Blueberry) *V. corymbosum* L. に発生

(2) *Colletotrichum gloeosporioides* (Penzig) Penzig & Saccardo

北澤 健ら：日植病報 76(1):67, 2010

バルデンシア葉枯病 *Valdensia-hagare-byo* Valdensia leaf blight

Valdensia heterodoxa Peyronel

猫塚修一ら：日植病報 73(3):180, 2007

クリ

p380

毛さび病 kesabi-byo Rust

Cronartium orientale Kaneko

Kaneko, S.: Mycoscience 41(2):115, 2000

(注) 病原学名変更。これにより *Cronatium quercuum* Miyabe は[]内に入る

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

(2) *Microsphaera sinensis* Yu

藤田 学ら：日植病報 69(3):257, 2003

(注) 病原の追加。これにより *M. alni* (Wallroth) Salmon は(1)となる

アケビ (通草、山女、木通) 類

p.384

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

Colletotrichum acutatum Simmonds ex Simmonds

Kobayashi, Y. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 70(5):295, 2004

[備考] ミツバアケビに発生

イチジク

p.385

こうじかび病 koji-kabi-byo Aspergillus blight

Aspergillus sp.

唐津達彦ら：日植病報 69(1):64, 2003

黒葉枯病 kuro-hagare-byo Black leaf blight

Fusicoccum aesculi Corda

井上幸次ら：日植病報 74(3):180, 2008

バナナ

p.387

バンチートップ病 bunchy top-byo Bunchy top

Banana bunchy top virus

Furuya, N. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 71(1):68, 2005

(注) 文献追加。従来、バンチートップ病としていたが、定着しているバンチートップ病に病名変更

フトモモ類

p.388

褐斑病 kappan-byo Brown spot

Pseudocercospora xenosyzygiicola Crous

Nakashima, C. et al.: Mycoscience 43:95, 2002

[備考] 接種試験なし。レンブに発生

グアバ

p.388

疫病 eki-byo Phytophthora fruit rot

Phytophthora nicotianae van Breda de Haan

高江洲和子ら：日植病報 67(2):168, 2001

ペスタロチア病 Pestalotia-byo Pestalotia disease

Pestalotiopsis toxica (Ellis & Everhart) X. A. Sun & Q. X. Ge

Kobayashi, T. & Okamoto, T.: J. Agr. Sci., Tokyo Univ. Agr. 48(3):89, 2003

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

Colletotrichum gloeosporioides (Penzig) Penzig & Saccardo

矢口行雄ら：東京農大農学集報 48(1):12, 2003

オリーブ

p.389

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

(1) *Colletotrichum acutatum* Simmonds ex Simmonds

都崎芳久・川原精剛：四国植防 36:7, 2001

[備考] 衣川ら（日植病報74(3):157, 2008）は本菌による新梢枯死症を報告した。

付録p.441

(注) これにより *C. gloeosporioides* は(2)となる

パッショントルーツ

p.389

ウッディネス病 woodiness-byo Woodiness
East Asian Passiflora virus
Iwai H. et al.: Ann. Phytopath. Soc. Jpn. 62(5):459, 1996 ; 岩井 久ら : 日植病報 72(4):302, 2006 ; Iwai, H. et al.: Arc. Virol. 151:811, 2006 ; Iwai, H. et al.: Arc. Virol. 151:1457, 2006
[備考] Iwai et al. (1996)は本ウイルスをPassiflora woodiness virusとしたが、岩井ら (2006) およびIwai et al. (2006)がEast Asian Passiflora virusに訂正した
(注) 病原名変更、文献追加

萎凋病 icho-byo Passiflora wilt
Haematonectria ipomoeae (Halsted) Samuels & Nirenberg
廣岡裕吏ら : 日植病報 66(3):272, 2000 ; 廣岡裕吏ら : 日植病報 69(1):1, 2003
[備考] アナモルフ : *Fusarium striatum* Sherbakof

軸腐病 jikugusare-byo Stem-end rot
Lasiodiplodia theobromae (Patouillard) Griffon & Maublanc
小野 剛・中島千晴 : 日植病報 71(3):216, 2005

円斑病 maruhan-byo Circular spot
Septoria pastinacina Saccardo [*Septoria passifloricola* Punithanlingam]
久保田まやら : 日植病報 62(6):606, 1996 : Kobayashi, T. & Okamoto, T.: J. Agr. Sci., Tokyo Univ. Agr. 48(3):89, 2003
(注) 病原学名変更

炭疽病 tanso-byo Anthracnose
(1) *Colletotrichum capsici* (Sydow) E. J. Bulter & Bissy
(2) *Colletotrichum gleosporioides* (Penzig) Penzig & Saccardo
Kobayashi, T. & Okamoto, T.: J. Agr. Sci., Tokyo Univ. Agr. 48(3):89, 2003

カリン (楓櫧、花梨、木瓜) p.390
根頭がんしゅ病 konto-ganshu-byo Crown gall (根頭癌腫病)
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend 1907) Conn 1942 [*Bacterium tumefaciens* Smith & Townsend]
高木三郎 : 日園雑 45(12):37, 1933(昭 8)
[備考] 本菌の宿主の一つとして「木瓜」が挙げられているが、これはパパイアでなく、カリンと推定される

黒点病 kokuten-byo Fruit spot
Mycosphaerella pomi (Passerini) Lindau
荒井茂充・原田幸雄 : 日植病報 70(1):54, 2004

白かび斑点病 shirokabi-hanten-byo Frosty mildew

Mycosphaerella chaenomelis Suto [不完全世代 *Cercospora chaenomelis* Suto]

Suto, Y.: Mycoscience 40:509, 1999

(注) 新病原名。これにより *Cercospora* sp. の病原学名は変更される

マルメロ

p.391

ごま色斑点病 gomairo-hanten-byo Entomosporium leaf spot, Fabraea leaf spot and fruit rot

Diplocarpon mespili (Sorauer) Sutton [Entomosporium mespili (de Candolle) Saccardo]

江口直樹ら : 日植病報 73(1):42, 2007

(注) 完全世代名の追加。日本植物病名目録(2000) p.391の本病備考欄「が、完全世代の国内発生は不明」を削除する

黒点病 kokuten-byo Blotch

Mycosphaerella pomi (Passerini) Lindau

荒井茂充・原田幸雄 : 日植病報 70(2):128, 2004

[備考] アナモルフ : *Cylindrosporium pomi* Brooks

尻腐病 shirigusare-byo Calyx end rot

Phomopsis sp.

江口直樹・萩原保身 : 日植病報 68(2):186, 2002 : 江口直樹ら : 関東病虫研報 50:79, 2003

炭疽病 tanso-byo Bitter rot

(1) *Colletotrichum acutatum* Simmonds ex Simmonds

江口直樹・萩原保身 : 日植病報 68(2):186, 2002

(注) 病原追加。これにより *Glomerella cingulata* は(2)となる

ビワ

p.391

灰斑病 haihan-byo Gray leaf spot

(4) *Seiridium* sp.

佐藤豊三ら : 日植病報 73(3):181, 2007

[備考] 病原追加

黒腐病 kurogusare-byo Black rot

(1) *Dothiorella* sp.

(2) *Lasiodiplodia theobromae* (Patouillard) Griffon & Maublanc

矢口行雄ら : 日植病報 56(3):408, 1999

リンゴ

p.393

根頭がんしゅ病 konto-ganshu-byo Crown gall

(1) *Agrobacterium rhizogenes* (Riker, Banfield, Wright, Keitt & Sagen 1930) Conn 1942

對馬由記子ら：日植病報 70(1):53, 2004

[備考] 旧来表記の*A. tumefaciens* biovar 2は*A. rhizogenes* tumorigenic strainである。トマトに戻し接種。旧来表記の*A. tumefaciens* biovar 1は*A. tumefaciens* nonpathogenic strainである

(注) 病原の追加。これにより*A. tumefaciens*は(2)となる

赤衣病 akagoromo-byo Pink disease

Erythricium salmonicolor (Berkeley & Brome) Burdsall

広間勝巳ら：日植病報 52(3):546, 1986

(注) 文献追加（国内初記載）。日本植物病名目録(p.393)における本病文献の富樫浩吾(1950)は外国文献の紹介

斑点落葉病 hanten-rakuyo-byo Alternaria blotch 04-97

Alternaria mali Roberts

澤村健三：東北農試研報 23:163, 1962

(注) 備考欄に「澤村(1962)の報告は病原性を確認した」を追記する

アンズ

p.398

環紋葉枯病 kammon-hagare-byo Zonate leaf spot

Gravesinia pruni Y. Harada & Noro [Anamorph: *Hinomyces pruni* (Y. Harada & Noro) Narumi-Sato & Y. Harada]

Narumi-Saito, T. et al.: Mycoscience 47:351, 2006

(注) 病原学名（アナモルフ）変更。これにより日本植物病名目録 p.399本病病原学名（アナモルフ）*Cristulariella pruni*を削除する

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

(1) *Colletotrichum acutatum* Simmonds ex Simmonds

菅野博英・森脇文治：日植病報 65(3):407, 1999

(注) 病原追加。これにより*Gloesporium* sp.は(2)となる

ウメ

p.400

灰星病 haiboshi-byo Brown rot

(1) *Monilia mucicola* Y. Harada, Y. Sasaki & T. Sano

Harada, Y. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 70(6):297, 2004

(注) 病原学名変更。これにより日本植物病名目録 (p.401) の灰星病 (3) *Monilia* sp.は削除し、(1) *Monilinia fructicola* は(2)、(2) *Monilinia laxa*は(3)となる

環紋葉枯病 kammon-hagare-byo Zonate leaf spot

Gravesinia pruni Y. Harada & Noro [Anamorph: *Hinomyces pruni* (Y. Harada & Noro)

Narumi-Sato & Y. Harada]

Narumi-Saito, T. et al.: Mycoscience 47:351, 2006

(注) 病原学名 (アナモルフ) 変更。これにより日本植物病名目録 p.401本病病原学名 (アナモルフ) *Cristulariella pruni*を削除する

すす斑病 susuhan-byo Sooty blotch

Peltaster sp.

島津 康ら : 日植病報 73(3):181, 2007

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

(1) *Colletotrichum acutatum* Simmonds ex Simmonds

菅野博英・森脇丈治 : 日植病報 65(3):407, 1999 ; 菅野博英ら : 日植病報 65(6):661, 1999

(注) 病原追加。これにより *Glomerella cingulata*は(2)となる

オウトウ

p.403

ウイルス病 virus-byo Virus

(2) *Apple stem grooving virus*

福井要子ら : 日植病報 65(6):669, 1999

[備考] 品種サミット

(3) *Cherry virus A*

山下一夫ら : 日植病報 68(2):237, 2002

[備考] 品種サミット

(注) 病原追加。これにより *Green ring mottle*は(4)に、以下ひとつずつ番号が変わる

黒斑病 kokuhan-byo Black spot

Alternaria sp.

佐藤 裕・水野 昇 : 日植病報 66(3):269, 2000

スモモ類

p.405

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

Colletotrichum acutatum J. H. Simmonds

萩田孝志 : 北日本病虫研報 57:78, 2006

[備考] ヨーロッパスモモに発生

(注) 文献追加。

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

(1) *Erysiphe* sp.

神谷敏広・佐藤幸生 : 日植病報 69(3):258, 2003

[備考] *Erysiphe*属 *Uncinula*節の新種と考えられる

(注) 病原の追加。これにより、*P. tridactyla*は(2)となる

果実赤点病 kajitsu-sekiten-byo Fruit red spot

Ellisembia sp.

森本涼子ら：日植病報 74(3):184, 2008

黒斑病 kokuhan-byo Black spot

Alternaria alternata (Fries) Keissler

Inoue, K. & Nasu, H.: J. Gen. Plant Pathol. 66(1):18, 2000

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

(1) *Colletotrichum acutatum* Simmonds ex Simmonds

菅野博英・森脇文治：日植病報 65(3):407, 1999

(注) 病原追加。これにより *Colletotrichum gleosporioides* は(2)となる

新梢黒変細菌病 shinsho-kokuhensai-kin-byo Bacterial black shoot

Erwinia sp.

水野明文ら：日植病報 75(3):208, 2009；松浦貴之ら：日植病報 75(3):208, 2009；

Mizuno, A. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 76(1):43, 2010

赤衣病 akagoromo-byo Pink disease

Erythricium salmonicolor (Berkeley & Broome) Burdsall

川上暢喜ら：日植病報 76(1):42, 2010

褐色斑点病 kasshoku-hanten-byo Brown spot

Stemphylium sp.

棚橋 恵ら：日植病報 74(3):183, 2008

黒斑病 kokuhan-byo Black spot

Alternaria alternata (Fries) Keissler

棚橋 恵ら：日植病報 70(3):168, 2004

(注) 文献追加。日本植物病名目録(2000) p.413の備考欄の記載を削除する

黒点病 kokuten-byo *Mycosphaerella* fruit rot

Mycosphaerella pomi (Passerini) Lindau

荒井茂充ら：日植病報 69(3):198, 2003

[備考] アナモルフ：*Cylindrosporium pomi* Brooke

炭疽病 tanso-byo Anthracnose Bitter rot

(1) *Colletotrichum acutatum* Simmonds ex Simmonds

菅野博英・森脇文治：日植病報 65(3):407, 1999

(注) 病原追加。これにより *Glomerella cingulata* は(2)となる

(2) *Glomerella cingulata* (Stoneman) Spaulding & Schrenk

菅野博英ら：日植病報 65(6):661, 1999

(注) 病原菌の完全世代確認、追加

汚果病 yogoreka-byo Fruit stain

Stenella sp.

那須英夫：岡山農試研報 16:7, 1998

ナシ

p.413

ホクシマメナシ（マンシュウマメナシ） *P. betulaefolia* Bunge

赤衣病 akagoromo-byo Pink disease

Erythricium salmonicolor (Berkeley & Broome) Burdsall

川上暢喜ら：日植病報 76(1):42, 2010

灰色かび病 haiirokabi-byo Gray mold

Botrytis cinerea Persoon: Fries

富樫浩吾：果樹病学 127, 1950

[備考] 梅本清作ら(日植病報 64(4):430, 1998；千葉農林総研研報 1:21, 2009)はホクシマメナシでの発生を報告している

(注) 備考変更

果実腐敗病 kajitsu-fuhai-byo Fruit rot

Fusarium avenaceum (Corda: Fries) Saccardo

久保周子ら：日植病報 67(2):164, 2001

[備考] ニホンナシに発生

(注) 文献追加。日本植物病名目録p.415の本病名の備考欄「病原菌の同定については再検討を要する。なお」を削除

褐色腐敗病 kasshoku-fuhai-byo Bull's-eye rot

Cryptosporiopsis corticola (Edgerton) Nannfeldt

新田浩通ら：日植病報 68(2):190, 2002

[備考] ニホンナシに発生

黒点病 kokuten-byo Mycosphaerella fruit spot

Mycosphaerella pomi (Passerini) Lindau

荒井茂充：日植病報 67(2):167, 2001

[備考] アナモルフ：*Cylindrosporium pomi* Brooks, ニホンナシに発生

黒かび病 kurokabi-byo Rhizopus rot
Rhizopus stolonifer (Ehrenberg: Fries) Vuillemin var. *stolonifer*
安田文俊ら：植物防疫 53(7):257, 1999

- 炭疽病** tanso-byo Anthracnose
- (1) *Colletotrichum acutatum* Simmonds ex Simmonds
深谷雅子ら：日植病報 66(2):99, 2000；深谷雅子：日植病報 70(3):184, 2004
(注) 病原追加。これにより *Glomerella cingulata* は(2)となる
- 汚果病** yogoreka-byo Fruit stain
- (1) *Acaromyces ingoldii* Boekhout, Scorzetti, Gerson & Sztejnberg
安田文俊ら：日植病報 71(1):75, 2005；安田文俊ら：日植病報 71(4):156, 2005；
Yasuda, F. et al.: Mycoscience 47:36, 2006；安田文俊ら：日植病報 73:166, 2007
[備考] ニホンナシに発生
(注) 学名変更(*Hyalodendron* sp. (那須英夫・中桐 昭：岡山農試研報 15:25, 1997) を*A. ingoldii* とする)。
- (3) *Meira geulakonigii* Boethout, Scorzetti, Gerson & Sztejnberg
安田文俊ら：日植病報 72(1):73, 2006
(注) 病原追加
- (4) *Meira nashicola* F. Yasuda & H. Otani
安田文俊ら：日植病報 71:156, 2005；Yasuda, F. et al.: Mycoscience 47:36, 2006
[備考] ニホンナシに発生
- (5) *Meira* sp.
安田文俊ら：日植病報 71(1):75, 2005；安田文俊ら：日植病報 71(4):156, 2005
(注) 病原追加
- (7) *Pseudozyma aphidis* (Henninger & Windisch) Boekhout
安田文俊ら：日植病報 72(1):73, 2006
(注) 病原追加
- (8) *Stenella* sp.
那須英夫・中桐 昭：岡山農試研報 15:25, 1997
(注) 文献追加。これにより(2) *Hyalodendron* sp.. (3) *Phomopsis* sp. の括弧内番号は
変更

- カンキツ類** p.420
カンキツ (柑橘)
キンカン (金柑)
カラタチ (枸橘、枳殼)
モザイク病 mosaic-byo Mosaic
Citrus mosaic virus#

吉井 啓：植物防疫 12(8):367, 1958

(注) 文献追加

グリーニング病 greening-byo Citrus huanglongbing HLB (英旧名 : Citrus greening)

Candidatus "Liberobacter asiaticum" Jagoueix, Bove & Garnier 1994

宮川経邦・津野和宣：日植病報 55(4):519, 1989 ; 宮川経邦・津野和宣：日植病報 55(5):667, 1989 ; 宮川経邦：南九州大学研報 30(A):53, 2000 ; Subandiyah, S. et al.: Plant Dis. 84:15, 2000

(注) 病原変更

赤衣病 akagoromo-byo Pink disease

Erythricium salmonicolor (Berkeley & Broom) Burdsell

堀 正太郎：日植病報 1(4):67, 1921(大 10)

[備考] 病名目録(p.421)の澤田兼吉：台灣農事報 80:9, 1913(大 2)、原 摂祐：果樹病害論 301, 1916(大 5)の記載は台灣での発生記録

疫病 eki-byo Phytophthora rot

(2) *Phytophthora citrophthora* (R. E. & H. Smith) Leonian

瀧元清透：柑橘研究 5(1):55, 1931

(注) 文献追加

(3) *Phytophthora nicotianae* van Breda de Haan

植松清次ら：日植病報 65(3):412, 1999

[備考] ウンシュウミカン、ユズに発生

(注) 文献追加。

*白色こうやく病 hakushoku-kōyaku-byo White felt disease

Septobasidium citricola Sawada [*Septobasidium citricolum* Sawada]

澤田兼吉：柑橘研究 2(1):101, 1928 (昭 3)

[備考] 接種試験の記述なし。ヒュウガナツ *C. tamurana*に発生

褐色腐敗病 kasshoku-fuhai-byo Brown rot

(1) *Phytophthora citricola* Sawada

清水伸一ら：日植病報 72(1):72, 2006

(注) 病原追加

(3) *Phytophthora nicotiane* van Breda de Haan

田代暢哉ら：日植病報 68(2):189, 2002

(4) *Phytophthora palmivora* (Butlre) Butlre

田代暢哉ら：日植病報 68(2):189, 2002

(注) 病原追加。これにより *P. citrophthora* は(2)となる

こうじかび病 kojikabi-byo Aspergillus rot

(1) *Aspergillus flavus* Link

田代暢哉ら：日植病報 69(1):21, 2003

[備考] ハウスミカン *Citrus* sp.に発生

(注) 病原の追加。

(2) *Aspergillus carbonarius* (Bainer) Thom

三好孝典ら：日植病報 73(1):61, 2007

(注) 病原の追加

(3) *Aspergillus japonicus* Saito

三好孝典ら：日植病報 73(1):61, 2007

(注) 病原の追加。これにより *A. niger* は(4)となる

黒かび病 kurokabi-byo Rhizopus rot

Rhizopus stolonifer (Ehrenberg: Fries) Vuillemin var. *stolonifer*

田代暢哉ら：日植病報 68(1):47, 2002

[備考] 中晩性カンキツ（不知火）、温州ミカン（貯蔵中）

そうか病 soka-byo Scab

Elsinoë fawcettii Bitancourt & Jenkins

横山：農学会報 31:76, 1896 (明 29)

[備考] 横山(1896)では菌の分類学的記載が不明瞭 (*Cladosporium*属菌と記載)

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

Colletotrichum gloeosporioides (Penzig) Penzig & Saccardo

間佐吉将則ら：日植病報 73(3):181, 2007

[備考] ハッサク

(注) 文献追加

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

Oidium sp.

山田憲吾ら：日植病報 65(3):412, 1999；山田憲吾ら：日植病報 66(1):40, 2000

[備考] *Erysiphe polygoni*型。タンカン (*Citrus tankan* Hayata)、ポンカン (*C. reticulata* Blanco)に発生

アテモヤ p.426***

Annona atemoya Hort. & Wester

すすかび病 susukabi-byo Sooty spot

Pseudocercospora annonicola Hsieh & Goh

Nakashima. C. et al.: Mycoscience 43:95, 2002

[備考] 現在本菌の所属が変更され、*Pseudocercospora annonae-squamosae* Braun &

Castaneda (Braun & Castaneda, Cryptog. Bot. 1:50, 1989)となつた。接種試験なし

ブドウ p.427

潜在感染 senzai-kansen latent infection Yellow speckle

Grapevine yellow speckle viroid 1

Sano, T. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 66(1):68, 2000

脱粒病 datsuryu-byo Berry drop

(1) *Diaporthe melonis* Beraha & O'brien var. *brevistylospora* Kobayashi & Ohsawa

(2) *Phomopsis* sp.

衣川 勝ら : 日植病報 74(4):346, 2008

枝膨病 edabukure-byo Swelling arm

Diaporthe kyushuensis Kajitani & Kanematsu

Kajitani, Y. & Kanematsu, S.: Mycoscience 41:111, 2000

(注) 病原同定

房枯病 fusagare-byo Cluster rot

(2) *Fusicoccum aesculi* Corda

那須英夫・井上幸次 : 岡山県農試研報 25:11, 2007

[備考] *Botryosphaeria* sp.との異同は要検討。

(注) 病原追加。これにより *Botryosphaeria* sp.は(1)となる

果実腐敗 kajitsu-fuhai Fruit rot

(1) *Pestalotiopsis meneziana* (Bresadola & Torrey) Bissett

許 玲ら : 日植病報 65(3):305, 1999

[備考] 市場病害。本菌はペスタロチア属の枯病菌

(2) *Pestalotiopsis uvicola* (Spegazzini) Bissett

許 玲ら : 日植病報 65(3):305, 1999

[備考] 市場病害。本菌は大房枯病菌

根頭がんしゅ病 konto-ganshu-byo Crown gall

(2) *Rhizobium radiobacter* (Ti) (Beijerinck & van Delden 1902) Young, Kuykendall, Martinez-Romero, Kerr & Sawada 2001 [*Agrobacterium tumefaciens* biovar 1 (Smith & Townsend 1907) Conn 1942, *A. tumefaciens* (Ti) (Smith & Townsend 1907) Conn 1942] 川口 章・井上幸次 : 日植病報 74(3):253, 2008 ; Kawaguchi, A. and Inoue, K.: J. Gen. Plant Pathol. 75(3):205, 2009

[備考] Young et al. (2001)の分類によれば *A. vitis* は *Rhizobium vitis* となる

(注) これにより *A. vitis* は(1)となる。

ラシオディプロディア房枯病 *Lasiodiplodia-fusagare-byo* Lasiodiplodia cluster rot
Lasiodiplodia theobromae (Patouillard) Griffon & Maublanc
井上幸次・那須英夫：日植病報 74(1):68, 2008

晚腐病 osogusare-byo Ripe rot
(1) *Colletotrichum acutatum* Simmonds ex Simmonds
山本 淳：日植病報 65(1):83, 1999
(注) 文献追加

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew
(1) *Erysiphe necator* Schweinitz var. *necator*
Nomura, Y. et al.: Mycoscience 44:157, 2003
[備考] 接種試験なし
(注) 病原追加
(2) *Uncinula necator* (Schweinitz) Burrill
井上幸次ら：日植病報 69(3):258, 2003
(注) 完全世代の確認。これにより日本植物病名目録の本病備考欄(p.430)の「完全世代は国内未発見」を削除する

汚果病 yogoreka-byo Fruit stain
(1) *Cladosporium* sp.
(2) *Hyalodendron* sp.
那須英夫・井上幸次；岡山県農試研報 19:19, 2001

2. 付録

マンゴー p.432
† † † 瘦病 eki-byo Phytophthora rot
Phytophthora palmivora (Butler) Butler
小林慶範ら：日植病報 69(1):48, 2003
[備考] メキシコ

ピタヤ p.434
茎腐症 kukigusare-sho Stem rot
(1) *Colletotrichum gloeosporioides* (Penzig) Penzig & Saccardo
(2) *Macrophomina phaseolina* (Tassi) Goidánich
(3) *Rhizopus* sp.
宮平奈央ら：日植病報 73(3):183, 2007

パパイヤ p.434
† † † 褐斑病 kappan-byo Greasy spot

Corynespora cassiicola (Barkeley & Curtis) Wei
小林憲範ら：日植病報 66(3):274, 2000 ; Kobayashi, N. et al.: Res. Bull. Pl. Prot. Japan
37:81, 2001
[備考] フィリッピン

カキ p.434

ウイロイド viroid Persimmon viroid
Persimmon viroid (PVd)
中畠良二・中野正明：日植病報 74(1):65, 2008

バナナ p.439

Banana bract mosaic virus
長嶋一郎ら：日植病報 73(3):225, 2007
[備考] ミャンマー

† 青枯病 aogare-byo Blood disease

(2) *Ralstonia* sp.
Kusumoto, S. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 70(1):45, 2004
[備考] 病原は*Ralstonia* 近縁種。インドネシア（スマトラ）
(注) これにより *R. solanacearum* は(1)となる

† † † 果実腐敗病 kajitsu-fuhai-byo Fusarium fruit rot

Fusarium veticilliodes (Saccardo) Nirenberg
Hirata, T. et al.: Mycoscience 42(2):155, 2001
[備考] メキシコからの輸入果実 *Musa cavendishii* Lamb. ex Paxt. に発生
(注) 病原学名変更。これにより *Fusarium moniliforme* Sheldon は[]内に入る

マカデミア p.390

Macadamia spp.
マカデミア・インテグリフォリア *M. integrifolia* Maiden & Betche
マカデミア・テトラフィラ *M. tetraphylla* L. Johnson
† 急性立枯病 kyusei-tachigare-byo Sudden decline
Macrophoma castaneicola Kobayashi & Oishi
匠原監一郎ら：日植病報 70(1):45, 2004
[備考] 本病と病原の確認が必要。ボリビア

オリーブ p.441

新梢枯死症 shinsho-koshi-sho Shoot dieback
Colletotrichum acutatum J.H. Simmonds ex Simmonds
衣川 勝ら：日植病報 74(3):157, 2008

[備考] 病原は炭疽病と同一

リンゴ p.442

Apple dimple fruit viroid

磯野清香ら：日植病報 73(3):220, 2007

[備考] 戻し接種なし

ウメ p.445

Phytoplasma

(1) ‘*Candidatus Phytoplasma asteris*’

(2) *Phytoplasma* ホルトノキ萎黃病ファイトプラズマ

河辺祐嗣ら：日植病報 73(3):266, 2007

[備考] 樹勢衰退木より検出

Plum pox virus

萱野佑典ら：日植病報 76(1):36, 2010

[備考] 病名提案なし

ブドウ p.453

衰弱枯死 suijaku-koshi Clitocybe root rot

Armillariella tabescens (Scopoli:Fries) Singer (ナラタケモドキ)

藤井新太郎・畠本 求：植物防疫 28(6):219, 1974；井上幸次ら：日植病報 69(1):63, 200

3

[備考] 接種試験なし

葉脈腐敗症 yomyaku-fuhai-sho Bacterial vein rot

細菌の 1 種

森田 昭：九病虫研会報 50:19, 2004

キイチゴ類 p.448

† † † さび病 sabi-byo Rust

(2) *Pucciniastrum americanum* (Farlow) Arthur

本巣洋一・君島悦夫：日植病報 64(6):600, 1998；Motokura, Y. et al.: Bull. Pl. Prot.

Japan 35:103, 1999

[備考] 米国（カルフォルニア）。ラズベリー *Rubus idaeus* L.に発生

(注) これにより *P. arcticum* は(1)となる

カンキツ類 p.449

緑斑症 ryokuhan-sho Green tear stain

Colletotrichum gloeosporioides (Penzig) Penzig & Saccardo

間佐古将則ら：日植病報 73(3):181, 2007

[備考] ハッサク(*C. hassaku*)に発生。病原菌は炭疽病菌と同一

Citrus psorosis virus

伊藤隆男ら：日植病報 73(3):225, 2007

[備考] ソローシス病様症状

針葉樹 Conifers

1. 新病名・病原追加/学名/病名変更・文献追加等

ヒノキ p.456

きぞめたけ病 kizometake-byo Butt rot

(1) *Phlebia chrysocrea* (Berkeley & Curtis) Burdsall

Kubayashi, T. & Maekawa, N.: J. Gen. Plant Pathol. 67(4):262, 2001

(注) 病原追加。これにより *Tinctoporellus epimiltinus* は(2)となる

シマナンヨウスギ (コバノナンヨウスギ) p.456

Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco

褐色葉枯病 kasshoku-hagare-byo Brown needle blight

Phyllosticta drummondii Vanef & van der Aa [*Phyllosticta brasiliensis* Linder 1943, non Spepazzini 1889]

Kobayashi, T. et al.: Mycoscience 44(6):473, 2003

[備考] 接種試験なし

(注) 病原学名変更、文献追加。日本植物病名目録p.456植物名アロウカリ亞を標記名に変更する。同目録（付録）p.507のアロウカリ亞褐色葉枯病を本文に移行する

サワラ p.459

樹脂胴枯病 jushi-dogare-byo Resinous canker

Seiridium unicorni (Cooke & Ellis) Sutton

小林佳南子ら：日植病報 70(1):44, 2004

[備考] シノブヒバ(*C. pisifera* Endl. var. *plumosa* Beissn.)に発生

(注) 文献追加。

ネズ p.462

こうやく病 k_□yaku-byo Felt disease

Septobasidium albidum Patouillard

藤岡保夫：広島農業の研究 6:25, 1970

[備考] 病原菌の形態、接種試験の記述なし

イチョウ p.465

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & Schrank

矢口行雄ら：日植病報 70(3):218, 2004

モミ類

p.466

葉ふるい病 hafurui-byo Needle cast

(1) *Lirula japonica* S. Kaneko

Kaneko, S.: Mycoscience 44:335, 2003

[備考] オオシラビソに発生。オオシラビソ上で *L. exigua* S. Kanekoも認められるが二次寄生と判断される

(注) 病原追加。これにより *L. nervisequia* は(2)となる

ネクトリアがんしゅ病 *Nectria-ganshu-byo* Nectria canker

Neonectria castaneicola (Yamamoto & Oyasu) Kobayashi & Hirooka

小林享夫ら：日植病報 69(1):49, 2003；廣岡裕吏ら：日植病報 69(3):264, 2003；

Kobayashi, T. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 71(2):124, 2005

[備考] シラビソ（シラベ）に発生

ゴヨウマツ

p.485

かさぶたがんしゅ病 *kasabuta-ganshu-byo* Scab canker

Scolecostigmina sp.

山田利博ら：日植病報 72(1):50, 2006；中島千晴ら：日植病報 72(1):50, 2006

[備考] ヒメコマツ、ストローブマツ、キタゴヨウ、マケドニアゴヨウ、メキシコシロマツ、ヒマラヤゴヨウ、*P. fenzeliana* Hande-Mazzettiに発生

ペスタロチア葉枯病 *Pestalotia-hagare-byo* Pestalotia disease

(2) *Pestalotiopsis lespedezae* (Sydow) Bilgrami

高橋幸吉・小林享夫：樹木医学研究 3(1):21, 1999

[備考] ヒメコマツ

(注) 病原追加。これにより(2)*P. neglecta*は(3)となる

マツ類

p.488

リュウキュウマツ *Pinus luchuensis* Mayer (追加)

褐斑葉枯病 *kappan-hagare-byo* Brown spot needle blight

Lecanosticta acicola (Thümen) H. Sydow

Suto, Y. & Ougi, D.: Mycoscience 39:319, 1998

(注) 文献追加

こぶ病 *kobu-byo* Gall rust

Cronartium orientale Kaneko [*Cronarium quercuum* Miyabe ex Shirai]

Kaneko, S.: Mycoscience 41(2):115, 2000

[備考] アカマツ、クロマツに発生

(注) 病原学名変更

ペスタロチア葉枯病 Pestalotia-hagare-byo Pestalotia disease

(1) *Pestalotiopsis disseminata* (Thüm) Steyaert

高橋幸吉・小林享夫：樹木医学研究 3(1):21, 1999

[備考] 宿主追加（クロマツ）

(2) *Pestalotiopsis neglecta* (Thüm) Steyaert

高橋幸吉・小林享夫：樹木医学研究 3(1):21, 1999

[備考] 宿主追加（クロマツ）

(3) *Pestalotiopsis populi-nigrae* (Sadada & Ito) Morelet

高橋幸吉・小林享夫：樹木医学研究 3(1):21, 1999

[備考] 宿主追加（アカマツ）

漏脂胴枯病 roshi-dogare-byo Pitch canker

(1) *Cosmospora* sp.

廣岡裕史・小林享夫：日植病報 70(3):221, 2004

[備考] アナモルフは *Fusarium* 属菌

(注) 病原学名変更

(2) *Fusarium circinatum* Nierenberg & O'Donnell emed. Britz, Coutinho, Wingfield & Marasas

青木孝之・O'Donnell, K. : 日植病報 67(2):169, 2001

[備考] 小林・村本らにより *F. moniliforme* var. *subglutinans* とされていた原因菌の再同定の結果である

(注) 病原学名変更。日本植物病名目録(2000) p492の *F. subglutinans* (*F. moniliforme* var. *subglutinans*) は *F. circinatum* となる

イヌマキ

p.499

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & Schrenk

都崎芳久：四国植防 33:29, 1998

[備考] イヌマキに発生

2. 付録

チョウセンゴヨウ

p.485

† **ペスタロチア葉枯病 Pestalotia-hagare-byo Pestalotia disease**

Pestalotiopsis conigena (Léveillé) Takahashi et Kobayashi

高橋幸吉・小林享夫：樹木医学研究 3(1):21, 1999

[備考] 中国（東北部）

イヌマキ p.513
灰色こうやく病 haiiro-kōyaku-byo Gray felt disease
Septobasidium bogoriense Patouillard
[備考] 文献は1975年の森林病害虫被害発生状況報告。病名のみ病原に記載、接種試験の記述なし。イヌマキに発生

竹笹類 Bamboos

1. 新病名・病原追加/学名/病名変更・文献追加等

ササ類 p.516
クマイザサ *Sasa senanensis* (Franch. & Savat.) Rehder
てんぐ巣病 tengusu-byo Witches' broom
(1) *Aciculosporium sasicola* Oguchi
Oguchi, T.: Mycoscience 42:217, 2001
[備考] クマイザサに発生
(注) 病原追加。これにより *Epichloë sasae* Hara は(2)となる

オカメザサ p.523
炭疽病 tanso-byo Anthracnose
Colletotrichum sp.
竹内 純ら: 関東病虫研報 50:105, 2003

2. 付録

マダケ類 p.529
てんぐ巣病 tengusu-byo Witches' broom
'*Candidatus Phytoplasma asteris*'
Jung, H-Y. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 72(4):261, 2006
[備考] 韓国。ハチク (*Phyllostachys nigra* Munro var. *henonis*)に発生

広葉樹 Broad-leaved trees

1. 新病名・病原追加/学名/病名変更・文献追加等

カエデ類 p.538
赤衣病 akagoromo-byo Pink disease
Erythricium salmonicolor (Berkeley & Broome) Burdsall [*Corticium salmonicolor* Berkeley & Broome]
川島祐介: 群馬林試研報 1:20, 1992 ; Nomi, C. et al.: J. Agr. Sci., Tokyo Univ. Agr. 44(4):255, 2000
[備考] ウリハダカエデ *A. rufinerve*, サトウカエデ *A. saccharum*
(注) 病原追加

環紋葉枯病 kammon-hagare-byo Zonate leaf spot

(1) *Cristulariella depraedans* (Cooke) Hohnel
鳴海智子・原田幸雄：日植病報 65(6):663, 1999
(注) 文献追加

ならたけもどき病 naratakemodoki-byo Clocybe root rot
Armillaria tabescens (Scopoli: Freis) Emel
高橋幸吉：樹木医学研究 4(1):42, 2000
[備考] イロハモミジ (*A. palmatum*) に発生

ネクトリアがんしゅ病* *Nectria-ganshu-byo* Nectria canker
Neonectria castaneicola (Yamamoto & Oyasu) Kobayashi & Hirooka
小林享夫ら：日植病報 69(1):49, 2003；廣岡裕吏ら：日植病報 69(3):264, 2003；
Kobayashi, T. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 71 (2):124, 2005
[備考] ウリカエデ(*A. crataegifolium* Siebold. & Zucc)に発生

センネンボク (コルジリーネ) Common dracaena p.542
Cordyline terminalis Kunth
疫病 eki-byo
Phytophthora sp.
福西 務・山本 勉：四国植防 10:41, 1975

褐斑病 kappan-byo Brown leaf spot
Phyllosticta cordylinophila Young aqud Stevens
小林享夫ら：森林防疫 50(6):134, 2001；Kobayashi, T. et al.: Mycoscience 44(6):473,

2003
[備考] 接種試験なし
(注) 日本植物病名目録p.542コルジリーネ(*Cordyline terminalis* Kunth)の植物名を一般的に使用されているセンネンボクに名称を変更し、これによりコルジリーネ炭疽病はセンネンボク炭疽病となる

ハグマノキ (スモークツリー) p.542
灰色かび病 haiiro-kabi-byo Gray mold
Botrytis cinerea Persoon: Fries
菅原 敬ら：北日本病虫研報 59:82, 2008

さび病 sabi-byo Rust
Pileolaria sp.
奈尾雅浩：四国植防 37:70, 2002
[備考] 接種試験の記述なし

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

(1) *Colletotrichum acutatum* Simmonds ex Simmonds

菅原 敬ら : 日植病報 74(1):51, 2008 ; 菅原 敬ら : 日植病報 75(2):119, 2009

(2) *Colletotrichum gloeosporioides* (Penzig) Penzig & Saccardo

奈尾雅浩 : 四国植防 39:1, 2004

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

Uncinula veniciferae P. Hennings

丹田誠之助 : 東農大農学集報 41(3):109, 1996

イヌツゲ p.544

枝枯病 edagare-byo Die back

Diatrype sp.

升屋勇人ら : 森林防疫 57(2):25, 2008

コシアブラ (金漆樹を追加する) p.546

キヅタ p.548

斑点細菌病 hanten-saikin-byo Bacterial leaf spot

Xanthomonas campestris pv. *hederae* (Arnaud 1920) Dye 1978

Suzuki, A. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 68(4):398, 2002

[備考] セイヨウキヅタに発生

(注) 文献追加

褐斑病 kappan-byo Leaf spot

(1) *Guignardia* sp.

竹内 純・堀江博道 : 関東病虫研報 45:143, 1998

[備考] セイヨウキヅタに発生

(2) *Phyllosticta concentrica* Saccardo

高野喜八郎 : 日植病報 70(1):72, 2004

[備考] 完全世代は*Guignardia* sp.であるが、(1)と同種かどうかは不明

フクリンアラリア p.549***

***Polyscias balfouriana* Bailey**

褐斑病 kappan-byo Brown leaf spot

Pseudocercospora polysciatis-pinnatae Braun & Mouchacca

Nakashima, C.: Mycoscience 45:67, 2004

[備考] 接種試験なし

タイワンモミジ Ming aralia p.549***

***Polyscias fruticosa* (L.) Harms**

斑点病 hanten-byo Alternaria leaf spot

Alternaria panax Whetzel

小野 剛：関東病虫研報 51:67, 2004

オオバアラリア ***Geraniumleaf aralia*** p.549***

***Polyscias guiffoylei* (Gull) L. H. Bailey**

斑点病 hanten-byo Alternaria leaf spot

Alternaria panax Whetzel

小野 剛：関東病虫研報 51:67, 2004

フカノキ (シェフレラ) p.549

***Schefflera arboricola* ‘Hong Kong’** (追加)

根腐病 negusare-byo Root rot

Pythium splendens Braum

久保田まや：関東病虫研報 47:97, 2000

[備考] *S. arboricola*に発生

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

***Colletotrichum gloeosporioides* (Penzig)** Penzig & Saccardo

鈴木幹彦ら：日植病報 76(1):65, 2010

[備考] シェフレラ

テーブルヤシ類 p.549

茎腐病 kukigusare-byo *Gliocladium blight*

***Gliocladium vermoesenii* (Biourge)** Thom

堀江博道・飯島 勉：関東病虫研報 51:81, 2004

(注) 文献追加

ケンチャヤシ ***Belmore sentry palm*** p.550***

***Howea belmoreana* (C. Moore & F. J. Muell.) Becc.**

疫病 eki-byo Phytophthora rot

Phytophthora nicotianae van Breda de Haan

竹内 純・堀江博道：日植病報 67(2):166, 2001

褐斑病 kappan-byo Cylindrocalidium brown leaf spot

Calonectria illicicola Boedijn & Reitsma (anamorph: *Cylindrocladium parasiticum* Crous, M. J. Wingf. & Alfenas)

竹内 純ら：日植病報 71(3):216, 2005 ; Hirooka, Y. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 74(1):66, 2008

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

Colletotrichum gloeosporioides (Penzig) Penzig & Saccardo

Nakamura, M. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 74(1):86, 2008 ; 料所聖児ら : 日植病報 74(1):28, 2008

フェニックス類 p.550

シンノウヤシ (フェニックス・ロベレニー) **Roebelen date palm**

Phoenix roebelenii O'Brien (=*Phoenix humilis* Royle var. *loureirii* Becc.)

ペスタロチア病 *Pestalotia*-byo Pestalotia disease

Pestalotiopsis palmarum (Cooke) Steyaert

竹内 純・堀江博道 : 日植病報 66(3):273, 2000

[備考] シンノウヤシ *P. roebelenii* に発生

褐紋病 katsumon-byo Phomopsis leaf spot

Phomopsis phoenicicola Traveso & Spessa

竹内 純・堀江博道 : 日植病報 65(6):657, 1999

[備考] シンノウヤシ *P. roebelenii* に発生

黒葉枯病 kuro-hagare-byo Lasiodiplodia leaf blight

Lasiodiplodia theobromae (Patouillard) Griffon & Maublanc

竹内 純・堀江博道 : 日植病報 66(3):273, 2000

[備考] シンノウヤシ *P. roebelenii* に発生

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

Colletotrichum gloeosporioides (Penzig) Penzig & Saccardo

竹内 純・堀江博道 : 日植病報 65(6):657, 1999

[備考] シンノウヤシ *P. roebelenii* に発生

ナンテン p.551

葉先枯病 hasakigare-byo Leaf tip blight

Phomopsis sp.

古川聰子ら : 日植病報 72(1):51, 2006

褐斑病 kappan-byo Leaf spot

Phyllosticta sp.

竹内 純・堀江博道 : 関東病虫研報 45:143, 1998

カンバ類 p.554

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

- (1) *Erysiphe ornata* (U. Braun) U. Braun & S. Takamatsu var. *ornata*
 丹田誠之助：日菌報 47(2):33, 2006
 [備考] 接種試験なし。シラカンバに発生
 (注) 病原追加。これにより(1)*Phyllactinia alni*は(2)に、以下一つずつ番号変更

シデ類 p.557

サワシバ *Carpinus cordata* Blume
 アカシデ *C. laxiflora* (Sieb. & Zucc.) Blume
 すす紋病 susumon-byo Sooty leaf spot
Cylindrosporella carpini (Libert) Hohenel [*Leptostroma* sp.]
 Kaneko, S. & Kobayashi, T.: Mycoscience 43(2):181, 2002
 [備考] サワシバ、アカシデ、イヌシデ、アサダに発生。
 (注) 病原学名変更。「病原菌の所属は検討を要す」は削除

ハシバミ類 p.558

ツノハシバミ *Corylus heterophylla* Fisher
 すす紋病 susumon-byo Sooty leaf spot
Cylindrosporella coryli (Fuckel) von Arx [*Leptostroma* sp.]
 Kaneko, S. & Kobayashi, T.: Mycoscience 43(2):181, 2002
 [備考] ハシバミ、ツノハシバミに発生
 (注) 病原学名変更

アサダ p.559

すす紋病 susumon-byo Sooty leaf spot
Cylindrosporella carpini (Libert) Hohenel
 Kaneko, S. & Kobayashi, T.: Mycoscience 43(2):181, 2002

パキラ **Guiana-chestnut** p.559***
Pachira aquatica Aubl.
 茎腐病 kukigusare-byo Stem rot
Pythium splendens Braun
 Tojo, M. et al.: Plant Disease 88(1):84, 2003 ; 黒田克利ら：日植病報 70(3):215, 2004

フッキソウ p.560

褐斑病 kappan-byo Leaf spot
Phyllosticta sp.
 竹内 純・堀江博道：関東病虫研報 45:143, 1998

ツクバネウツギ p.561
 うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

(2) *Oidium* sp.

丹田誠之助：東農大農学集報 42(3):173, 1997

[備考] ハナツクバネウツギ *A. grandiflora* (Andr.) Rehderに発生

(注) 病原および宿主追加。これにより *Microsphaera abeliae* は(1)となる

ウグイスカグラ

p.561

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

(2) *Microsphaera lonicerae-ramosissimae* Tanda

Tanda, S.: Mycoscience 41(2):155, 2000

[備考] コウグイスカグラ *L. ramosissima* Franch. & Savat.に発生

(注) 病原および宿主追加。これにより (2)*Microsphaera miurae* は(3)となる

スイカズラ

p.562

葉脈黄化病* yomyaku-oka-byo Yellow vein

Tobacco leaf curl Japan virus

Ogawa, T. et al.: Virus Res. 137: 235, 2008

[備考] DNA βの存在により、病徵は激しくなる

葉脈黄化モザイク病* yomyaku-oka-mosaic-byo Yellow vein mosaic

Honeysuckle yellow vein mosaic virus スイカズラ葉脈黄化モザイクウイルス

Ogawa, T. et al.: Virus Res. 137: 235, 2008 ; 池上正人：植物防疫61:41, 2007

[備考] DNA βの存在により、病徵は激しくなる

オニヒヨウタンボク

p.562***

Lonicera vidalii Franck & Savat

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

Microsphaera miurae Braun

丹田誠之助：東農大農学集報 41(3):109, 1996

ガマズミ

p.563

赤衣病 akagoromo-byo Pink disease

Erythricium salmonicolor (Berkeley & Broome) Burdsall [*Corticium salmonicolor* Berkeley & Broome]

川島祐介：群馬林試研報 1:20, 1992 ; Nomi, C. et al.: J. Agr. Sci., Tokyo Univ. Agr.

44(4):252, 2000

[備考] ハクサンボク *V. japonicum*に発生

シンフォリカルボス

p.563***

Symporicarpos albus (L.) S. F. Blake

灰色かび病 haiiro-kabi-byo Gray mold

Botrytis cinerea Persoon: Fries
菅原 敬ら : 日植病報 75(3):189, 2009

実腐病 migusare-byo Fruit rot
Alternaria alternata (Fries) Keissler
菅原 敬ら : 日植病報 75(3):189, 2009
[備考] 日本植物病理学会報訂正記事(76(1):80, 2010)による

炭疽病 tanso-byo Anthacnose
(1) *Colletotrichum acutatum* Simmonds ex Simmonds
(2) *Glomerella cingulata* (Stoneman) Spaulding & Schrenk
菅原 敬ら : 日植病報 75(3):189, 2009

ハコネウツギ p.564
うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew
(2) *Erysiphe weigelae* Chen & Luo
丹田誠之助 : 東農大農学集報 47(4):290, 2003
[備考] 才オベニウツギ *W. florida* (Bunge) de Candolle に発生
(注) 病原および宿主追加。これにより(2)*Microsphaera alni* は(3)、(3)*Uncinula lata* は(4)となる

ニシキギ p.565
赤衣病 akagoromo-byo Pink disease
Erythricium salmonicolor (Berkeley & Broome) Burdsall [*Corticium salmonicolor* Berkeley & Broome]
川島祐介 : 群馬林試研報 1:20, 1992 ; Nomi, C. et al.: J. Agr. Sci., Tokyo Univ. Agr. 44(4):255, 2000
[備考] コマユミ *E. alatus* f. *ciliatodentatus* に発生

ハコネウツギ p.564
うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew
(1) *Erysiphe dervilleae* Miyabe ex Braun
(2) *Erysiphe weigelae* Chen & Luo
佐藤幸生ら : 日植病報 66(3):304, 2000
(注) 病原・文献追加。これにより日本植物病名目録 p.565の本病病原菌の番号は変更

タニウツギ p.565***
Weigela hortensis (Siebold & Zucc.) K. Koch
うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew
(1) *Erysiphe diervillae* Miyabe ex Braun [*Erysiphe pisi* DC.]

(2) *Erysiphe weigela* Chen & Luoe

佐藤幸生ら：日植病報 66(3):304, 2000

[備考] (1) *E. diervillae*と(2) *E. weigelae*は同種との報告もある（佐藤幸生ら：日植病報 66(3):304, 2000）

マユミ

p.567

赤衣病 akagoromo-byo Pink disease

Erythricium salmonicolor (Berkeley & Broome) Burdsall [*Corticium salmonicolor* Berkeley & Broome]

川島祐介：群馬林試研報 1:20, 1992 ; Nomi, C. et al.: J. Agr. Sci., Tokyo Univ. Agr. 44(4):255, 2000

[備考] ツリバナ*E. exyphyllus*に発生

カツラ

p.567

斑点細菌病 hanten-saikin-byo Bacterial leaf spot

Pseudomonas syringae van Hall 1902

小林真樹ら：日植病報 71(1):38, 2005 ; 小林真樹ら：日植病報 71(1):46, 2006

[備考] 病原細菌のpathovarは未確定

赤衣病 akagoromo-byo Pink disease

Erythricium salmonicolor (Berkeley & Broome) Burdsall [*Corticium salmonicolor* Berkeley & Broome]

Nomi, C. et al.: J. Agr. Sci., Tokyo Univ. Agr. 44(4):252, 2000

コニエラ葉枯病 *Coniella-hagare-byo* Coniella leaf blight

Coniella castaneicola (Ellis & Everhart) B. Sutton

矢口行雄ら：日植病報 73(3):177, 2007

センリョウ

p.568

疫病 eki-byo Phytophthora rot

Phytophthora nemorosa Hansen & Reeser

海老原克介ら：日植病報 69(1):39, 2003 ; 植松清次ら：日植病報 73(3):180, 2007

輪紋病 rimmon-byo Leaf spot

Phoma sp.

塚本俊秀：日植病報 73(3):178, 2007

白絹病 shirakinu-byo Southern blight

Sclerotium rolfsii Saccardo

海老原克介ら：日植病報 69(1):39, 2003

白紋羽病 shiro-mompa-byo White root rot

Rosellinia nacatrix Prillieux

海老原克介ら：日植病報 69(1):39, 2003

(注) 文献追加

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

Colletotrichum sp.

塚本俊秀：日植病報 73(3):178, 2007

モモタマナ（コバテシイ） p.569

円星病 maruhoshi-byo Circular leaf spot

Pseudocercospora catappae (Hennings) Liu & Guo

Nakashima, C.: Mycoscience 45:67, 2004

[備考] 接種試験なし

ペスタロチア病 *Pestalotia*-byo Pestalotia disease

Pestalotiopsis toxica (Ellis & Everhart) X. A. Sun & Q. X. Ge

Kobayashi, T. & Okamoto, T.: J. Agr. Sci., Tokyo Univ. Agr. 48 (3):89, 2003

ミズキ類 p.570

枝黒枯病 eda-kurogare-byo Black shoot blight

Fusicoccum aesculi Corda

高橋幸吉ら：樹木医学研究 8(1):42, 2004；高橋幸吉ら：樹木医学研究 9(1):23, 2005

[備考] ミズキ(2004)、ハナミズキ(2005)に発生

ハナイカダ p.572

斑点病 hanten-byo Leaf spot

Pseudocercospora izuohshimensis Nakashima, Horie & Kobayashi

Nakashima, C. et al.: Mycoscience 45:49, 2004

(注) 病原*Cercospora* sp.の所属決定。これにより、日本植物病名目録 p.572

の本病病原学名*Cercospora* sp.は削除する

ホルトノキ p.573

萎黄病 io-byo Yellows

Phytoplasma ファイトプラズマ

河辺祐嗣ら：日植病報 65(6):654, 1999

[備考] 戻し接種試験なし

ドウダンツツジ p.574

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

Colletotrichum gloeosporioides (Penzig) Penzig & Saccardo

原田美貴子ら : 日植病報 71(1):33, 2005 ; Harada, M. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 74(4): 341 2008

[備考] サラサドウダン(*E. campanulatus*)に発生

カルミア (アメリカシャクナゲ) p.574

苗立枯病 nae-tachigare-byo Damping-off

Pythium undulatum H. E. Petersen

築尾嘉章ら : 日植病報 70(1):47, 2004

エリカ類 p.574***

Erica spp.

スズランエリカ *Erica formosa* Thunb. White heath

根腐病 negusare-byo Root rot

Pythium helicoides Drechsler

舟久保太一ら : 日植病報 75(3):186, 2009

[備考] スズランエリカに発生

イワナンテン p.575

褐斑病 kappan-byo Leaf spot

Guignardia sp.

竹内 純・堀江博道 : 関東病虫研報 45:143, 1998

[備考] アメリカイワナンテン(*L. keiskei*)に発生

ツツジ類 p.576

平もち病 hiramochi-byo Exobasidium leaf blister

(2) *Exobasidium dubium* Raciborski [*E. magnusii* Woronichin]

Nagao, H. et al.: Mycoscience 44(1):1, 2003

[備考] ヨドカワツツジ(*R. yedoense*)に発生

(注) 病原学名変更 (Nannfeldt 1981は本病原の異名としている)

(4)*Exobasidium miyabei* Nagao, Akimoto et Kishi

Nagao, H. et al.: Mycoscience 44(1):1, 2003

[備考] エゾムラサキツツジ(*R. dauricum* L.)に発生

(注) 病原追加。これにより、日本植物病名目録p.576平もち病 (2)*Exobasidium kawanensis* eは(3)、(4)*Exobasidium yosringai*は(5)、(5)*Exobasidium* sp.は(6)となる。また、同目録(3)*E. magnusii*の備考欄「調査を要する」を削除する

モニリア病 *Monilia*-byo Monilia

Monilia sp.

一橋裕香子ら：日植病報 69(1):27, 2003

[備考] ヤマツツジ *R. kaempferi* に発生

そうか病 soka-byo Anthracnose leaf spot

Sphaceloma sp.

梶谷裕二：日植病報 70(3):224, 2004

[備考] クルメツツジに発生

てんぐ巣病 tengusu-byō Witche's broom

(1) *Exobasidium nobeyamense* Nagao & Ezuka

Nagao, H. et al.: Mycoscience 42(6):549, 2001

[備考] トウゴクミツバツツジ *R. wadanum* Makino に発生

(注) 病原追加。これにより *Exobasidium pentasprium* は(2)となる

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

(2) *Microsphaera izuensis* Nomura f. *breviseta* Tanda

丹田誠之助：東農大農学集報 47(4):290, 2003

[備考] キリシマツツジ *R. obtusum* (Lindl.) Planch. var. *obtusum* に発生

(注) 病原追加。これにより (2)*Microsphaera* sp. は(3)に、以下(5)*Phyllactinia* sp. まで括弧内番号が一つずつ換わる

シャクナゲ類

p.579

褐斑病 kappan-byo Corynespora leaf spot

Corynespora cassiicola (Berkely & Curtis) Wei

築尾嘉章ら：日植病報 68(1):79, 2002

[備考] セイヨウシャクナゲ *Rhododendron* sp. に発生

粉もち病 konamochi-byo Exobasidium leaf blight

(1) *Exobasidium caucasicum* Woron

Nagao, H. et al.: Mycoscience 45(2):85, 2004

[備考] キバナシャクナゲ *R. aureum* に発生

(注) 文献追加

(2) *Exobasidium shiraianum* Hennigs emend Nagao

Nagao, H. et al.: Mycoscience 45(2):85, 2004

[備考] アズマシャクナゲ *R. degronianum* に発生

(注) 病原追加

(3) *Exobasidium woronichinii* Nagao

Nagao, H. et al.: Mycoscience 45(2):85, 2004

[備考] ハクサンシャクナゲ *R. brachycarpum* に発生

(注) 病原追加

苗立枯病 nae-tachigare-byo Rhododendron damping-off

Pythium oedochilum Drechsler

築尾嘉章ら：日植病報 69(3):272, 2003

[備考] セイヨウシャクナゲに発生

先枯病 sakigare-byo Twig blight

Synnemapestalooides rhododendri T. Handa & Y. Harada

半田智一・原田幸雄：日植病報 69(1):27, 2003 ; Handa, T. et al.: Mycoscience 45(2):137, 2004

[備考] ハクサンシャクナゲ *R. brachycarpum* D. Donに発生

シンネマペスタロイデス枝枯病 *Synnemapestalooides-edagare-byo*

Synnemapestalooides twig blight

Synnemapestalooides rhododendri T. Handa & Y. Harada

Handa, T. et al.: Mycoscience 45:137, 2004

[備考] ハクサンシャクナゲ *R. brachycarpum* D. Donに発生

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

Oidium sp.

高松 進ら：日植病報 68(1):78, 2002

[備考] *Pseudoidium* 亜属。セイヨウシャクナゲ *Rhododendron* spp.に発生。接種試験なし

スノキ類

p.580

平もち病 hiramochi-byo Leaf blister

(2) *Exobasidium kishianum* Nagao & Ezuka

Nagao, H. et al.: Mycoscience 47(5):277, 2006

[備考] ウスノキに発生

(注) 病原学名変更。これにより日本植物病名目録 p.580 本病 (2) *Exobasidium* sp.は削除する

褐斑病 kappan-byo Corynespora leaf spot

Corynespora cassiicola (Berkely & M. A. Curtis) C. T. Wei

梶谷裕二ら：日植病報 75(3):190, 2009

[備考] ナツハゼに発生

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

(1) *Erysiphe vaccinii* Schweinitz

丹田誠之助：日菌報 47(2):33, 2006

[備考] 接種試験なし。ナツハゼ *V. oldhamii* Miquel に発生

(注) 病原追加

(3) *Podosphaera myrtillina* (Schubert: Fries) Kunze var. *myrtillina*

丹田誠之助：東農大農学集報 45(2):122, 2000

[備考] クロウスゴ *V. ovalifolium* J. E. Smith に発生

裏白もち病 urajiro-mochi-byo Exobasidium leaf blight

Exobasidium inconspicuum Nagao & Ezuka

長尾英幸ら：日植病報 68(1):58, 2002 : Nagao, H. et al.: Mycoscience 47(5):277, 2006

[備考] ヒメウスノキ *Vaccinium yatabei*, ウスノキ *V. hirtum* var. *pubscens* に発生。

接種試験はなし

シナノキ類

p.584

毛さび病 kesabi-byo Rust

Cronartium orientale Kaneko [*Cronartium quercum* (Berkeley) Miyake ex Shirai]

Kaneko, S.: Mycoscience 41(2):115, 2000

ブナ類

p.585

毛さび病 kesabi-byo Rust

Cronartium orientale Kaneko [*Cronartium quercum* (Berkeley) Miyake ex Shirai]

Kaneko, S.: Mycoscience 41(2):115, 2000

(注) 病原学名変更

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

(1) *Erysiphe wadae* S. Takamatsu & Y. Sato

Takamatsu, S. et al.: Mycoscience 44(3):165, 2003

[備考] 接種試験なし

(注) 病原追加。これにより(1) *Phyllactinia corylea* は(2)に、(2) *Uncinula curvispora* は(3)となる

カシ類

p.587

コルクガシ *Q. suber* L.

枝枯細菌病 edagare-saikin-byo Bacterial shoot blight

Xanthomonas campestris (Pammel 1895) Dowson 1939

石原 誠ら：日植病報 62:304, 1996 ; 石原 誠ら：日植病報 66(2):130, 2000

[備考] シラカシに発生

(注) 病原の同定

こぶ病 kobu-byo Bacterial gall

Pseudomonas syringae van Hall 1902

小林真樹ら：日植病報 68(1):64, 2002

[備考] ウバメカシ *Q. phillyraeoides* に発生

毛さび病 kesabi-byo Rust

Cronartium orientale Kaneko [*Cronartium quercum* (Berkeley) Miyake ex Shirai]

Kaneko, S.: Mycoscience 41(2):115, 2000

(注) 病原学名変更

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

(3) *Microsphaera alphitoides* Griffon & Maublanc

堀江博道ら : 日植病報 65(6):657, 1999

[備考] コルクガシに発生

(注) 文献追加

ナラ類

p.591

赤衣病 akagoromo-byo Pink disease

Erythricium salmonicolor (Berkeley & Broome) Burdsall [*Corticium salmonicolor* Berkeley & Broome]

川島祐介 : 群馬林試研報 1:20, 1992 ; Nomi, C. et al.: J. Agr. Sci., Tokyo Univ. Agr. 44(4):255, 2000

[備考] コナラ (*Q. serrata*) に発生

灰斑病 haihan-byo Gray leaf spot

Discula sp.

矢口行雄ら : 第115回林学大会学術講演集 52, 2004

[備考] コナラに発生

萎凋病 icho-byo Raffaelea wilt, Japanese oak wilt

Raffaelea quercivora Kubono & Shin. Ito

伊藤進一郎ら : 日植病報 69(1):61, 2003 ; Kubono, T. and Ito, S. : Mycoscience 43 : 255, 2002

[備考] ミズナラおよびコナラの集団枯死を引き起こす

毛さび病 kesabi-byo Rust

Cronartium orientale Kaneko [*Cronartium quercum* (Berkeley) Miyake ex Shirai]

Kaneko, S.: Mycoscience 41(2):115, 2000

(注) 病原学名変更

白粒葉枯病 shirotsubu-hagare-byo Frosty mildew

Redheadia quercus Y. Suto & Suyama

[不完全世代 *Mycopappus quercus* Suto & M. Kawai]

周藤靖雄：日林論 104:617, 1993 ; Suto, Y. & Kawai, M.: Mycoscience 41:55, 2000 ;
Suto, Y. & Suyama, H.: Mycoscience 46:227, 2005
[備考] クヌギに発生

フクギ p.596

白斑病 hakuhan-byo White leaf spot

Phyllosticta garciniae (I. Hino & Katumoto) Motohashi, Tak. Kobayashi & Y. Ono

Motohashi, K. et al.: Mycoscience 51(2):93, 2010

[備考] 接種試験なし

キンシバイ類 p.596

Hypericum spp.

ヒペリカム・アンドロサエマム *H. androsaemum*

セイヨウキンシバイ *H. calycinum* L.

キンシバイ *H. patulum* Thunb.

さび病 sabi-byo Rust

(1) *Melampsora hypericorum* (de Candolle) J. Schröter

堀江博道ら：関東病虫研報 50:117, 2003 ; 堀江博道ら：関東病虫研報：51:87, 2004

[備考] セイヨウキンシバイ、*H. androsaemum*に発生

(注) 日本植物病名目録の植物名をキンシバイからキンシバイ類に変更する。

Melampsora sp.は(2)となる

ビヨウヤナギ p.596

Hypericum salicifolium Sieb. & Zucc. (= *H. chinense* L. var. *salicifolium* Y. Kimura)

さび病 sabi-byo Rust

Melampsora hypericorum (de Candolle) J. Schröter

堀江博道ら：関東病虫研報 51:87, 2004

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

Oidium sp.

丹田誠之助：東農大農学集報 42(4):253, 1999

マンサク p.597

葉枯病 hagare-byo Leaf blight

Phyllosticta hamamelidis Peck

本橋慶一ら：樹木医研 12:144, 2008

フウ p.597

すす色斑点病 susuiro-hanten-byo Sooty leaf spot

Pseudocercospora neoliquidambaris Nakashima & Kobayashi

Kobayashi, T. et al.: Mycoscience 43:219, 2002

(注) 病原学名の変更。これにより日本植物病名目録 p.597の本病病原学名は削除する

トチノキ p.598

赤衣病 akagoromo-byo Pink disease

Erythricium salmonicolor (Berkeley & Broome) Burdsall [*Corticium salmonicolor* Berkeley & Broome]

川島祐介：群馬林試研報 1:20, 1992 ; Nomi, C. et al.: J. Agr. Sci., Tokyo Univ. Agr. 44(4):255, 2000

シキミ p.598

黒しみ斑点病 kuroshimi-hanten-byo Black smear leaf spot

Mycosphaerella sp.

松浦 明ら：日植病報 66(2):93, 2000

輪紋病 rimmon-byo Ring spot

フシダニ

山下修一：植物防疫 57(9):13, 2003

[備考] 病原フシダニ（3タイプ）の種は未同定

ノグルミ p.599

白粒葉枯病 shirotsubu-hagare-byo Frosty mildew

Redheadia sp. (anamorph: *Mycopappus* sp.)

周藤靖雄：日植病報 74(3):185, 2008

[備考] *Mycopappus* sp.のテレオモルフの確認

サワグルミ p.599

赤衣病 akagoromo-byo Pink disease

Erythricium salmonicolor (Berkeley & Broome) Burdsall [*Corticium salmonicolor* Berkeley & Broome]

川島祐介：群馬林試研報 1:20, 1992

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

(1) *Microsphaera juglandis* Golovin

丹田誠之助：東農大農学集報 41(3):109, 1996

[備考] コーカサスサワグルミ *P. fraxinifolia* Spach に発生

(注) 文献および宿主追加

ヤブニッケイ（クロダモ） p.599

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

Colletotrichum gloeosporioides (Penzig) Penzig & Saccardo

料所聖児ら：日植病報 74(1):28, 2008

ゲッケイジュ

p.600

赤衣病 akagoromo-byo Pink disease

Erythricium salmonicolor (Berkeley & Broome) Burdsall [*Corticium salmonicolor* Berkeley & Broome]

川島祐介：群馬林試研報 1:20, 1992

シロダモ

p.602

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

Colletotrichum gloeosporioides (Penzig) Penzig & Saccardo

料所聖児ら：日植病報 74(1):28, 2008

アカシア類

p.603

カマバアカシア *A. auriculiformis* A. Cunn. ex Benth.

アカシア・マンギューム *A. mangium* Willd.

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

Oidium sp.

高松 進ら：日植病報 68(1):78, 2002

[備考] *Pseudoidium* 亜属。カマバアカシア、アカシア・マンギュームに発生。

接種試験なし

ハナズオウ

p.605

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

Oidium sp.

丹田誠之助：東農大農学集報 43(3):173, 1997

サイカチ

p.606

*灰色こうやく病 haiiro-koyaku-byo Gray flet disease (膏薬病)

Septobasidium bogoriense Patouillard [*Septobasidium pedicellatum* (Schweinitz) Patouillard

堀 正太郎：病蟲害雑誌 5(5):333, 1918 (大 7)

[備考] 病原菌の形態、接種試験の記述なし

キングサリ

p.606

根腐病 negusare-byo Root rot

Cylindrocladium pacificum J. C. Kang, Crous & C. L. Schoch

佐野真知子ら：日植病報 74(3):183, 2008

イヌエンジュ

p.608

がんしゅ病 ganshu-byo Bacterial canker

Pseudomonas syringae van Hall 1902

坂本泰明：森林防疫 49(3):54, 2000

(注) 文献追加

ナギイカダ

p.610

ルスカス（イカダバ尔斯カス） *Ruscus hypoglossum* L.

葉先枯病 hasakigare-byo Leaf tip blight

Cladosporium cladosporioides (Fries) de Vires

竹内 純ら：関東病虫研報 48:69, 2001

[備考] ルスカス（イカダバ尔斯カス）に発生

灰色かび病 hairo-kabi-byo Gray mold

Botrytis cinerea Persoon: Fries

竹内 純ら：関東病虫研報 48:69, 2001

[備考] ルスカス（イカダバ尔斯カス）に発生

褐点病 katten-byo Brown leaf spot

Rhizopus sp.

星 秀男・堀江博道：関東病虫研報 51:93, 2004

[備考] ルスカス（イカダバ尔斯カス）に発生

こうじかび病 kojikabi-byo Aspergillus blight

Aspergillus niger van Tieghem

竹内 純ら：日植病報 66(2):92, 2000

ユリノキ（ハンテンボク）

p.611

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

Erysiphe liriodendri Schwein.

荒木郁充・白石嘉朗：日植病報 74(3):179, 2008

[備考] 接種試験なし

モクレン

p.612

菌核病 kinkaku-byo Petal blight

Ciborinia sp.

萩原 廣ら：日植病報 65(6):678, 1999

[備考] 接種試験なし

モミジアオイ

p.614***

Hibiscus coccineus (Mdedicus) Walter

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

Oidium sp.

丹田誠之助：東農大農学集報 42(3):173, 1997

アブチロン類

p.614***

疫病 eki-byo

Phytophthora nicotianae van Breda de Haan

植松清次ら：関東病虫研報 55:191, 2008

フヨウ (芙蓉)

p.614

灰色こうやく病 hairo-koyaku-byo Gray felt disease

Septobasidium bogoriense Patouillard

小林享夫ら：森林防疫 43(6):106, 1994

[備考] 病原菌の形態および接種試験の記述なし

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

(2) *Sphaerotheca hibiscicola* Zhao

丹田誠之助：東農大農学集報 42(3):173, 1997

[備考] スイフヨウ *H. mutabilis* L. f. *vesicolor* Makinoに発生

(注) 病原および宿主追加。これにより *Sphaerotheca fuliginea* は(1)となる

ブツソウゲ

p.614***

Hibiscus rosa-sinensis L.

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

Colletotrichum capsici (Sydow) Butler & Bisby

矢口行雄ら：樹木医学研究 4(2):81, 2000

オオハマボウ

p.614

黒やに病 kuroyani-byo Tar spot

Phyllachora minuta Hennings

Kobayashi, T. et al.: Mycoscience 44(6):473, 2003

(注) 文献追加。*Phyllachora*属菌は培養できないので、日本植物病名目録p.614の本病の備考欄を削除する

ハイビスカス

p.614

黒斑病 kokuhan-byo Alternaria leaf spot

Alternaria sp.

伊藤陽子・月星隆雄：日植病報 71(3):215, 2005

ノボタン

p.615

円星病 maruhoshi-byo Circular leaf spot

Pseudocercospora melastomobia (Yomamoto) Deighton

Kobayashi, T. et al.: Mycoscience 43:219, 2002

(注) 病原学名変更。これにより日本植物病名目録 p.615 の本病病原学名は削除する

センダン (梅檀、棟) p.615

インドゴムノキ p.616

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

(1) *Colletotrichum acutatum* Simmonds ex Simmonds

(2) *Colletotrichum gloeosporioides* (Penzig) Penzig & Saccardo

矢口行雄ら : 日植病報 72(1):51, 2006

オヒア Ohia p.618***

Metrosideros polymorpha Gaudich.

さび病 sabi-byo Rust

Puccinia psidii G. Winter

川西剛史ら : 日植病報 74(3):179, 2008 ; Kawanishi, T. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 75(6): 428, 2009

カラタチバナ p.618***

Ardisia crispa (Thunb.) DC.

疫病 eki-byo Phytophthora rot

Phytophthora nicotianae van Breda de Haan

田中（三輪）千華ら : 日植病報 73(3):180, 2007

ユーカリ類 p.618

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

Colletotrichum gloeosporioides (Penzig) Penzig & Saccardo

料所聖児ら : 日植病報 74(1):28, 2008

[備考] ロブスターユーカリ (*E. robusta*)に発生

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

(1) *Oidium eucalypti-globuli* Tanda

(3) *Sphaerotheca aphanis* (Wallroth) Braun var. *aphanis*

Tanda, S. & Hirose, T.: Jour. Agri. Sci., Tokyo Univ. Agric. 47(4):274, 2003

[備考] ユーカリノキ *E. globulus* Labil.に発生

(注) 病原追加。これにより *Oidium* sp.は(2)となる

- ヒツバタゴ p.619
斑点病 hanten-byo
Pseudocercospora chionanthicola Nakashima & Kobayashi
 Nakashima, C. et al.: Mycoscience 43:95, 2002
 [備考]菌の所属を再検討した結果、*Pseudocercospora chionanthi-retusi* (Togashi & Katsuki) Nishijima, Nakashima & Kobayashi (Nakashima et al. 1999)としたが、本学名は *P. chionanthi-retusi* Goh & Hsieh in Hsieh and Goh (1990) のlater homonym となるため新名を与えた。しかしながら、両者は同一種であるとして *P. chionanthi-retusi* Goh & Hsiehを与える判断もある
 (注) 病原学名の変更。これにより日本植物病名目録 p.619の本病病原学名は削除する
- レンギョ (連翹) p.619
- トネリコ類 p.620
赤衣病 akagoromo-byo Pink disease
Erythricium salmonicolor (Berkeley & Broome) Burdsall [*Corticium salmonicolor* Berkeley & Broome]
 川島祐介：群馬林試研報 1:20, 1992 ; Nomi, C. et al.: J. Agr. Sci., Tokyo Univ. Agr. 44(4):255, 2000
 [備考] アメリカトネリコ *F. americana*, トネリコ *F. japonica*
 (注) 文献および宿主追加
- ソケイ (ジャスミン) p.621
炭疽病 tanso-byo Anthracnose
Colletotrichum gloeosporioides (Penzig) Penzig & Saccardo
 梶谷裕二ら：日植病報 75(3):186, 2009
 [備考] ハゴロモジャスミン(*Jasminum polyanthum*)に発生
- ネズミモチ類 p.621
トウネズミモチ *L. luscidum* Ait.
斑点細菌病 hanten-saikin-byo Bacterial leaf spot
Pseudomonas syringae van Hall 1902
 小林真樹ら：日植病報 72(1):46, 2006
 [備考] 病原細菌のpathovarは未確定。トウネズミモチに発生
- ライラック p.623
赤衣病 akagoromo-byo Pink disease
Erythricium salmonicolor (Berkeley & Broome) Burdsall [*Corticium salmonicolor* Berkeley & Broome]
 Nomi, C. et al.: J. Agr. Sci., Tokyo Univ. Agr. 44(4):255, 2000

[備考] ハシドイ *S. reticulate*

(注) 文献および宿主追加

ボタン p.624

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

Erysyphe paeoniae R.Y. Zheng & G. Q. Chen

山本 淳・高松 進：日植病報 76(1):67, 2010

タコノキ類 p.625

Pandanus spp. (追加)

果実腐敗病 kajitsu-fuhai-byo Fruit rot

(1) *Colletotrichum gloeosporioides* (Penzig) Penzig & Saccardo

弓木彩子ら：日植病報 72(4):203, 2006

[備考] タコノキに発生

(2) *Haematonectria hematococca* Berkeley & Broome) Amuels & Nirenberg

弓木彩子ら：日植病報 72(4):203, 2006

[備考] タコノキに発生

(3) *Lasiodiplodia theobromae* (Patouillard) Griffon & Maublanc

弓木彩子ら：日植病報 72(4):203, 2006

[備考] タコノキ、シマタコノキに発生

(4) *Microsphaeropsis* sp.

弓木彩子ら：日植病報 72(4):203, 2006

[備考] ヒヨウタンタコノキに発生

(5) *Pestalotiopsis gracilis* (Kelbhan) Steyaert

弓木彩子ら：日植病報 72(4):203, 2006

[備考] タコノキに発生

スズカケノキ類 p.625

モミジバスズカケノキ (プラタナス) *Platanus x hispanica* Muench.

モミジバスズカケノキ *P. x acerifolia* (Aiton) Willd.

アメリカスズカケノキ *P. occidentalis* L.

スズカケノキ *P. orientalis* L.

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

(1) *Microsphaera platani* Howe

丹田誠之助：東農大農学集報 43(4):253, 1999

(2) *Oidium* sp.

堀江博道ら：関東病虫研報 49:65, 2002

[備考] *Erysiphe polygoni*型。モミジバスズカケノキ*P. x acerifolia* (Alt.) Wild.、アメリカスズカケノキ*P. occidentalis* L.、スズカケノキ*P. orientalis* L.に発生

ザイフリボク p.627

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

(2) *Podosphaera clandestina* (Wallroth: Fries) Léveillé var. *clandestina*

丹田誠之助：東農大農学集報 47(4):290, 2003

[備考] アメリカザイフリボク *A. canadensis* (Linnaeus) Medik.に発生

(注) 病原および宿主追加。これにより(2)*Podosphaera longiseta*は(3)になる

ボケ p.627

黒点病 kokuten-byo Fruit spot

Mycosphaerella pomi (Passerini) Lindau

荒井茂充：日植病報 75(1):57, 2009

サンザシ、セイヨウサンザシ p.628

クロミサンザシ

C. chlorosarca Maxim.

白粒葉枯病 shirotsubu-hagare-byo Frosty mildew

Mycopappus alni (Dearness & Bartholomew) Redhead & G. P. White

Takahashi, Y. et al.: Mycoscience 47(6):388, 2006

[備考] 接種試験なし。クロミサンザシに発生

エキソコルダ p.628

バイカシモツケ *E. racemosa* Rehder

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

Oidium sp.

丹田誠之助：東農大農学集報 42(3): 173, 1997

[備考] バイカシモツケに発生

ズミ p.629

角斑病 kakuhan-byo Angular leaf spot

Pseudocercospora mali (Ellis & Everhart) Deighton

Nakashima, C.: Mycoscience 45:67, 2004

[備考] 接種試験なし

サクラ類 p.631

こぶ病 kobu-byo Bacterial gall

Pseudomonas syringae pv. *cerasicola* Kamiunten, Nakao & Oshida 2000

Kamiunten, H. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 66(3):219, 2000

(注) 日本植物病名目録p.631の本病病原名を変更、備考欄を削除。文献追加

赤衣病 akagoromo-byo Pink disease

Erythricium salmonicolor (Berkeley & Broome) Burdsall [*Corticium salmonicolor* Berkeley & Broome]

川島祐介：群馬林試研報 1:20, 1992 ; Nomi, C. et al.: J. Agr. Sci., Tokyo Univ. Agr. 44(4):255, 2000

[備考] セイヨウバクチノキ *P. laurocerasus* L. に発生

葉腐病 hagusare-byo Leaf blight

Monilinia ssiori Y. Harada, M. Sasaki & T. Sano

[Anamorph: *Monilia ssiori* Y. Harada, M. Sasaki & T. Sano]

原田幸雄・佐々木將人：日植病報 56:112, 1990 ; Harada, Y. et al.: Mycoscience 46:376, 2005

[備考] シウリザクラ *P. ssiori* Fr. Schm. に発生

(注) 病原学名変更。これにより日本植物病名目録p.632本病病原 *Monilia* sp. を削除する

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

(3) *Podosphaera* sp.

丹田誠之助：東農大農学集報 45(2):122, 2000

[備考] チョウジサクラ *P. apetala* (Sieb. & Zucc.) Fr. & Sav. に発生

(注) 病原追加。

幼果菌核病 yoka-kinkaku-byo Young fruit rot

(2) *Monilinia ssiori* Y. Harada, M. Sasaki & T. Sano

原田幸雄・佐々木將人：日植病報 53(3):378, 1987 ; 原田幸雄・佐々木將人：日植病報 56(1):112, 1990 ; Harada, Y. et al.: Mycoscience 46:376, 2005

[備考] シウリザ克拉 *P. ssiori* Fr. Schm. に発生

(注) 病原追加。

カナメモチ

p.630

赤衣病 akagoromo-byo Pink disease

Erythricium salmonicolor (Berkeley & Broome) Burdsall [*Corticium salmonicolor* Berkeley & Broome]

川島祐介：群馬林試研報 1:20, 1992 ; Nomi, C. et al.: J. Agr. Sci., Tokyo Univ. Agr. 44(4):255, 2000

[備考] オオカナメモチ *P. serrulata* に発生

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

Oidium sp.

堀江博道ら：日植病報 65(6):657, 1999

[備考] 発芽管の形態は *Sphaerotheca pannosa*型。ベニカナメモチに発生

(注) 文献追加

シャリンバイ

p.636

こぶ病 kobu-byo Bacterial gall

Pseudomonas syringae pv. *rhopiolaepidis* Ogimi, Kawano, Higuchi & Takikawa 1992

大宜見朝栄ら：日林誌 74(4):308, 1992

紫斑病 shihan-byo Violet leaf spot

Pseudocercospora violamaculans (Fukui) Kobayashi & Nakashima

Kobayashi, T. et al.: Mycoscience 43:219, 2002

(注) 病原学名変更。これにより日本植物病名目録 p.636の本病病原学名は削除する

そうか病 soka-byo Anthracnose leaf spot

Sphaceloma sp.

梶谷裕二：日植病報 72(4):208, 2006

バラ類

p.636

疫病 eki-byo Phytophthora rot

(3) *Phytophthora* sp.

渡辺秀樹ら：日植病報 69(3):273, 2003

[備考] 病原は*P. citricola*のグレードに属する。ミニバラ *Rosa* sp.に発生

(注) 病原追加。これにより *Phytophthora megasperma*は(1)となる

ばら色かび病 barairo-kabi-byo Pink-mold-rot

Trichothecium roseum (Persoon: Fries) Link

石川成寿・中山喜一：日植病報 66(2):92, 2000

葉枯病 hagare-byo Leaf blight

(1) *Hainesia lythri* (Desmazieres) Höhn

高野喜八郎：日植病報 71(3):215, 2005

[備考] バラ *R. hybrida* Hort.に発生

(2) *Pseudocercospora puderi* Deighton

Nakashima, C.: Mycoscience 45:67, 2004

[備考] 接種試験なし。英名は*Pseudocercospora leaf spot*を提案

黒斑病 kokuhan-byo Leaf spot

Alternaria alternata (Fries) Keissler

高野喜八郎：日植病報 72(4):210, 2006

根腐病* negusare-byo Root rot

Pythium helicoides Drechsler

Kageyama, K. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 68(1): 15, 2002

[備考] *Rosa hybrida* Hort.に発生

ピシウム根腐病 *Pythium-negusare-byo* Pythium root rot

Pythium helicoides Drechsler

Kageyama, K. et al.: J. Gen. Plant Pathol. 68(1): 15, 2002

[備考] *Rosa hybrida* Hort.に発生

ハマナス p.638

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

Sphaerotheca pannosa (Wallroth: Fries) Léveillé [Oidium leucoconium Desmazières]

丹田誠之助・須賀里絵：東農大農学集報 47(3):141, 2002

(注) 文献追加

エゾイチゴ p.639***

Rubus idaeus L. var. *aculeatissimus* C. A. Meyer

さび病 sabi-byo Rust

Phragmidium miyakeanum Hiratsuka filius

Ito, S.: Mycol. Fl. Japan 2(3):39, 1950 ; Hiratsuka, N. et al.: The Rust Flora of Japan

p.417, 1992 ; Harada, Y.: Mycoscience 35:295, 1994

アズキナシ p.639

赤衣病 akagoromo-byo Pink disease

Erythricium salmonicolor (Berkeley & Broome) Burdsall [*Corticium salmonicolor* Berkeley & Broome]

川島祐介：群馬林試研報 1:20, 1992 ; Nomi, C. et al.: J. Agr. Sci., Tokyo Univ. Agr. 44(4):255, 2000

うどんこ病* udonko-byo Powdery mildew

(1) *Phyllactinia* sp.

高松 進：北陸病虫研報30:98, 1982 ; 三室元氣・佐藤幸生：日植病報 68(2):188, 2002

(2) *Podosphaera curvispora* Nomura

三室元氣・佐藤幸生：日植病報 68(2):188, 2002

(3) *Podosphaera* sp.

高松 進：北陸病虫研報30:98, 1982

ナナカマド p.639

赤衣病 akagoromo-byo Pink disease

Erythricium salmonicolor (Berkeley & Broome) Burdsall [*Corticium salmonicolor* Berkeley & Broome]

川島祐介：群馬林試研報 1:20, 1992 ; Nomi, C. et al.: J. Agr. Sci., Tokyo Univ. Agr.

44(4):255, 2000

[備考] サビバナナカマド *S. commixta* var. *rufoferruginea* に発生

コプロスマ Mirror plant p.641***

Coprosma spp.

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

Colletotrichum gloeosporioides (Penzig) Penzig & Saccardo

鈴木幹彦ら：日植病報 76(1):65, 2010

クチナシ p.641

がんしゅ病 ganshu-byo Phomopsis canker

Phomopsis gardeniae Hansen & Barrett

灰塚敏郎・楠木 学：日林誌 80(4):270, 1998

裏黒点円星病 ura-kokuten-maruhoshi-byo Circular leaf spot

Septoria gardeniae Savelli

Kobayashi, T. et al.: Mycoscience 44(6):473, 2003

(注) 文献追加

すすかび病 susukabi-byo Sooty leaf spot

Cercosporidium okinawaense Kobayashi & Nishijima

Kobayashi, T. et al.: Mycoscience 43:219, 2002

(注) 病原学名変更。これにより日本植物病名目録 p.641の本病病原学名は削除する

根こぶ線虫病 nekobu-sench□-byo Root-knot nematode disease

Meloidogyne incognita (Kofoid & White) Chitwood

竹内 純・堀江博道：関東病虫研報 45:249, 1998

[備考] コクチナシ (*G. jasminoides* Ellis var. *radicans* (Thunb.) Makino) に発生

ヤエヤマアオキ Indian Mulberry p.641***

Morinda citrifolia L.

黒斑病 kokuhan-byo Alternaria leaf spot

Alternaria alternata (Fries) Keissler

上村大樹ら：日植病報 74(3):183, 2008

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

Colletotrichum gloeosporioides (Penzig) Penzig & Saccardo

田場 聰ら：日植病報 73(3):178, 2007 ; 田場 聰ら：日植病報 75(1):35, 2009

ギヨクシンカ	p.642
褐斑病 kappan-byo Brown spot	
<i>Mycosphaerella tarennicola</i> Tak. Kobayashi & T. Okamoto	
Kobayashi, T. & Okamoto, T.: J. Agr. Sci., Tokyo Univ. Agr. 48(3):89, 2003	
[備考] シマギヨクシンカ <i>T. subsessilis</i> (Gray) Ohwiに発生	
ゲッキツ	p.642
うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew	
<i>Oidium</i> sp.	
丹田誠之助・中島千晴: 東農大農学集報 47(1):54, 2002 ; 本藏洋一ら: 日植病報 70(1):46, 2004 ; 本藏洋一ら: 植防研報 40:113, 2004	
[備考] <i>Pseudoidium</i> 亜属。テレモルフ : <i>Erysiphe</i> sp.	
サンショウウ	p.643
疫病 eki-byo Phytophthora disease	
(1) <i>Phytophthora nicotianae</i> Breda de Haan	
北澤 健ら: 日植病報 75(3):235, 2009	
(注) これにより <i>Phytophthora</i> sp.は(2)となる	
ホップノキ	p.643***
<i>Ptelea trifoliata</i> L.	
赤衣病 akagoromo-byo Pink disease	
<i>Erythricium salmonicolor</i> (Berkeley & Broome) Burdsall [<i>Corticium salmonicolor</i> Berkeley & Broome]	
川島祐介・山口忠義: 森林防疫 38:183, 1989 ; Nomi, C. et al.: J. Agr. Sci., Tokyo Univ. Agr. 44(4):255, 2000	
ポプラ類	p.645
赤衣病 akagoromo-byo Pink disease	
<i>Erythricium salmonicolor</i> (Berkeley & Broome) Burdsall [<i>Corticium salmonicolor</i> Berkeley & Broome]	
川島祐介: 群馬林試研報 1:20, 1992 ; Nomi, C. et al.: J. Agr. Sci., Tokyo Univ. Agr. 44(4):255, 2000	
[備考] イタリアポポラ <i>P. nigra</i> var. <i>italica</i> に発生	
ウツギ	p.651
立枯病 tachigare-byo Damping-off	
<i>Pythium myriotylum</i> Drechsler	
三宅律幸ら: 日植病報 76(1):65, 2010	
[備考] 園芸品種 <i>Deutzia</i> × <i>hybrida</i> に発生	

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

(1) *Erysiphe* sp.

神谷敏宏・佐藤幸生：日植病報 69(1):59, 2003

[備考] 本菌はUncinula節に属する

(注) これにより *Microsphaera alni* は(2), *M. deutziae* は(3), *Microsphaera* sp. は(4)となる

アジサイ

p.652

タマアジサイ *H. involucrata* Sieb.

ヤマアジサイ *H. macrophylla* Ser. var. *acuminate* Makino

ベニガクアジサイ *H. macrophylla* Ser. var. *serrata* Makino f. *japonica* Makino

コアマチャ *H. macrophylla* Ser. var. *serrata* Makino f. *thumbergii* Makino

青枯病 aogare-byo Bacterial wilt

Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi, Kosako, Yano, Hotta & Nishiuchi 1996

楠元智子ら：日植病報 75(3):209, 2009

[備考] カシワバアジサイ *H. quercifolia* に発生

斑点細菌病 hanten-saikin-byo Bacterial leaf spot

Acidovorax valerianellae Gardan, Stead, Dauga & Gillis 2003

瀧川雄一ら：日植病報 74(3):255, 2008

葉化病 yokai-byo Phyllody

'*Candidatus Phytoplasma japonicum*'

澤柳利実ら：日植病報 65(3):368, 1999

[備考] 星 朱香ら（日植病報 73(1):40, 2007）は' *Candidatus P. ziziphi*' を検出

そうか病 soka-byo Scab

Sphaceloma sp.

小野 剛ら：日植病報 76(1):41, 2010

[備考] ヤマアジサイ (*H. serrata*) に発生

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

Colletotrichum destructivum O'Gara

森脇丈治ら：日植病報 69(3):259, 2003

[備考] アジサイ由来の *C. sp.* は *C. destructivum* である

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

(3) *Oidium hortensiae* Joerstad

丹田誠之助：東農大農学集報 42(3):173, 1997；丹田誠之助：東農大農学集報 43(4):253:

1999

[備考]タマアジサイ、ヤマアジサイ、ベニガクアジサイ、コアマチャに発生
(注) 病原と宿主追加。これにより(3) *Oidium* sp. は(4)に、(4) *Uncinula hydrangeae* は(5)となる

キリ p.654

斑点病 hanten-byo Leaf spot

Pseudocercospora horii Nakashima & Kobayashi

Nakashima, C. et al.: Mycoscience 43:95, 2002

[備考] *Cercospora paulowniae* Horiの再検討の結果、*Pseudocercospora paulowniae* (Hori) Nakashima & Kobayashi (Nakashima et al. 1999)としたが、*P. paulowniae* Goh & Hsieh in Hsieh and Goh(1990)のlater homonymとなるため新名を与えた。両者は別種で、前者は *P. horii* が用いられるべきであるが、競い名の取り扱いで命名規約上無効となり、現在 *P. paulowniae* Goh & Hsiehが用いられている

(注) 病原学名の変更。これにより日本植物病名目録 p.654の本病病原学名は削除する

キブシ p.656

ハチジョウギブシ *S. praecox* var. *matsuzakii* (Nakai) Makino

褐斑病 kappan-byo Brown leaf spot

Pseudocercospora hachijokibushi Nakashima, Horie & Kobayashi

Nakashima, C. et al.: Mycoscience 45:49, 2004

[備考] 接種試験なし。ハチジョウギブシに発生

ビヤクブ類 p.657***

ビヤクブ *Stemona japonica* (Blume) Miq.

灰色かび病 haiiro-kabi-byo Gray mold

Botrytis cinerea Persoon: Fries

竹内 純ら：関東病虫研報 49:81, 2002

炭疽病 tanso-byo Anthracnose

(1) *Colletotrichum dematium* (Persoon: Fries) Grove

(2) *Colletotrichum gloeosporioides* (Penzig) Penzig & Saccardo

竹内 純ら：関東病虫研報 49:81, 2002

エゴノキ p.658

オオバエゴノキ *S. japonica* Siebold. & Zucc. var. *jippeikawamurae* (Yanagita) Harao

褐斑病 kappan-byo Brown leaf spot

Pseudocercospora fukuokaensis (Chupp) Liu & Guo

Nakashima, C. et al.: Mycoscience 45:49, 2004

[備考] オオバエゴノキに発生

(注) 文献追加

- ハクウンボク p.658
 セプトチス葉枯病 *Septotis-hagare-byo* Septotis leaf blight
Septotis sp.
 原田幸雄ら：日植病報 75(1):57, 2009
- クロキ p.659
 がんしゅ病 ganshu-byo Gall
Burkholderia sp.
 楠元智子・瀧川雄一：日植病報 65(3):360, 1999
- もち病 mochi-byo Leaf and bud gall, Exobasidium fruit deformation
 (2) *Exobasidium symploci-japonicae* Kusano & Tokubuchi var. *carpogenum* Nagao & S. Ogawa
 Nagao, H. et al.: Mycoscience 44(5):369, 2003
 (注) 病原追加。これにより *Exobasidium symploci-japonicae* は(1)となる
- ヒメシャラ p.664
 紅斑病 k□han-byo Scarlet leaf spot
Ramularia sp.
 小林享夫・高橋幸吉：日植病報 67(2):170, 2001；小林享夫・高橋幸吉：樹木医学研究 6(1):13, 2002
- ナツツバキ p.664
 縁葉枯病 fuchi-hagare-byo *Fusicoccum* leaf blight
Fusicoccum aesculi Corda
 宮坂裕美ら：日植病報 72(4):206, 2006
- 紅斑病 k□han-byo Scarlet leaf spot
Ramularia sp.
 小林享夫・高橋幸吉：日植病報 67(2):170, 2001；小林享夫・高橋幸吉：樹木医学研究 6(1):13, 2002
- ジンチョウゲ p.665
 赤衣病 akagoromo-byo Pink disease
Erythricium salmonicolor (Berkeley & Broome) Burdsall [*Corticium salmonicolor* Berkeley & Broome]
 川島祐介：群馬林試研報 1:20, 1992；Nomi, C. et al.: J. Agr. Sci., Tokyo Univ. Agr. 44(4):255, 2000

- シナノキ p.666
 赤衣病 akagoromo-byo Pink disease
Erythricium salmonicolor (Berkeley & Broome) Burdsall [*Corticium salmonicolor* Berkeley & Broome]
 川島祐介：群馬林試研報 1:20, 1992 ; Nomi, C. et al.: J. Agr. Sci., Tokyo Univ. Agr. 44(4):255, 2000
- ボダイジュ、オオバボダイジュ p.667
 モイワボダイジュ *T. maximowicziana* Shirasawa var. *yosoana* (Nakai) Tatewaki
 ヨウシュボダイジュ *Tilia platyphyllos* Scop.
 うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew
 (2) *Uncinula oleosa* Zheng & Chen var. *zhengii* Braun
 丹田誠之助：東農大農学集報 41(3):109, 1996
 [備考] モイワボダイジュ、モイワボダイジュ
 (注) 文献および宿主追加
- ムクノキ (樺樹、棕木) p.667
- ケヤキ (櫻) p.670
- ノブドウ p.672
 うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew
 (1) *Erysiphe necator* Schweinitz var. *necator*
 Nomura, Y. et al.: Mycoscience 44:157, 2003
 [備考] 接種試験なし
 (4) *Uncinula necator* (Schweinitz) Burrill
 井上幸次ら：日植病報 68(3):258, 2003
 [備考] 完全世代の確認
 (注) これによりアナモルフ記載の(3)*Oidium tuckeri* Berkely は括弧内に入る。備考欄の「病原菌の完全世代 *Uncinula necator* (Schweinitz) Burillはわが国では未記録」を削除する
- ビンロウ (檳榔、檳榔) p.679
2. 付録
 ヘゴ p.685
Pseudocercospora cyathea Nakashima & Inaba
 Nakashima, C. et al.: Mycoscience 47:48, 2006
 [備考] 接種試験なし

ブナ p.691
Cheirospora botryospora (Montagne) Berkeley & Broome
Ono, T. and Kobayashi, T.: Mycoscience 46:352, 2005
[備考] 接種試験なし

イタチハギ p.700
Passalora passaloroides (Winter) Braun & Crous
Nakashima, C. et al.: Mycoscience 47:48, 2006
[備考] 接種試験なし

ナンバンサイカチ p.701***
Cassia fistula L.
Pseudocercospora cassiae-fistulae Goh & Hsieh
Nakashima, C.: Mycoscience 45:116, 2004
[備考] 接種試験なし

エニシダ p.701
Pseudocercospora nogalesii (Urries) Braun & Dick
Nakashima, C. et al.: Mycoscience 47:48, 2006
[備考] 接種試験なし

デイゴ p.702
Exosporium mexicanum (Ellis & Everhart) M. B. Ellis
Ono, T. and Kobayashi, T.: Mycoscience 46:352, 2005
[備考] 接種試験なし

アブチロン類 Abutilon p.707***
Abutilon spp. (特用作物・ボウマ p.76を参照のこと)
モザイク病 mosaic-byo Mosaic
Abutilon mosaic virus
河野敏郎ら：日植病報 72(4):279, 2006
(注) 日本植物病名目録 p.707に記載のショウジョウカ *A. striatum* Dicks.はアブチロン類に編入

ハイビスカス p.708***
†微斑病 bihan-byo
Hibiscus latent Fort Pierce virus
松井暢子ら：日植病報 71(3):232, 2005
[備考] インドネシア

ユーカリ類

p.712

小粒こぶ症 kotsubu-kobu-sho Small gall

Klebsiella oxytoca (Flügge 1886) Lautrop 1956

小松 勉・景山幸二：日植病報 74(1):82, 2008

ネズミモチ

p.714

† ファイトプラズマ病 *Phytoplasma*-byo Japanese privet dwarf

Phytoplasma sp.

鄭 照英ら：日植病報 70(3):295, 2004

[備考] ネズミモチ・トウネズミモチに発生。本病原はjujube witches' broom subgroup (P. ziziphiと考えられる)。RT-PCRによる検出。接種試験なし。韓国

トベラ

p.715

Flosculomyces floridensis B. Sutton

Ono, T. and Kobayashi, T.: Mycoscience 46:352, 2005

[備考] 接種試験なし

サクラ類

p.717

Phytoplasma ファイトプラズマ

河辺祐嗣ら：日植病報 73(3):266, 2007

[備考] 樹勢衰退木より検出

ブーゲンビレア

p.719***

Bougainvillea spectabilis Willd.

ウイルス virus Chlorotic spot

Bougainvillea bacilliform virus

Chagas, C. M. et al.: Virus Rev. Res. 6:153, 2001 ; 山下修一ら：日植病報 70(3):260, 2004；

Rivas E. B. et. al.: J. Gen. Plant Pathol. 71(6):438, 2005

[備考] ブラジル。接種試験なし

ケヤキ

p.732

Griphosphaerioma zelkovicola Yas. Ono & Tak. Kobayashi

[Anamorph: *Sarcostroma zelkovicola* Yas. Ono & Tak. Kobayashi]

Ono, T. and Kobayashi, T.: Mycoscience 44:109, 2003

[備考] 接種試験なし

チーク

p.734

うどんこ病 udonko-byo Powdery mildew

(1) *Erysiphe tectonae* (E. S. Salmon) U. Braun & S. Takamatsu

Kom-un, S. et al. : 日植病報 69(1):59, 2003

[備考] タイ国。接種試験なし

(注) 病原追加。これにより *Uncinula lectionae* は(2)となる